

Advalgin®

Ibuprofen Lysine Flash



ادوالژین®

ایبوپروفن لیزین
فلش

ادوالژین® فلش به صورت قرص های خوراکی، روکشدار، سفید رنگ، کشیده، محدب و خطدار می باشد. هر قرص به ترتیب حاوی ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلی‌گرم ایبوپروفن (به صورت لیزین) است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به ایبوپروفن یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- سابقه واکنش آلرژیک شدید مانند آنافیلاکسی یا آنژیوادم ناشی از مصرف آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- ۳- مصرف همزمان با آسپیرین با دوز روزانه بیشتر از ۷۵ میلی‌گرم و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- ۴- پولیپ‌های بینی همراه با انقباض برونش‌ها ناشی از مصرف آسپیرین
- ۵- سابقه زخم، سوراخ شدن یا خونریزی معده و یا اثنی عشر
- ۶- مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال
- ۷- نارسایی شدید قلب، کبد یا کلیه
- ۸- سه ماهه آخر بارداری
- ۹- قبل و بعد از عمل جراحی قلب

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مطالعات انجام شده در حیوانات، بروز ناهنجاریهای مادرزادی را نشان نداده است. به دلیل احتمال بروز اثرات ناخواسته در جنین، مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک متخصص انجام گیرد.

شیردهی - این دارو ممکن است در شیر مادر ترشح شود و باعث بروز عوارض ناخواسته در کودک شیرخوار گردد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با نظر پزشک انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- بررسی مصرف این دارو در کودکان با سن بالاتر از ۶ ماه، عوارض جانبی یا مشکلات متفاوت با گروه سنی بزرگسالان را نشان نداده است.
- ۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
مشکلات خونریزی، کولیت، بیماری کرون، دیورتیکولیس، زخم معده یا سایر بیماریهای معده و روده، دیابت ملیتوس، هموروئید، هپاتیت یا سایر بیماریهای کبد، بیماری کلیه، سوزش یا خونریزی اخیر مقعد، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، مصرف تنباکو - احتمال بروز عوارض جانبی ممکن است افزایش یابد.
کم خونی، آسم، صرع، احتباس مایعات، بیماری قلب، فشار خون بالا، سابقه سنگ‌های کلیه، شمارش پایین پلاکت‌ها، شمارش پایین گلبول‌های سفید خون، بیماری ذهنی، پارکینسون، پلی میالژی روماتیسمی، پورفیری، آرتريت تمپورال - مصرف ایبوپروفن ممکن است باعث وخامت این بیماریها گردد.
زخم‌ها یا نقاط سفید رنگ در دهان - این علائم می‌تواند اثر ناخواسته جدی ناشی از مصرف ایبوپروفن باشد.

موارد احتیاط:

- ۱- اگر این دارو را به مدت طولانی مصرف می‌نمایید، به منظور کنترل پیشرفت درمان در فواصل معین به پزشک مراجعه کنید. پزشک ممکن است انجام برخی آزمایشات را جهت بررسی بروز برخی عوارض ناخواسته تجویز نماید. این آزمایشات بسیار مهم است، زیرا که عوارض جانبی جدی شامل زخم، خونریزی یا بیماری خونی می‌تواند بدون هیچ گونه هشدار رخ دهد.
- ۲- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه‌های حاوی الکل ممکن است باعث مشکلات معده‌ای شود.
- ۳- مصرف همزمان و مداوم این دارو با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ممکن است احتمال بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. همچنین مصرف همزمان استامینوفن، آسپیرین یا سایر سالیسیلات‌ها یا کتورولاک با این دارو ممکن است خطر بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. میزان خطر به مقدار مصرف روزانه هر دارو و مدت مصرف همزمان داروها بستگی دارد.
- ۴- درمان با این دارو می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی جدی شود. گاهی اوقات این عوارض می‌تواند بدون علائم باشد. اگرچه علائم هشدار دهنده مانند ررم صورت، انگشتان، پاها و پایین ساق‌ها، درد شدید معده، مدفوع سیاه‌رنگ و قیری شکل، استفراغ خون یا مواد مشابه با دانه‌های قهوه، افزایش غیرعادی وزن و بشورات جلدی اغلب بروز می‌نمایند. همچنین ممکن است علائم جدی بیماریهای قلبی مانند درد قفسه سینه، احساس تنگی در قفسه سینه، ضربان سریع یا نامنظم قلب، گرگرفتگی غیرعادی یا گرمای پوست بروز نماید. در چنین مواردی سریعاً مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.
- ۵- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۶- این دارو ممکن است باعث اغتشاش شعور، خواب آلودگی، گیجی، منگی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد. همچنین ممکن است باعث تاری دید یا سایر مشکلات بینایی در برخی افراد شود. لذا توصیه می‌گردد قبل از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، احتیاط نمایید.
- ۷- برخی افراد در هنگام مصرف این دارو ممکن است نسبت به نور خورشید بیشتر حساس باشند. تماس با نور خورشید حتی اگر به مدت کوتاه باشد ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید؛ ایجاد تاول بر روی پوست؛ بشورات جلدی، قرمزی، خارش یا تغییر رنگ پوست و تغییرات بینایی گردد.

- ۸- در صورت مشاهده لرز، تب، درد یا کوفتگی عضلات و سایر علائم مشابه با آنفلوانزا بخصوص اگر با بثورات جلدی همراه گردد، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید. این اثرات ممکن است بندرت اولین علائم ناشی از عوارض جانبی جدی دارو باشد.
- ۹- مصرف این دارو ممکن است باعث یک واکنش آلرژیک جدی به نام آنافیلاکسی گردد. این واکنش اغلب در بیمارانی بروز می‌نماید که به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند. در آنافیلاکسی به درمان‌های فوریت دار پزشکی نیاز است. از بیشترین علائم این واکنش می‌توان به تنفس سریع یا نامنظم؛ حس خس کردن و سنکوپ اشاره نمود. از سایر علائم می‌توان تغییر رنگ پوست صورت؛ ضربان قلب یا نبض سریع یا نامنظم؛ ورم کهیر مانند پوست و ورم پلک‌ها را نام برد. در چنین شرایطی، بلافاصله درمان‌های فوریت دار پزشکی مورد نیاز است.
- ۱۰- در صورت عدم بهبود علائم و یا بدتر شدن آنها، مشاهده تب بالا یا تبی که به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و قرمزی یا تورم ناحیه درد، با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین، مکمل‌های حاوی پتاسیم - احتمال بروز مشکلات جدی معده مانند زخم و خونریزی ممکن است افزایش یابد.

آسپیرین - در صورت مصرف همزمان و مداوم آسپیرین و ایبوپروفن، احتمال بروز عوارض جانبی جدی افزایش می‌یابد.

سینکلوپورین، گلیکوزیدهای دیژیتالیس، لیتیم، متوترکسات، فنی‌توئین - مقدار این داروها در خون و همچنین احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.

پروبنسید - مقدار ایبوپروفن در خون و احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.

تزیامترن - احتمال بروز مشکلات کلیوی ممکن است افزایش یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال

قرص ۲۰۰ میلی‌گرم: ۱ یا ۲ قرص هر ۴ ساعت یک بار در صورت نیاز است.

حداکثر مقدار مصرف ۶ قرص در روز است.

قرص ۴۰۰ میلی‌گرم: ۱ قرص هر ۴ ساعت یک بار در صورت نیاز است.

حداکثر مقدار مصرف ۳ قرص در روز است.

توجه: بین دو نوبت مصرف دارو باید حداقل ۴ ساعت فاصله باشد.

کودکان تا سن ۱۲ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- دارو را همراه با یک لیوان پر از آب میل نمایید. پس از مصرف دارو، به مدت حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در حالت خوابیده قرار نگیرید. در غیر اینصورت، تحریکات ممکن است منجر به اشکال در بلع گردد.
- ۲- به منظور کاهش تحریکات معده، این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا یک داروی ضد اسید مصرف نمود.
- ۳- این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک یا راهنمای دارو مصرف نمایید. از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور پزشک یا راهنمای دارو خودداری نمایید، مگر آن که پزشک تجویز نموده باشد.
- ۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عوارض نادر - سنکوپ؛ تنفس سریع و نامنظم؛ ضربان سریع و نامنظم قلب یا نبض؛ ورم کهیر مانند صورت، پلک‌ها، دهان، لبها یا زبان؛ پف یا ورم پلک‌ها یا اطراف چشم‌ها؛ تنگی نفس، تنفس مشکل؛ حس خس کردن یا احساس تنگی در قفسه سینه

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل انقباضات، درد یا ناراحتی خفیف تا متوسط شکم یا معده؛ اسهال؛

گیجی؛ خواب‌آلودگی؛ منگی؛ سردرد خفیف تا متوسط؛ سوزش معده؛ سوء هاضمه، تهوع و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر تغییر رنگ پوست یا لبها به آبی؛ اشکال در به خواب رفتن؛ عدم جهت‌یابی؛ گیجی، سنکوپ یا منگی در هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته؛ خواب‌آلودگی تا کومای عمیق؛ توهم؛ تغییرات رفتاری یا ذهنی؛ لرزش عضلات؛ عدم استنشاق؛ تنفس سریع و عمیق؛ بیقراری؛ ضربان کند یا نامنظم قلب؛ انقباضات معده؛ سنکوپ ناگهانی و تعریق، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
PMQC@abidipharma.com
info@abidipharma.com
www.abidipharma.com
سایت اینترنتی:
تاریخ ویرایش: ۹۵/۷/۳



ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵

