

Abitant®

Aprepitant Capsules

اپیتانت®

کپسول اپرپیتانت

اپیتانت® به صورت کپسول‌های خوراکی، سر و بدن سفید رنگ (۸۰ میلی‌گرم) و یا سر صورتی رنگ و بدن سفید رنگ (۱۲۵ میلی‌گرم) می‌باشد. هر کپسول به ترتیب حاوی ۸۰ میلی‌گرم و یا ۱۲۵ میلی‌گرم اپرپیتانت است. اپیتانت® به اشکال بسته بندی زیر توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود:

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۲ عددی کپسول ۸۰ میلی‌گرم و یک نوار بلیستر یک عددی کپسول ۱۲۵ میلی‌گرم.
- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۲ عددی کپسول ۸۰ میلی‌گرم

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف دارو:

۱- سابقه حساسیت به اپرپیتانت و یا هر یک از مواد متشکله این دارو

۲- مصرف همزمان با پیموزاید، ترفنادین، آستمیزول و سیزاپراید

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و بخوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف آن در دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز می‌باشد.
شیردهی - ترشح این دارو در شیر انسان هنوز مشخص نشده است. به دلیل احتمال بروز عوارض ناخواسته جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

- ۱- بی‌خطری و کارآیی این دارو در کودکان با سن کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.
- ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، هیچ گونه مشکل مرتبط با سن که مفید بودن این دارو را محدود نماید، نشان نداده است. اگر چه افراد سالخورده بیشتر به عوارض ناخواسته دارو حساس می‌باشند. تنظیم مقدار مصرف در افراد سالخورده ضرورت ندارد.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید: **نارسایی شدید عملکرد کبد** - بی‌خطری مصرف این دارو در بیماران با نارسایی شدید کبدی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. لذا مصرف آن باید با احتیاط انجام گیرد.

موارد احتیاط:

- ۱- به منظور بررسی پیشرفت درمان و کنترل عوارض ناخواسته، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- در هنگام مصرف این دارو، داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی ممکن است به درستی اثر نمایند. در این صورت بارداری‌های ناخواسته ممکن است ایجاد شود. لذا در هنگام مصرف این دارو باید از سایر روش‌های پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمود.
- ۳- در صورت عدم بهبودی علائم و یا بدتر شدن آنها با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۴- از مصرف سایر داروها بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
آستمیزول، سیزاپراید، پیموزاید و ترفنادین - مصرف همزمان این داروها با اپیتانت® ممنوع است.
بنزودیازپین‌ها مانند آلپرازولام، میدازولام و تریازولام - اپیتانت® ممکن است مقدار این داروها در خون را افزایش دهد.
کاربامازپین - کاربامازپین ممکن است با القای متابولیسم اپرپیتانت، باعث کاهش کارآیی آن شود.
کلاریترومایسین، ایتراکونازول، نفازودون، نلفیناویر، ریتوناویر و ترولتاندومایسین - به دلیل احتمال افزایش مقدار اپرپیتانت در خون، مصرف همزمان آنها باید با احتیاط صورت گیرد.
دگزامتازون و متیل پردنیزولون - اگر به صورت خوراکی همزمان با اپرپیتانت مصرف شود، مقدار مصرف ممکن است ۵۰ درصد کاهش یابد. در صورت تزریق

داخل وریدی، مقدار متیل پردنیزولون باید حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.
دیلتازم - مقدار دیلتازم و اپریتانت در خون ممکن است افزایش یابد، لذا رعایت احتیاط توصیه می‌گردد.
دستاکسل، اتوپوزاید، ایفوسفامید، ایماتینیب، ایرنوتکان، پاکلیتاکسل، وین‌بلاستین، وین‌کریستین، وینورلین و سایر داروهای شیمی درمانی - پایش دقیق و رعایت احتیاط توصیه می‌گردد.
کتوکونازول - مصرف همزمان باعث افزایش مقدار اپریتانت در خون می‌گردد. رعایت احتیاط ضروری است.
داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی - کارایی داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی ممکن است کاهش یابد. سایر روش‌های جایگزین توصیه می‌گردد.
پاروکستین - مقدار پاروکستین و اپریتانت در خون ممکن است کاهش یابد و باعث تضعیف کارایی هر دو دارو گردد.
فنی‌توئین - هر دو دارو ممکن است باعث کاهش کارایی یکدیگر شوند.
ریفامپین - مقدار اپریتانت در خون ممکن است کاهش یابد و باعث افت کارایی آن گردد.
تولبوتامید - اپریتانت ممکن است باعث القای متابولیسم تولبوتامید شود.
وارفارین - پس از مصرف اپریتانت، بیمار باید به مدت دو هفته تحت پایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
برای تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی :

بزرگسالان - یک کپسول ۱۲۵ میلی‌گرم یک ساعت قبل از شروع شیمی درمانی

و

یک کپسول ۸۰ میلی‌گرم هر صبح به مدت ۲ روز پس از شیمی درمانی.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- قبل از شروع درمان با این دارو و در هنگام مصرف مجدد، برگه راهنمای آن را مطالعه نمایید.

۲- در صورت وجود تهوع و استفراغ، از مصرف این دارو خودداری نموده، با پزشک خود تماس بگیرید.

۳- دارو ممکن است با معده خالی و یا همراه با غذا مصرف شود.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - مدفوع سیاه یا قیری رنگ؛ لرز؛ سرفه؛ تب؛ درد بخش تحتانی پشت یا پهلو؛ ادرار کردن دردناک یا با اشکال؛ پوست رنگ پریده؛ تنگی نفس؛ گلودرد؛ زخم و نقاط سفید رنگ در دهان؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیرعادی.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل معده اسیدی یا ترش، نفخ؛ اغتشاش شعور؛ سوزش سر دل؛ سسکسه؛ افزایش ضربان قلب؛ سوء هضم؛ کاهش یا از دست دادن توانایی؛ منگی؛ کاهش اشتها؛ تهوع؛ تنفس سریع؛ ناراحتی، دل بهم خوردگی یا درد معده؛ ورم یا التهاب دهان؛ فرورفتگی چشم‌ها؛ تشنگی؛ کاهش وزن و چروکیدگی پوست با پزشک خود مشورت نمایید. توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر خواب آلودگی و سردرد، بیمار باید سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۳۵

تاریخ ویرایش: ۹۷/۱۱/۰۶