

شربت کتوتیفن به صورت محلول شفاف، لیمویی تا زرد کم رنگ و با طعم و بوی توت فرنگی می باشد و هر ۵ میلی لیتر آن حاوی ۱/۳۸ میلی گرم کتوتیفن هیدروژن فومارات معادل ۱ میلی گرم کتوتیفن است. این شربت در شیشه های ۱۲۰ میلی لیتری توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری های دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو از جمله بنزوات ها
- ۲- در چند مورد، مصرف همزمان این دارو در بیماران تحت درمان با داروهای پایین آورنده قند خون خوراکی باعث کاهش برگشت پذیر شمارش ترومبوسیت شده است. لذا از مصرف همزمان باید خودداری شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو باید با نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.
شیردهی - این دارو ممکن است وارد شیر مادر شود، بنابراین مادران تحت درمان با این دارو باید از شیردهی خودداری نمایند.

هشدارها:

- ۱- به منظور جلوگیری از بروز حملات آسمی ناشی از قطع مصرف سایر داروهای ضد آسم، در هنگام شروع مصرف این دارو مصرف سایر داروها باید به مدت حداقل ۲ هفته ادامه یابد.
- ۲- قطع مصرف این دارو باید به تدریج در طی ۲ تا ۴ هفته انجام گیرد، زیرا ممکن است علائم آسم عود نماید.
- ۳- در طول درمان با این دارو، در صورت بروز عفونت، مصرف همزمان داروهای ضد میکروبی باید با نظر پزشک انجام گیرد.

احتیاطات:

- ۱- در ضمن درمان به منظور کنترل بهبود بیماری به طور منظم به پزشک مراجعه کنید.
- ۲- در چند روز نخست درمان با این دارو ممکن است فعالیت های بدن مختل گردیده، و خواب آلودگی و به ندرت گیجی مختصری ایجاد شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسائلی که نیاز به هوشیاری دارند، خودداری نمایید.
- ۳- گاهی اوقات علائم تحریکات عصبی مانند هیجان، بی قراری، بی خوابی و عصبانیت خصوصاً در کودکان مشاهده شده است.
- ۴- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به صرع باید با احتیاط انجام گیرد.
- ۵- از مصرف همزمان نوشابه های حاوی الکل با این دارو خودداری نمایید.
- ۶- هر ۵ میلی لیتر شربت حاوی ۳/۲۴ گرم کربوهیدرات است، لذا مصرف آن در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس باید با احتیاط انجام گیرد.

تداخلات دارویی:

- ۱- این دارو ممکن است اثرات داروهای مسکن، خواب آور، ضد حساسیت و الکل را تقویت نماید.
- ۲- مصرف همزمان این دارو با داروهای پایین آورنده قند خون خوراکی ممکن است باعث کاهش برگشت پذیر ترومبوسیت گردد. لذا ضمن مصرف همزمان، انجام آزمایش شمارش پلاکت ها توصیه می گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

بزرگسالان و نوجوانان :

آسم حساسیتی (پیشگیری) - خوراکی، ۵ میلی لیتر (۱ میلی گرم) ۲ بار در روز هنگام صبح و عصر همراه با غذا می باشد. در صورت نیاز، مقدار مصرف ممکن است به ۲ میلی گرم ۲ بار در روز افزایش یابد.

کودکان :

آسم حساسیتی (پیشگیری) - نوزادان و کودکان ۶ ماه تا ۳ سال : خوراکی، ۰/۲۵ میلی لیتر (۰/۰۵ میلی گرم) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۲ بار در روز هنگام صبح و عصر همراه با غذا می باشد.

کودکان با سن بالاتر از ۳ سال: مقدار مصرف مشابه بزرگسالان و نوجوانان است.

سالمنان

خوراکی، مقدار مصرف مشابه بزرگسالان است.

در بیمارانی که به راحتی دچار خواب آلودگی می شوند، در چند روز اول شروع درمان، مقدار مصرف ۰/۵ تا ۱ میلی گرم در هنگام شب می باشد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو به پیشگیری از حملات آسم حاد کمک می نماید ولیکن آسم را درمان نمی کند.
- ۲- به منظور حصول اثرات درمانی، این دارو را به طور مداوم مصرف نمایید.
- ۳- مصرف سایر داروهای ضد آسم را براساس دستور پزشک ادامه دهید.
- ۴- این دارو را براساس دستور پزشک می توانید قبل و یا بعد از غذا مصرف نمایید.
- ۵- اثر کامل این دارو در پیشگیری از حملات آسم معمولاً چند هفته پس از شروع مصرف دارو ظاهر می شود. در طی این مدت بیمار باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

۶- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، بلافاصله به محض به یاد آوردن آن را مصرف نمایید. ولی اگر تقریباً مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد آن نوبت را مصرف ننموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

سرمایه خوردگی (لرز، سرفه، اسهال، تب، احساس ناراحتی یا بیماری، سردرد، درد مفاصل، از دست دادن اشتها، دردهای عضلانی، تهوع، آبریزش بینی، گلو درد، تعریق، اشکال در به خواب رفتن، خستگی یا ضعف غیرعادی و استفراغ) و عفونت دستگاه تنفسی (سرفه، تب و گلو درد)

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل افزایش وزن، درد شکمی (درد معده یا شکم)، تحریک اعصاب (هیجان، بی قراری، بی خوابی و عصبانیت) خصوصاً در کودکان، گیجی، خشکی دهان، خونریزی از بینی، افزایش اشتها، خواب آلودگی، بثورات جلدی، اشکال در بخواب رفتن و تورم پلک ها با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر کومای برگشت پذیر، اغتشاش شعور، تشنج خصوصاً در کودکان، افزایش تحریک پذیری خصوصاً در کودکان، کاهش فشار خون (تاری دید، اغتشاش شعور، گیجی، از حال رفتن و سبک شدن سر در هنگام بلند شدن از حالت خوابیده یا نشسته، تعریق، خستگی یا ضعف غیرعادی)، خواب آلودگی ملایم تا شدید و تندی ضربان قلب (از حال رفتن، ضربان قلب یا نبض سریع، کوبنده یا نامنظم)، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را از گرمای شدید و یخ زدگی محافظت نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۸،
خیابان دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷-۰۲۱
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
info@abidipharma.com
سایت الکترونیک:
سایت اینترنتی:
www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۱/۱۰/۶

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵