

ویرابکس® به صورت قرص‌های خوراکی، روکشدار، کشیده، خطدار (۱۰۰۰ میلی‌گرم)، محذب و به رنگ سفید است. هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم و یا ۱۰۰۰ میلی‌گرم والاسیکلوویر (به صورت هیدروکلراید) می‌باشد و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

سابقه واکنش حساسیتی (مانند آنافیلاکسی) به والاسیکلوویر، آسیکلوویر و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری- مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز است. شیردهی- عبور این دارو از شیر انسان مشخص نشده است. لذا مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج و با احتیاط انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- مطالعات بر روی این دارو فقط در افراد بزرگسال انجام شده است و هیچ گونه اطلاعات خاصی در مورد ارتباط بین سن و اثرات این دارو در کودکان وجود ندارد. سلامتی و کارایی این دارو در کودکان ثبت نشده است.
 - ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، هیچ گونه مشکل خاصی که مصرف این دارو را در این گروه سنی محدود نماید، نشان نداده است. اگرچه در افراد سالخورده به دلیل احتمال بیشتر در کاهش عملکرد کلیه، تنظیم مقدار مصرف و یا فواصل مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
 - ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
عفونت ویروسی نقص ایمنی پیشرفته در انسان (HIV)، **پیوند مغز استخوان**، **پیوند کلیه** - بیماران مبتلا به این مشکلات ممکن است بیشتر در معرض احتمال بروز عوارض جانبی شدید دارو قرار گیرند.
- بیماری کلیه - بیماری کلیه ممکن است باعث افزایش مقدار این دارو در خون گردد و احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهد.

موارد احتیاط:

- ۱- در صورت عدم بهبودی علائم طی چند روز از مصرف دارو و یا بدتر شدن آنها با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۲- ناحیه مبتلا به تبخال تناسلی و یا زونا باید در صورت امکان تمیز و خشک نگهداری شود. همچنین جهت جلوگیری از تحریک زخم‌ها (بلیسترها) از پوشش‌های گشاد استفاده نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
سایمتیدین، **پروپنسید** - مصرف همزمان با این دارو باعث کاهش دفع کلیوی والاسیکلوویر و افزایش مقدار آن در خون می‌گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به‌طور کلی به‌صورت زیر است:

- **درمان هرپس ژنیتال (تبخال تناسلی) (بروز اولیه):**

بزرگسالان - یک گرم دو بار در روز و به مدت ده روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

- **درمان هرپس ژنیتال (تبخال تناسلی) (عود کننده):**

بزرگسالان - ۵۰۰ میلی گرم دو بار در روز و به مدت سه روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

- پیشگیری از هریس ژنیتال (تبخال تناسلی) (عود کننده) :

بزرگسالان - ۵۰۰ میلی‌گرم یا یک گرم یک بار در روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

- درمان هریس زوستر (زونا) :

بزرگسالان - یک گرم سه بار در روز و به مدت هفت روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

- درمان هریس لبیالیس (زخم های سرد) :

بزرگسالان - ۲ گرم هر ۱۲ ساعت یک بار و به مدت یک روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- حداکثر اثربخشی این دارو در صورتی است که در طی ۴۸ ساعت پس از ظاهر شدن علائم زونا و یا تبخال تناسلی (مانند درد، سوزش یا بروز بلیستر) مصرف گردد. در تبخال‌های تناسلی عود کننده، حداکثر اثربخشی دارو در صورتی است که در طی ۲۴ ساعت پس از ظاهر شدن علائم مصرف شود.

۲- دارو را همراه با غذا میل نمایید.

۳- دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر علائم طی چند روز ناپدید شوند. مصرف هیچ یک از نوبت‌ها را فراموش نکنید. از مصرف دفعات بیشتر و یا طولانی‌تر از دستور پزشک خودداری نمایید.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

کمتر شایع - قاعدگی دردناک شامل انقباضات شکمی، اسهال یا تهوع .

یا میزان شیوع نامشخص - دردهای پشت، ساق پا یا معده؛ تغییرات رفتاری بخصوص در ارتباط با سایر مردم؛ اشکال در تنفس یا بلع؛ ضربان قلب سریع، کوبنده یا نامنظم؛ فشار خون بالا؛ خارش؛ منگی هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته؛ قرمزی پوست؛ دیدن، شنیدن یا احساس واقعی که وجود ندارند؛ بثورات جلدی؛ ورم یا پف صورت، دست‌ها، ساق‌ها یا پاها؛ خس خس کردن.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل سردرد؛ تهوع؛ بیوست؛ اسهال؛ گیجی؛ درد مفصل؛ کاهش اشتها؛ درد معده؛ خستگی یا ضعف غیرعادی؛ استفراغ؛ اضطراب؛ خشکی دهان؛ تحریک پذیری؛ تغییرات رفتاری یا ذهنی؛ عصبانیت و بیقراری یا پزشک خود تماس بگیرید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر اضطراب؛ حملات تشنجی؛ کاهش بازده ادرازی؛ کاهش تکرر ادراز؛ خشکی دهان؛ توهمات؛ تحریک پذیری؛ کاهش هوشیاری؛ درد قسمت پایینی پشت و پهلو؛ عصبانیت و بیقراری، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
تاریخ ویرایش: ۹۵/۱۱/۱۲

فرآورده داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران
عبیدی
تاسیس ۱۳۳۵

