

# Cytovex® 200

Favipiravir

# سایتوفکس® ۲۰۰

فاویپیراویر

سایتوفکس® ۲۰۰ به صورت قرص‌های خوارکی، روکشدار، گرد، محدب و به رنگ زرد می‌باشد. هر قرص حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم فاویپیراویر است و در جعبه‌های ۴۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

#### موارد مصرف:

سایتوفکس® ۲۰۰ برای شیوع یا ظهره عفونتهای ویروسی آنفلوانزا و در زمانی که سایر داروهای ضد ویروس آنفلوانزا موثر و یا به اندازه کافی موثر نیستند، بکار می‌رود.

#### راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو، موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:  
• کودکان: این دارو تاکنون در کودکان استفاده نشده است.

• سالمندان: مصرف این دارو در افراد سالمند به دلیل کاهش عملکردهای فیزیولوژیک، باید با احتیاط و پایش شرایط عمومی انجام گیرد.  
• سایر بیماری‌ها: حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص

موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:  
بیماری نقرس یا سایقه آن، افزایش میزان اسید اوریک خون – مقدار اسید اوریک خون ممکن است افزایش یابد و علایم تشدید گردد.  
اختلال عملکرد کبدی – افزایش مقدار دارو در خون این بیماران گزارش شده است.

#### موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به فاویپیراویر یا هر یک از اجزا تشکیل دهنده این دارو
- بارداری یا احتمال بارداری
- شیردهی

#### صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری – در مطالعات انجام شده در حیوانات، ناهنجاری و نقص جنبین مشاهده شده است. لذا مصرف این دارو در زنان باردار یا با احتمال بارداری منوع است.

در زنان در سنین باروری، قبل از شروع درمان با این دارو باید از منفی بودن تست بارداری اطمینان حاصل شود. همچنین طی درمان و حداقل ۷ روز پس از خاتمه آن، باید از روش‌های موثر در پیشگیری از بارداری استفاده نمود.

فاویپیراویر در اسپرم ترشح می‌گردد. در طی درمان و حداقل ۷ روز پس از خاتمه آن، باید از روش‌های موثر در پیشگیری از بارداری استفاده نمود (مردان باید از کاندوم استفاده نمایند). همچنین مردان باید از رابطه جنسی با زنان باردار خودداری نمایند.

شیردهی – این دارو در شیر ترشح می‌گردد. در صورت لزوم تجویز آن، شیردهی باید قطع گردد.

#### هشدارها / موارد احتیاط:

- با مصرف داروهای ضد ویروس آنفلوانزا شامل این دارو، رفتارهای غیر عادی گزارش شده است. در صورت مصرف این دارو در کودکان، از تنها گذاشتن آنها در منزل به مدت حداقل ۲ روز خودداری شود.
- عفونت ویروس آنفلوانزا ممکن است با عفونتهای باکتریایی همراه گردد و یا با علایم شبیه آنفلوانزا اشتباه شود. در صورت وجود عفونت باکتریایی یا احتمال عفونت باکتریایی، اقدامات مناسب مانند تجویز داروهای ضد باکتریایی باید لحاظ گردد.
- تجویز این دارو باید بالافصله پس از شروع علایم آنفلوانزا صورت گیرد.

### تداخل‌های دارویی:

- پیرازینامید - مقدار اسید اوریک در خون افزایش می‌یابد.
- رپاگلیناید - مقدار رپاگلیناید در خون ممکن است افزایش یابد و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن بروز نماید.
- تئوفیلین - مقدار فاوپیراولیر در خون ممکن است افزایش یابد و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن بروز نماید.
- فامسیکلوویر، سولینداک - کارآیی این داروها ممکن است کاهش یابد.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:  
برای درمان آنفلوانزا:

بزرگسالان -

۱۶۰۰ میلی‌گرم ۲ بار در روز برای روز اول و سپس ۶۰۰ میلی‌گرم ۲ بار در روز به مدت ۴ روز است.  
کل دوره درمان باید ۵ روز باشد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- این دارو را همیشه مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.
- مصرف این دارو باید بالاگفته پس از شروع علایم شبه آنفلوانزا صورت گیرد.

### عوارض جانبی:

هر دارو به مواراث اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر، سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:  
افزایش میزان اسید اوریک خون، اسهال، کاهش شمارش نوتوفیل، افزایش آنزیم‌های کبدی شامل (GOT) و AST (GPT).  
عوارض جانبی زیر با مصرف سایر داروهای ضد ویروس آنفلوانزا گزارش شده است. از این جهت بیماران باید به دقت مورد پایش قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه شرایط غیرعادی، مصرف دارو قطع شود و اقدامات مناسب لحاظ گردد:  
شوك آنافیلاکسی، پنومونی، هیاتیت حاد، اختلال عملکرد کبدی، برقان، نکرولیز سمی اپیسرم (TEN)، سندرم استیونس - جانسون،  
صدمات حاد کلیوی، کاهش شمارش گلبول سفید، کاهش شمارش نوتوفیل، کاهش شمارش پلاکت، علائم نورولوژیک و روانی (اختلال هوشیاری، رفتار غیرعادی، روان پریشی، توهمندی، هذیان، تشنج، کولیت هموراژیک (خونریزی دهنده).

### شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معده عدم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری  
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

VOC@abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۹/۰۵/۱۵

### ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدالله

۱۳۳۵



210mmx150 mm