

ایروکاست® به صورت قرص‌های خوراکی، جویدنی و صورتی رنگ (۵ میلی‌گرم) و قرص‌های خوراکی و سفید رنگ (۱۰ میلی‌گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۵ و ۱۰ میلی‌گرم مونته‌لوکاست (به صورت سدیم) است و در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۳- استفاده از سایر داروها

۲- بارداری یا شیردهی

۱- وجود هرگونه حساسیت

۴- ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به‌خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات، بروز ناهنجاری‌های مادرزادی گزارش نشده است. مصرف این دارو در طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

شیردهی - تاکنون مشخص نمی‌باشد که این دارو در شیر انسان ترشح شود، اگرچه در شیر موش‌های صحرایی شیرده ترشح می‌گردد. لذا مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

هشدارها:

۱- در صورت مشاهده تغییرات رفتاری و خلقی در هنگام مصرف این دارو، بلافاصله مصرف دارو را قطع نموده و سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. این تغییرات شامل علائم زیر می‌گردد:

آشفته‌گی شامل رفتار تهاجمی یا خشونت، مشکلات مربوط به تمرکز، رویاهای بد یا زنده، افسردگی، اغتشاش شعور، احساس اضطراب، توهم، تحریک پذیری، مشکلات حافظه‌ای، علائم وسواسی، بیقراری، راه رفتن در خواب، لکنت زبان، تصورات و اقدام به خودکشی، لرزش یا لرزیدن، مشکل خواب، حرکات غیر کنترل شده عضلانی

۲- در خصوص مصرف این دارو در کودکان کمتر از یک سال، هیچ‌گونه اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد.

۳- مصرف این دارو در افراد سالمند بالاتر از ۶۵ سال در مقایسه با افراد جوان‌تر، تفاوتی را به لحاظ موثر بودن یا عوارض جانبی نشان نداده است.

۴- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

آلرژی به آسپیرین یا سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (اتودولاک، ایبوپروفن، کتوپروفن، نابروکسن) - از مصرف همزمان این داروها با مونته‌لوکاست خودداری شود.

بیماری کبد - اثرات این دارو به دلیل دفع آهسته‌تر آن از بدن ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط:

۱- به‌منظور کارآیی مناسب این دارو، مصرف آن باید در یک زمان مشخص در طی روز انجام گیرد، حتی اگر احساس شود که بیماری آسم بهبود یافته است.

۲- از قطع مصرف این دارو بدون دستور پزشک خودداری کنید، حتی اگر به‌نظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.

۳- در صورت عدم بهبودی علائم و یا بدتر شدن بیماری آسم، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- در هنگام مصرف این دارو، از کاهش مقدار یا قطع مصرف سایر داروهای ضد آسم بدون دستور پزشک خودداری نمایید، حتی اگر به‌نظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.



تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
فئوباریتال - غلظت خونی مونته‌لوکاست ممکن است کاهش یابد که منجر به کم شدن اثر دارو می‌گردد.
پردنیزون - عوارض جانبی پردنیزون (مانند خیز) ممکن است افزایش یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به‌طور کلی به‌صورت زیر است:
برای آسم یا آلرژی‌های فصلی:

قرص: بزرگسالان و نوجوانان ۱۵ سال به بالا - ۱۰ میلی‌گرم یک‌بار در روز

قرص جویدنی: کودکان ۶ تا ۱۴ سال - ۵ میلی‌گرم یک‌بار در روز

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو جهت جلوگیری از حملات آسمی تجویز می‌گردد و برای تسکین حمله‌ای که از قبل شروع شده است، بکار نمی‌رود.
- ۲- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به‌محض به‌یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به‌موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - بالا رفتن بدون علامت آنزیم‌های کبدی

نادر - وجود عفونت در ادرار

شیوع نامشخص - رفتار تهاجمی، آشفتگی، شوک حساسیتی فوری، آنژیوادم، هیپاتیت (التهاب کبد) صفراوی، توم، طپش قلب، التهاب لوزالمعده، خارش، حملات تشنجی و کهمیر

برخی عوارض جانبی به‌مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند سردرد، درد شکمی یا معده، سرفه، دندان درد، گیجی، تب، سوزش سردل، بثورات جلدی، آبریزش بینی، خستگی یا ضعف غیرعادی، درد مفصل، اسهال، اختلالات خواب، خواب‌آلودگی، خیز، افزایش خونریزی، بی‌خوابی، تحریک پذیری، ضعف عضلانی، تهوع، اختلال حس، بیقراری و استفراغ به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر درد شکمی، افزایش حرکات بدنی، اتساع شدید مردمک چشم، افزایش حساسیت چشم‌ها به نور، خواب‌آلودگی و تشنجی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.