

لانزو® عبیدی به صورت کپسول‌های انتریک کوتد خوراکی به رنگ سبز و صورتی (۱۵ میلی‌گرم) و صورتی (۳۰ میلی‌گرم) می‌باشد. هر کپسول به ترتیب حاوی ۱۵ و یا ۳۰ میلی‌گرم لانسوپرازول است و در جعبه‌های ۲۸ عددی کپسول توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به لانسوپرازول و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در صورت نیاز قطعی به آن طی دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز است.

شیردهی - تاکنون مشخص نمی‌باشد که این دارو در شیر انسان ترشح شود، اگرچه در شیر موش‌های صحرایی ترشح می‌گردد. به دلیل بروز اثرات ناخواسته در حیوانات، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان کمتر از یک سال ثبت نشده است. ایمنی و اثربخشی این دارو در کودکان ۱ تا ۱۷ سال برای درمان کوتاه مدت علایم بیماری بازگشت اسید از معده به مری و التهاب فرسایشی مری ثبت گردیده است.

۲- بر اساس مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، دفع دارو از بدن کاهش می‌یابد.

۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

نارسایی عملکرد کبدی - به دلیل طولانی شدن نیمه عمر پلاسمایی لانسوپرازول، کاهش مقدار مصرف آن در بیماران مبتلا به بیماری شدید کبدی ممکن است ضروری باشد.

موارد احتیاط:

به منظور کنترل پیشرفت درمان، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن وضعیت با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

استرهای آمپی سیلین، دیگوسکین، نمک‌های آهن و کتوکونازول - لانسوپرازول باعث طولانی مدت ترشح اسید معده می‌گردد. لذا ممکن است با جذب این داروها تداخل نماید.

سیانوکوبالامین - لانسوپرازول ممکن است باعث کاهش جذب سیانوکوبالامین گردد.

سوکرافیت - جذب لانسوپرازول به تاخیر می‌افتد و فراهمی زیستی آن کاهش می‌یابد. لانسوپرازول باید حداقل ۳۰ دقیقه قبل از سوکرافیت مصرف گردد.

تئوفیلین - دفع تئوفیلین ممکن است به میزان جزئی افزایش یابد. در برخی بیماران، تنظیم مقدار مصرف تئوفیلین در شروع و یا خاتمه درمان با لانسوپرازول ممکن است ضروری باشد.

وارفارین - مصرف همزمان این داروها ممکن است باعث افزایش INR گردد. لذا تغییرات INR و زمان پروترومبین باید مورد پایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان بیماری بازگشت اسید از معده به مری:

بزرگسالان - ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز است.
کودکان کمتر از ۱ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
کودکان ۱ تا ۱۸ سال - ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۸ تا ۱۲ هفته است.
برای درمان زخم‌های اثنی عشر:

بزرگسالان - ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۴ هفته است. در بیماران نیازمند به درمان نگهدارنده، ۱۵ میلی گرم یک بار در روز مصرف می گردد.

کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
برای درمان زخم‌های اثنی عشر همراه با عفونت هلیکوباکتری پیلوری:

بزرگسالان - ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم (۱ گرم) آموکسی سیلین و ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین قبل از غذا دو بار در روز و به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز است. درمان دیگر، ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم (۱ گرم) آموکسی سیلین قبل از غذا سه بار در روز و به مدت ۱۴ روز است.

کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
برای درمان زخم‌های معده:

بزرگسالان - ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۸ هفته است.
کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای درمان افزایش بیش از حد اسید معده:

بزرگسالان - در شروع، ۶۰ میلی گرم یک بار در روز است. پزشک ممکن است در صورت نیاز مقدار مصرف را افزایش دهد.
کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را قبل از غذا و ترجیحا در هنگام صبح میل نمایید.
- ۲- کپسول را به طور کامل بلعیده، از خرد کردن، شکستن یا جویدن آن خودداری نمایید. در صورت عدم توانایی در بلع کامل کپسول، آن را باز نموده، محتویات را در یک قاشق غذاخوری حاوی کمیوت میوه پراکنده کرده و بلافاصله میل نمایید. ضمناً می توان محتویات را با مقداری آب میوه یا سبزیجات مخلوط کرده و بلافاصله میل نمایید. از جویدن یا خرد کردن محتویات کپسول خودداری نمایید.
- ۳- این دارو را برای دوره کامل درمان حتی در صورت احساس بهبودی مصرف نمایید.
- ۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

بیشتر شایع - اسهال، بثورات جلدی یا خارش

کمتر شایع - درد شکم یا معده، افزایش یا کاهش اشتها، درد مفصل، تهوع و استفراغ

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل گیجی و سردرد با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.
شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۳۵



210 mm×150 mm 2210098/1