

اکساتنت® ۶۰۰ به صورت قرص‌های خوراکی، کشیده، روکشدار و به رنگ سفید است. هر قرص حاوی ۶۰۰ میلی‌گرم لینزولید است و در جعبه‌های ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

اکساتنت® ۶۰۰ از گروه داروهای آنتی‌بیوتیک می‌باشد. آنتی‌بیوتیک‌ها داروهایی هستند که برای درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌ها استفاده می‌شوند و از بین بردن باکتری‌ها یا جلوگیری از رشد آن‌ها عمل می‌کنند. اکساتنت® ۶۰۰ برای درمان سرماخوردگی‌ها، آنفلوانزا یا سایر عفونت‌های ویروسی بکار نمی‌رود. این دارو در درمان عفونت‌های جدی خون، ریه‌ها و پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً زمانی تجویز می‌شود که سایر آنتی‌بیوتیک‌ها اثربخشی کافی نداشته باشند. اکساتنت® ۶۰۰ تنها با تجویز پزشک قابل تهیه و مصرف می‌باشد.

راهنمای‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به لینزولید و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- مصرف همزمان با مصرف طی دو هفته اخیر داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز نوع A یا B از جمله فلزین و ایزوکربوکسازید

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به‌خوبی کنترل‌شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در دوران بارداری تنها در صورت ضرورت قطعی و تحت نظر پزشک متخصص و با رعایت احتیاط توصیه می‌شود.

باروری - بر اساس نتایج حاصل از مطالعات انجام‌شده در موش‌ها، این دارو ممکن است به‌طور برگشت‌پذیر باعث اختلال در باروری مردان شود.

شیردهی - این دارو در شیر انسان ترشح می‌شود. اطلاعات کافی در خصوص تاثیر لینزولید بر تولید شیر در دسترس نیست. هنگام تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا قطع شیردهی، باید مزایای شیردهی برای رشد و سلامت نوزاد، نیاز بالینی مادر به دارو و احتمال بروز عوارض جانبی دارو در نوزاد یا ناشی از بیماری زمینه‌ای مادر مدنظر قرار گیرد. پایش نوزاد شیرخوار از نظر بروز اسهال و استفراغ توصیه می‌شود.

هشدارها:

۱- مصرف در کودکان و نوجوانان - بی‌خطری و اثربخشی این دارو در نوزادان و کودکان تا سن ۱۱ سال برای درمان پنومونی بیمارستانی، عفونت‌های پیچیده پوست و ساختار پوست، پنومونی اکتسابی جامعه و عفونت‌های ناشی از ائنتروکوکوس فاسیوم مقاوم به ونکومايسين و در کودکان و نوجوانان تا ۵ تا ۱۷ سال برای درمان عفونت‌های ساده پوست و ساختار پوست تایید شده است. مصرف این دارو برای درمان عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی در کودکان توصیه نمی‌گردد.

۲- مصرف در سالمندان - مطالعات انجام‌شده در افراد سالمند تفاوت معنی‌داری از نظر بروز مشکلات یا عوارض جانبی نسبت به افراد جوان‌تر نشان نداده است که منجر به محدودیت مصرف دارو در این گروه سنی گردد.

۳- وجود برخی بیماری‌ها ممکن است بر مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به هرگونه بیماری، به‌ویژه موارد زیر، پزشک خود را مطلع نمایید:

اسهال - تشخیص نوع اسهال پیش از تجویز این دارو ضروری است.

فشار خون کنترل نشده - این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون شود، بنابراین مصرف آن در این بیماران توصیه نمی‌گردد.

سندرم کارسینوئید (سندرم تومور دستگاه گوارش) - مصرف این دارو توصیه نمی‌شود، مگر در مواردی که از نظر بالینی ضروری باشد.

دیربسیون مغز استخوان - بروز کم‌خونی، لکوپنی، پلانیستوتینی و ترومبوسیتوپنی، به‌ویژه با مصرف بیش از دو هفته گزارش شده است. در صورت تشدید سرکوب مغز استخوان، قطع مصرف دارو باید مدنظر قرار گیرد.

اختلالات هورمونی و متابولیکی - احتمال بروز اسیدوز لاکتیک وجود دارد.

دیابت - این دارو ممکن است در بیماران دیابتی که همزمان انسولین یا داروهای کاهنده قند خون مصرف می‌کنند، باعث کاهش علامت‌دار قند خون شود. تنظیم دوز یا قطع مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.

تیروئوکسیکوز (افزایش فعالیت غده تیروئید)، فنوکروموسولینا - احتمال افزایش فشار خون وجود دارد؛ بنابراین مصرف دارو توصیه نمی‌گردد.

سابقه یا زمینه تشنج - احتمال بروز تشنج در این بیماران وجود دارد.

موارد احتیاط:

۱- در صورتی که طی چند روز پس از شروع مصرف دارو بهبودی در علائم مشاهده نشود یا وضعیت بیماری بدتر گردد، با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- در صورت بروز هر یک از علائم زیر، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

درد شکم، کاهش اشتها، اسهال، تنفس سریع یا کم‌عمق، احساس عمومی ناخوشی، درد یا انقباض عضلانی، تهوع، تنگی نفس، خواب‌آلودگی، خستگی یا ضعف غیرعادی و استفراغ. این علائم ممکن است نشان‌دهنده یک بیماری جدی باشند.

۳- بروز نوروپاتی محیطی و اختلالات بینایی در بیماران تحت درمان با این دارو گزارش شده است، به‌ویژه در مواردی که مدت درمان بیش از ۲۸ روز باشد.

۴- اختلالاتی از جمله تغییر در وقت بینایی، اختلال در دید رنگ‌ها، تاری دید و نقص میدان بینایی در حین مصرف این دارو گزارش شده است.

۵- بروز رابدومیولیز در مصرف‌کنندگان این دارو گزارش شده است. در صورت مشاهده علائم و نشانه‌هایی مانند درد عضلانی، حساسیت به لمس یا ضعف عضلات و تیره شدن رنگ ادرار، فوراً پزشک خود را مطلع نمایید.

۶- این دارو ممکن است باعث کاهش موقت تعداد گلبول‌های سفید خون و در نتیجه افزایش خطر ابتلا به عفونت شود. همچنین کاهش تعداد پلاکت‌ها که در فرآیند انعقاد خون نقش دارند، گزارش شده است. در این شرایط، به‌ویژه در صورت پایین بودن شمارش گلبول‌های خونی، پزشک ممکن است برای کاهش خطر عفونت یا خونریزی توصیه‌های زیر را ارائه دهد:

• از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداری نمایید. در صورت بروز تب، لرز یا علائم عفونت، فوراً با پزشک تماس بگیرید.

• در صورت مشاهده هرگونه خونریزی یا کبودی، پزشک را مطلع نمایید.

• از لمس چشم‌ها یا داخل بینی خودداری کنید، مگر آنکه پیش از آن دست‌های خود را شسته باشید.

• هنگام استفاده از وسایل تیز مانند تیغ یا ناخن‌گیر احتیاط نمایید تا از ایجاد بریدگی یا خراش جلوگیری شود.

• برای پیشگیری از کبودی یا آسیب‌های احتمالی، از انجام ورزش‌های تماسی خودداری نمایید.

• مصرف همزمان این دارو با برخی غذاها یا داروها ممکن است موجب افزایش فشار خون شود. به‌منظور پیشگیری از این عارضه، توصیه می‌شود از مصرف زیاد غذاها و نوشیدنی‌های حاوی مقادیر بالای تریامین (مانند غذاهای مانده، تخمیرشده، ترشی‌ها و مواد دودی) خودداری گردد.

تداخل‌های دارویی:

- قبل از مصرف این دارو، در صورتی که طی ۲ هفته اخیر هر یک از داروهای زیر را مصرف کرده‌اید، پزشک خود را مطلع سازید. این داروها نباید همزمان با آکسانت* ۶۰۰ مصرف شوند: داروهای مهارکننده متابولیزم آکسیداز مانند فلزین، ایزوگروکوسازید، سلجیلین و مکلومباید که برای درمان افسردگی یا بیماری پارکینسون به کار می‌روند. همچنین در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، قبل از شروع درمان با پزشک خود مشورت نمایید. پزشک ممکن است با در نظر گرفتن شرایط بالینی، آکسانت* ۶۰۰ را تجویز کند، اما لازم است وضعیت سلامت عمومی و فشار خون شما قبل و در طول درمان به‌دقت پایش شود. در برخی موارد، ممکن است پزشک داروی جایگزین توصیه نماید.
- داروهای ضداحتقان سرماخوردگی یا آنفولانزا مانند سودوافدرین یا فینیل پروپانول‌آمین
- برخی داروهای مورد استفاده در آسم مانند سالیوتامول، تربوتالین و فنوتروپول
- برخی داروهای ضافسردگی از جمله داروهای سه‌حلقه‌ای و مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)، مانند آمی‌تریپتیلین، کلومیپرامین، دکسپین، فلوکستین، فلوکسامین، ایمی‌پرامین، پاروکستین و سرتالین
- داروهای مورد استفاده در درمان میگرن مانند سوماتریپتان و زولمی‌تریپتان
- داروهای مورد استفاده در درمان واکنش‌های ناگهانی و شدید آلرژیک مانند آدرنالین (اپی‌نفرین)
- داروهای افزایش‌دهنده فشار خون مانند نورآدرنالین (نوراپی‌نفرین)، دوپامین و دوبوتامین
- داروهای مورد استفاده در درمان دردهای متوسط تا شدید مانند پتیدین
- داروهای مورد استفاده در اختلالات اضطرابی مانند بوسپیرون
- داروهای ضدانعقاد خون مانند وارفارین

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو توسط پزشک تعیین می‌شود؛ با این حال، مقدار مصرف معمول آکسانت* ۶۰۰ یک قرص ۶۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز با فاصله زمانی هر ۱۲ ساعت می‌باشد. طول دوره درمان معمولاً ۱۰ تا ۱۴ روز است، اما در صورت صلاحدید پزشک می‌تواند تا ۲۸ روز ادامه یابد. بی‌خطری و اثربخشی این دارو برای دوره‌های درمانی طولانی‌تر از ۲۸ روز به اثبات نرسیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- قرص را به‌طور کامل همراه با مقدار کافی آب ببلعید.
- ۲- این دارو را می‌توان همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمود.
- ۳- دارو را برای کل دوره درمان، حتی در صورت احساس بهبودی، مطابق دستور پزشک مصرف نمایید و مصرف آن را در زمان‌های منظم انجام دهید.
- ۴- در طول درمان، به‌منظور پایش تعداد گلبول‌های خون، انجام آزمایش‌های خون در فواصل منظم ضروری است.
- ۵- در صورت مصرف دارو به مدت بیش از ۲۸ روز، پایش وضعیت بینایی توصیه می‌شود.
- ۶- در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، به‌محض یادآوری آن را مصرف نمایید. اما اگر زمان نوبت بعدی نزدیک است، از مصرف نوبت فراموش‌شده خودداری کرده و برنامه عادی مصرف را ادامه دهید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به‌موازات اثرات درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود؛ اگرچه همه این عوارض در تمام افراد مشاهده نمی‌گردد، در صورت بروز هر یک از عوارض زیر، سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

بیشتر شایع - اسهال.

کمتر شایع یا نادر - انقباضات یا درد شدید شکم یا معده؛ مدفوع قیر مانند؛ وجود خون در ادرار یا مدفوع؛ لرز؛ سرخه؛ اسهال (شدید و آبکی که ممکن است خونی نیز باشد)؛ ترشحات و خارش واژن؛ تب؛ سردرد؛ خشونت صدا؛ درد ناحیه تحتانی پشت یا پهلو؛ ادرار دردناک یا دشوار؛ نقاط ریز قرمز رنگ سوزنی‌شکل روی پوست؛ تنگی‌نفس؛ زخم یا لکه‌های سفید در دهان، زبان یا گلو؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیرعادی.

برخی عوارض جانبی ممکن است با گذشت زمان و تطابق بدن با دارو برطرف شوند. با این حال، در صورت تداوم یا آزاردهنده بودن هر یک از عوارض زیر، با پزشک خود مشورت نمایید؛ تهوع؛ طعم بد دهان؛ تغییر در حس چشایی یا از دست دادن طعم و مزه؛ تغییر رنگ زبان؛ گیجی؛ از دست دادن طعم و مزه و استفراغ.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه‌شده توسط پزشک، بیمار باید فوراً با پزشک یا نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شود.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را تا زمان مصرف درون ظرف اصلی خود نگهداری نمایید.
- بعد از هر بار مصرف، درپوش ظرف را محکم ببندید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف‌شده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱
www.abidipharma.com
سایت اینترنتی:
ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com
تاریخ تدوین: ۱۴۰۵/۲/۰۱

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

تذکره
SINCE 1946

