

تاوانکس® به صورت قرص های خوراکی، روکشدار، خط دار و به رنگ سفید (۵۰۰ میلی گرم) و یا روکشدار، بدون خط و به رنگ سفید (۷۵۰ میلی گرم) می باشد. هر قرص به ترتیب حاوی ۵۰۰ میلی گرم و یا ۷۵۰ میلی گرم لووفلوکساسین (به صورت همی هیدرات) است.

تاوانکس® در بسته بندی های زیر توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود:

- جعبه حاوی یک نوار پلیستر ۵ عددی قرص ۵۰۰ میلی گرم
- جعبه حاوی یک نوار پلیستر ۷ عددی قرص ۵۰۰ میلی گرم
- جعبه حاوی یک نوار پلیستر ۵ عددی قرص ۷۵۰ میلی گرم
- جعبه حاوی یک نوار پلیستر ۷ عددی قرص ۷۵۰ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا آن مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هر گونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلا به بیماری های دیگر

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به لووفلوکساسین و یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو، سایر فلوروکینولون ها و یا سایر ترکیبات وابسته به مشتقات فلوروکینولون.
- ۲- التهاب یا پارگی تاندون مربوط به مصرف داروهای گروه کینولون

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات دقیق و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، لذا مصرف این دارو طی این دوران باید فقط تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد. **شیردهی** - این دارو ممکن است در شیر مادر ترشح شود و به دلیل امکان بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد. **هشدارها:**

۱- بی خطری و کارایی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.

۲- حضور بیماری های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید.

بیماری مغزی و ستون فقرات شامل سفتی سرخرگ های مغزی بیماری صرع یا سایر حملات تشنجی - مصرف لووفلوکساسین ممکن است خطر بروز حملات تشنجی را افزایش دهد. **دیابت ملیتوس (دیابت قندی)** - لووفلوکساسین ممکن است باعث تغییر در میزان قند خون شود، لذا ممکن است باعث اختلال در کنترل میزان قند خون گردد.

بیماری کلیه - به دلیل کاهش دفع لووفلوکساسین از بدن، اثرات این دارو ممکن است افزایش یابد.

برادی کاردی (آهسته شدن ضربان قلب) - لووفلوکساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT در بیماران مبتلا به برادی کاردی گردد.

هیپوکلسمی (کاهش پتاسیم خون) - لووفلوکساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT شود.

موارد احتیاط:

۱- در صورت عدم بهبودی علائم طی چند روز از شروع مصرف دارو و یا بدتر شدن آن، با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- از مصرف همزمان داروهای ضد اسید حاوی آلومینیم، کلسیم یا منیزیم، دیناتورین، مکمل های آهن، سوکرافیت و روی، با این دارو پرهیز نمایید. این داروها باعث جلوگیری از اثر بخشی مناسب لووفلوکساسین می گردند. لذا بهترین زمان مصرف این داروها حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف لووفلوکساسین است.

۳- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث حساسیت بیشتر پوست نسبت به نور خورشید شود. تماس با نور خورشید حتی برای دوره های کوتاه مدت ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، بثورات جلدی، قرمزی، خارش یا سایر تغییرات رنگی پوست گردد. در صورت مشاهده واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- در صورت بروز بثورات جلدی یا سایر علائم واکنش های آلرژیک، مصرف این دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

۵- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

۶- لووفلوکساسین ممکن است باعث دره، التهاب یا پارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علائم در دست ها، شانه ها و ساق ها، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک تماس حاصل نمایید. از انجام فعالیت های ورزشی خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

۷- مصرف این دارو در برخی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، ممکن است باعث هیپوگلیسمی (افت قند خون) گردد. علائم کمی قند خون باید قبل از آن که منجر به بیهوشی گردد، درمان شود. این علائم در افراد مختلف ممکن است متفاوت بوده و شامل خستگی یا ضعف، احساس اضطراب، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، رنگ پریدگی، اشکال در تمرکز، خواب آلودگی، گرسنگی شدید، سردرد، تهوع، عصبانیت، ضربان سریع قلب و لرزش غیر طبیعی می باشد. در صورت مشاهده هر یک از این علائم، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

۸- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به پایین بودن مقدار پتاسیم خون، ممکن است منجر به ضریان تند، کند یا نامنظم قلب گردد.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد اسید حاوی آلومینیم، کلسیم، منیزیم، دیناتورین، سولفات آهن، سوکرافیت و روی - مصرف این داروها ممکن است جذب لووفلوکساسین را کاهش دهد، بنابراین مصرف همزمان آنها توصیه نمی گردد. بهتر است بین مصرف هر یک از این داروها با لووفلوکساسین حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.

داروهای ضد آریتمی گروه Ia (کونینیدین، پروکائین آمید) و گروه III (آمیودارون، سوتالول) – در مصرف همزمان احتمال بروز آریتمی قلبی به علت طولانی شدن فاصله QT

در نوارقلب، ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد دیابت – در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون یا انسولین، مصرف همزمان این داروها با لووفلوکساسین ممکن است منجر به کاهش یا افزایش قند خون شود. لذا پایش میزان قند خون توصیه می گردد.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی – مصرف همزمان احتمال بروز تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی را ممکن است افزایش دهد.

داروهای کورتیکواستروئیدی – مصرف همزمان ممکن است منجر به پارگی تاندون های شانه، دست، آشیل یا سایر تاندون ها گردد که نیاز به عمل جراحی داشته و یا آن که منجر به ناتوانی طولانی مدت، بخصوص در افراد سالخورده می گردد.

وارفارین – لووفلوکساسین باعث تشدید اثرات وارفارین می گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان عفونت:

بزرگسالان – ۲۵۰ تا ۷۵۰ میلی گرم یک بار در روز.

کودکان کمتر از ۱۸ سال – مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- دارو ممکن است با معده خالی یا همراه با غذا مصرف شود.

۲- این دارو را همراه با مایعات فراوان مصرف نمایید. مصرف مایعات فراوان به جلوگیری از بروز برخی اثرات ناخواسته دارو کمک می نماید.

۳- به منظور حفظ مقدار ثابتی از دارو در خون یا ادرار، مصرف هیچ یک از نوبت ها را فراموش نکنید. همچنین دارو را مطابق با زمان ها و فواصل زمانی تعیین شده مصرف نمایید. اگر دارو را یک بار در روز مصرف می کنید، آن را هر روز در یک زمان مشخص میل نمایید.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر – بثورات جلدی، خارش یا قرمزی پوست، درد یا گرفتگی شدید ناحیه شکم یا معده، حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار، آشفته گی، تاول، اغتشاش شعور، اسهال آبکی شدید یا خونی، تب، تهوع، درد، التهاب یا تورم ساق ها، شانه ها یا دست ها، جنون، احساس سوزش پوست، قرمزی و تورم پوست، لرزش.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل درد یا ناراحتی معده یا شکم، تغییر حس چشایی، یبوست، اسهال، گیجی، خواب آلودگی، سر درد، منگی، تهوع، عصبانیت، اشکال در به خواب رفتن، خارش و ترشح واژن و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

علامه نظیر درد یا گرفتگی شدید معده یا شکم، حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار، اسهال آبکی شدید یا خونی و تب ممکن است پس از قطع مصرف دارو بروز نماید. در صورت مشاهده هر یک از این علائم، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید فوراً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

– دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

– دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۷۵



210 mm x 150 mm 22101053