

ایروکاست® به صورت قرص‌های خوراکی، جویدنی، صورتی رنگ، گرد و محدب (قرص جویدنی ۵ میلی‌گرم) و قرص‌های خوراکی، روکشدار، کرم رنگ، گرد و محدب (قرص روکشدار ۱۰ میلی‌گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۵ و ۱۰ میلی‌گرم مونته لوکاست (به صورت سدیم) است و در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

## راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

## موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

## مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات، بروز ناهنجاری‌های مادرزادی گزارش نشده است. مصرف این دارو در طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک معالج باشد. شیردهی - تاکنون مشخص نمی‌باشد که این دارو در شیر انسان ترشح شود، اگرچه در شیر موش‌های صحرایی شیرده ترشح می‌گردد. لذا مصرف آن در دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

## هشدارها:

- ۱- در خصوص مصرف این دارو در کودکان کمتر از یک سال، هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد.
- ۲- مصرف این دارو در افراد سالمند بالاتر از ۶۵ سال در مقایسه با افراد جوان‌تر، تفاوتی را به لحاظ مؤثر بودن یا عوارض جانبی نشان نداده است.
- ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:  
آلرژی به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (اتودولاک، ایبوپروفن، کتوپروفن، ناپروکسن) - از مصرف همزمان این داروها با مونته لوکاست خودداری شود.  
بیماری کبد - اثرات این دارو به دلیل دفع آهسته‌تر آن از بدن ممکن است افزایش یابد.

## موارد احتیاط:

- ۱- به منظور کارآیی مناسب این دارو، مصرف آن باید در یک زمان مشخص در طی روز انجام گیرد، حتی اگر احساس شود که بیماری آسم بهبود یافته است.
- ۲- از قطع مصرف این دارو بدون دستور پزشک خودداری کنید، حتی اگر به نظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.
- ۳- در صورت عدم بهبودی علائم و یا بدتر شدن بیماری آسم، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۴- در هنگام مصرف این دارو، از کاهش مقدار یا قطع مصرف سایر داروهای ضد آسم بدون دستور پزشک خودداری نمایید، حتی اگر به نظر آید که بیماری آسم بهبود یافته است.

## تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:  
فنوباربیتال - غلظت خونی مونته لوکاست ممکن است کاهش یابد که منجر به کم شدن اثر دارو می‌گردد.  
پردنیزون - عوارض جانبی پردنیزون (مانند خیز) ممکن است افزایش یابد.

## مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به‌طور کلی به‌صورت زیر است:  
برای آسم یا آلرژی‌های فصلی:

قرص: بزرگسالان و نوجوانان ۱۵ سال به بالا - ۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز

قرص جویدنی: کودکان ۶ تا ۱۴ سال - ۵ میلی‌گرم یک بار در روز

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- این دارو جهت جلوگیری از حملات آسمی تجویز می‌گردد و برای تسکین حمله‌ای که از قبل شروع شده است، بکار نمی‌رود.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

## عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - بالارفتن بدون علامت آنزیم‌های کبدی

نادر - وجود چرک در ادرار

شیوع نامشخص - رفتار تهاجمی، آشفتگی، شوک حساسیتی فوری، آنژیوادم، هیپاتیت (التهاب کبد) صفرای، توهم، طپش قلب، التهاب لوزالمعده، خارش، حملات تشنجی و کهیر

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند سردرد، درد شکمی یا معده، سرفه، دندان درد، گیجی، تب، سوزش سردل، بثورات جلدی، آبریزش بینی، خستگی یا ضعف غیرعادی، درد مفاصل، اسهال، اختلالات خواب، خواب آلودگی، خیز، افزایش خونریزی، بی‌خوابی، تحریک پذیری، ضعف عضلانی، تهوع، اختلال حس، بی‌قراری و استفراغ به پزشک خود اطلاع دهید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر درد شکمی، افزایش حرکات بدنی، اتساع شدید مردمک چشم، افزایش حساسیت چشم‌ها به نور، خواب آلودگی و تشنگی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

## شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری  
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی  
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹  
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹  
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com  
پست الکترونیک: info@abidipharma.com  
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵