

کدیمال®

اکسترا

Codimal®
Extra

کدیمال® اکسترا به صورت قرص های خوارکی، کشیده، محدب و سفید رنگ است. هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۶۵ میلی گرم کافئین است و در جعبه های ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- ابتلاء به بیماری های دیگر

۳- استفاده از سایر داروها

۲- بارداری یا شیردهی

۱- وجود هرگونه حساسیت

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به استامینوفن، کافئین، سایر گزاتین ها و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - به نظر نمی رسد مصرف این دارو باعث بروز ناهنجاری های مادرزادی و یا سایر عوارض گردد. اگرچه مصرف مقادیر زیاد کافئین در دوران بارداری ممکن است باعث اختلال در ریتم قلب جنین شود و بر روی رشد وی تأثیر بگذارد. لذا مصرف آن باید تحت نظر پزشک متخصص و باحتیاط انجام گیرد.

شیردهی - این دارو وارد شیر مادر می گردد، اگرچه بروز عوارض جانبی در کودکان شیرخوار گزارش نشده است. مطالعات نشان داده است که مصرف مقادیر زیاد کافئین توسط زنان شیرده باعث بروز عصبانیت و اشکال در به خواب رفتن نوزادان شیرخوار می گردد. لذا مصرف این دارو در دوران شیرده باید تحت نظر پزشک باشد.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی گردد.

۲- در افراد سالخورد، عوارض جانبی یا مشکلات متفاوت با افراد جوان تر گزارش نشده است.

۳- حضور بیماری های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید: سوء مصرف الکل، آسم، آرژی ها، سابقه پولیپ های بینی، هپاتیت یا سایر بیماری های کبدی و کلیوی - احتمال بروز عوارض جانبی جدی در این بیماریها ممکن است افزایش یابد.

بیماری قلبی - کافئین موجود در این دارو ممکن است باعث و خامت این بیماری گردد.

موارد احتیاط:

۱- در صورت مصرف طولانی مدت و یا مصرف مقادیر زیاد این دارو و همچنین به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. این موضوع بخصوص در افراد سالخورد که در مقایسه با افراد جوان تر به مشکلات کلیوی جدی مبتلا می گردند، اهمیت دارد.

۲- در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید :

• اگر این دارو را برای تسکین درد استفاده می نمایید، درد بیشتر از ۱ روز ادامه یابد (۵ روز برای کودکان) و یا بدتر شود و یا آن که عالیم جدید و قرمزی یا تورم ناحیه درد ایجاد شود.

• اگر این دارو را برای کاهش تب استفاده می نمایید، تب به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و یا آن که بدتر شود و یا اگر عالیم جدید و قرمزی و تورم ایجاد شود.

• اگر این دارو را برای گلو درد استفاده می نمایید، گلو درد بسیار دردناک شود و به مدت بیشتر از ۲ روز ادامه یابد و یا با تب، سردرد، بثورات جلدی، تهوع یا استفراغ همراه شود.

۳- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که حاوی استامینوفن می باشند، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

۴- مصرف همزمان برخی از داروهای مانند دیلکوفناک، فنوبروفن، اینپروفون، مفنامیک اسید، ناپروکسن، پیروکسیکام، سولیندیاک، تنوکسیکام، تولمتین با این دارو، احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش می دهد. از مصرف همزمان این داروها به مدت بیشتر از چند روز خودداری نمایید، مگر آن که پزشک تجویز نماید.

۵- این دارو ممکن است در نتایج برخی آزمون های پزشکی تأثیر بگذارد. لذا در صورت مصرف آن طی ۳ الی ۴ روز قبل از انجام آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

۶- مصرف این دارو ممکن است باعث نتایج کاذب در برخی آزمون های قند خون و ادرار شود. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در نتایج آزمایش با پزشک خود مشورت نمایید، بخصوص اگر بیماری شما تحت کنترل کامل قرار نگرفته باشد.

۷- کافئین ممکن است با نتایج آزمون اندازه گیری جریان خون در برخی از رگ های خونی که از آدنوزین یا دی پیریدامول استفاده می شود، تداخل نماید. بنابراین از مصرف این دارو به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمون اجتناب نمایید.

۸- در صورت مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو، بیمار باید سریعاً به مرکز فوریت های پزشکی منتقل گردد. عالیم مسمومیت با استامینوفن ممکن است ۲ تا ۴ روز پس از مصرف دارو ظاهر شود، اما به منظور جلوگیری از آسیب کبدی یا مرگ، درمان باید طی ۲۴ ساعت اول مسمومیت با دارو انجام پذیرد.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

مصرف طولانی مدت الکل، داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی - خطر سمیت کبدی با مصرف طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفن ممکن است در افراد الکلی و یا بیمارانی که از سایر داروهای با سمیت کبدی استفاده می نمایند، افزایش یابد.

مصرف طولانی مدت باریتوسورات ها (جز بوتالبیتال) یا پرمیدون باعث کاهش اثرات درمانی استامینوفن می گردد.

داروهای ضد انتقام خون کومارینی یا مشتق ایندندیون - مصرف همزمان و طولانی مدت مقادیر زیاد استامینوفن ممکن است اثر ضد انعقادی را افزایش دهد.

داروهای ضد التهاب غیر استروییدی، آسپیرین و سایر سالیسیلات ها - مصرف همزمان و طولانی مدت استامینوفن با یک سالیسیلات و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروییدی دیگر ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

نوشابهای حاوی کافئین، سایر داروهای حاوی کافئین و سایر داروهای محرك سیستم اعصاب موکزی - مصرف همزمان این داروها با کافئین همراه با تحریک بیش از حد سیستم اعصاب مرکزی بوده و ممکن است منجر به عصبانیت، تحریک پذیری، بی خوابی، احتمال تشنج و آریتمی قلب شود.

مکمل‌های حاوی کلسیم - مصرف مقداری بسیار زیاد کافئین ممکن است جذب کلسیم را مهار نماید.
لیتیم - کافئین باعث افزایش دفع کلیوی لیتیم می‌گردد و ممکن است اثر درمانی لیتیم را کاهش دهد.
داروهای مهار کننده منو آمین اکسیداز (MAO) شامل فوراژولیدون، پروکاربازین و سلجلیین - مصرف مقداری زیاد کافئین ممکن است باعث آریتمی قلبی یا افزایش شدید فشار خون شود. مقادیر کم کافئین ممکن است باعث تند شدن ضربان قلب و افزایش خفیف فشار خون شود.
ساپر گزانتین ها مانند آمینوفیلین، تئوبرومین و تئوفیلین - کافئین ممکن است دفع کلیوی تئوفیلین و احتمالاً سایر گزانتین‌ها را کاهش دهد و منجر به بروز اثرات سمعی آنها شود.

دخانیات - مصرف همزمان با تنباکو، سرعت دفع کافئین را افزایش می‌دهد.
داروهای ضد تشنج هیدانتوئینی بخصوص فنی توئین - مصرف همزمان با فنی توئین ممکن است دفع کلیوی کافئین را افزایش دهد.
اریتروماسین و ترولنادوماسین - مصرف همزمان ممکن است دفع کبدی کافئین را کاهش دهد.
داروهای پیشگیری از بارداری خودآکی - مصرف همزمان ممکن است متاپولیسم کافئین را کاهش دهد.
سیبروفلوکساسین و انوکساسین - متاپولیسم کبدی و دفع کلیوی کافئین ممکن است کاهش یابد.
ساپیتیدین - کاهش متاپولیسم کبدی کافئین باعث تأخیر در دفع و افزایش مقدار کافئین در خون می‌گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پیشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
برای درد، تب یا علایم خفیف آرتیت :

بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال به بالا - معمولاً ۱ یا ۲ قرص هر ۶ ساعت در روز است. حداقل مقدار مصرف ۸ عدد قرص در روز است.
کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای سردردهای میگرنی :
بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال به بالا - معمولاً ۲ قرص هر ۶ ساعت در روز است. مدت زمان مصرف این دارو در تسکین سردرد میگرنی نباید بیشتر از دو روز باشد، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- به منظور کاهش تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا یا یک لیوان آب میل نمایید.

۲- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، مصرف زیاد استامینوفن ممکن است منجر به آسیب کبدی یا سایر مشکلات گردد.

۳- مصرف این دارو ممکن است در تسکین درد شدید، قرمزی، تورم یا سفتی ناشی از التهاب مزمن یا شدید یا آرتیت روماتویید موثر نباشد، مگر آن که به مقداری زیاد و به مدت طولانی استفاده شود که با این روش توصیه نمی‌گردد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع یا نادر - سرفه؛ اشکال در بلع؛ گیجی؛ منگی یا احساس شدید سنکوب؛ گرگرفتگی، قرمزی یا سایر تغییرات رنگی پوست؛ کوتاه شدن یا اشکال در تنفس، احساس فشار در قفسه سینه، یا خس کردن؛ کاهش ناگهانی حجم ادرار؛ تورم پلکها، صورت یا لبهای مدفعه خونی، سیاه رنگ یا قیر مانند؛ ادرار خونی یا کدر؛ تب همراه با یا بدون لرز؛ درد شدید یا تیز در ناحیه تحتانی پشت یا پهلو؛ نقاط قرمز رنگ سوزنی شکل در پوست؛ بثورات جلدی، کهیر یا خارش؛ زخم یا لکه‌های سفید روی لبها یا در دهان؛ گلو درد؛ آبریزش بینی؛ تورم صورت، انگشتان، پاها یا پایین ساق‌ها؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیر عادی؛ استفراغ خون یا موادی مشابه ذرات قهوه؛ افزایش وزن؛ زردی چشم‌ها یا پوست.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل اشکال در به خواب رفتن، عصبانیت یا بیقراری با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارضی نظیر ادرار خونی یا کدر؛ کاهش حجم ادرار؛ تورم صورت، انگشتان، پاها یا پایین ساق‌ها؛ افزایش وزن، ممکن است پس از قطع مصرف دارو بروز نماید. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده اضطراب، هیجان، تحریک پذیری، عصبانیت یا بیقراری؛ از دست دادن حس شنوایی؛ ادرار خون آلود؛ اغتشاش شعور یا هدیبان؛ تشنج، اسهال شدید یا مداوم؛ گیجی یا منگی؛ خواب آلودگی شدید؛ تنفس سریع یا عمیق؛ ضربان سریع یا نامنظم قلب؛ تب؛ تکرار ادرار؛ توهمات؛ سردرد شدید یا مداوم؛ حساس‌تر شدن به لمس یا درد؛ افزایش تعریق؛ افزایش تشنجی؛ از دست دادن اشتها؛ انقباض یا گرفتگی عضلانی؛ تهوع یا استفراغ مداوم و گاهی خونی؛ صدا یا وزوز کردن مداوم در گوش‌ها؛ دیدن تصاویر نور به شکل زیگ زاگ؛ گرفتگی یا درد شدید یا مداوم معده؛ تورم، درد، یا حساس شدن بالای شکم یا معده؛ اشکال در به خواب رفتن؛ برهمن زدن غیر ارادی دستها، بخصوص در افراد سالخورد، بیمار باید فوراً به پزشک و یا مرکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۴۴۴۵ - ۰۲۹ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹

PMQC@abidipharma.com

info@abidipharma.com

www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدی

تأسیس ۱۳۲۵