

کدیمال^۹ به صورت قرص‌های خوراکی، سفید رنگ، کشیده، محدب و خط‌دار است. هر قرص به ترتیب حاوی ۳۲۵ و یا ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن است و در جعبه‌های ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

کدیمال^۹ برای تسکین درد (سردرد، دردهای عضلانی، درد پشت، سرماخوردگی، دندان‌درد و دردهای قبل و طی قاعدگی) و کاهش تب مصرف می‌شود. این دارو برای تسکین قرمزی، سفتی و یا تورم ناشی از آرتریت روماتوئید تجویز نمی‌گردد. اگرچه ممکن است برای تسکین درد ناشی از اشکال خفیف آرتریت مصرف شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به استامینوفن و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- مصرف همزمان با سایر فرآورده‌های حاوی استامینوفن

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - اگرچه مطالعات کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، ولیکن بروز مشکلات گزارش نگردیده است. مصرف این دارو با نظر پزشک در دوران بارداری مجاز است.
شیردهی - این دارو در مقادیر کم در شیر مادر ترشح می‌شود. تاکنون عوارض ناخواسته در نوزادان شیرخوار گزارش نشده است. بنابراین مصرف آن طی دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک معالج انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- مصرف این دارو در کودکان در مقایسه با گروه سنی بزرگسالان با عوارض جانبی متفاوت همراه نبوده است.
- ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، مشکلات وابسته به سن که مفید بودن مصرف این دارو را محدود نماید، نشان نداده است.
- ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
سوء مصرف الکل، بیماری شدید کلیه، هپاتیت یا سایر بیماری‌های کبدی - احتمال بروز عوارض ناخواسته ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط :

- ۱- در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
 - اگر این دارو را برای تسکین درد استفاده می‌نمایید، درد بیشتر از ۱۰ روز ادامه یابد (۵ روز برای کودکان) و یا بدتر شود و یا آن که علائم جدید و قرمزی یا تورم ناحیه درد ایجاد شود.
 - اگر این دارو را برای کاهش تب استفاده می‌نمایید، تب به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و یا آن که بدتر شود و یا اگر علائم جدید، قرمزی و تورم ایجاد شود.
 - اگر این دارو را برای گلودرد استفاده می‌نمایید، گلودرد بسیار دردناک شود و به مدت بیشتر از ۲ روز ادامه یابد و یا با تب، سردرد، بثورات جلدی، تهوع یا استفراغ همراه شود.
- ۲- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.
- ۳- مصرف همزمان برخی داروها با استامینوفن ممکن است احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. میزان خطر به مقدار مصرف روزانه هر یک از داروها و مدت زمان مصرف همزمان آنها بستگی دارد. اگر پزشک یا دندانپزشک شما مصرف همزمان این داروها را بر اساس یک برنامه مشخص تجویز نموده باشد، دستورات وی را به دقت دنبال نمایید.
- ۴- این دارو ممکن است در نتایج برخی آزمون‌های پزشکی تأثیر بگذارد. لذا در صورت مصرف آن طی ۳ الی ۴ روز قبل از انجام آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- ۵- مصرف این دارو ممکن است باعث نتایج کاذب در برخی آزمون‌های قند خون و ادرار شود. در صورت مشاهده هر گونه تغییر در نتایج آزمایش با پزشک خود مشورت نمایید، بخصوص اگر بیماری شما تحت کنترل کامل قرار نگرفته باشد.

۶- در صورت مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو، بیمار باید سریعاً به مرکز فوریت‌های پزشکی منتقل گردد. علائم مسمومیت با استامینوفن ممکن است ۲ تا ۴ روز پس از مصرف دارو ظاهر شود، اما به منظور جلوگیری از آسیب کبدی یا مرگ، درمان باید طی ۲۴ ساعت اول مسمومیت با دارو انجام پذیرد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
مصرف طولانی مدت الکل، داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی - خطر سمیت کبدی با مصرف طولانی مدت مقادیر زیاد استامینوفن ممکن است در افراد الکلی و یا بیمارانی که از سایر داروهایی با سمیت کبدی استفاده می‌نمایند، افزایش یابد.
مصرف طولانی مدت باربیتورات‌ها (بجز بوتالیتال) یا پریمیدون باعث کاهش اثرات درمانی استامینوفن می‌گردد.
داروهای ضد انعقاد خون کومارینی یا مشتقات اینداندیون - مصرف همزمان و طولانی مدت مقادیر زیاد استامینوفن ممکن است اثر ضد انعقادی را افزایش دهد.
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپیرین و سایر سالیسیلات‌ها - مصرف همزمان و طولانی مدت استامینوفن با یک سالیسیلات و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی دیگر ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
برای درد و تب:

بزرگسالان و افراد بالاتر از ۱۲ سال - ۳۲۵ یا ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۳ تا ۴ ساعت، ۶۵۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت و یا ۱۰۰۰ میلی‌گرم هر ۶ ساعت یک بار در صورت نیاز است. حداکثر مقدار مصرف ۴۰۰۰ میلی‌گرم در روز است.
کودکان کمتر از ۱۲ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، مصرف مقادیر زیاد استامینوفن ممکن است منجر به آسیب کبد و کلیه شود.
۲- در صورت مصرف این دارو بر اساس یک برنامه مشخص و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف آن، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل نمایید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
نادر - زردی چشم‌ها یا پوست؛ مدفوع خونی، سیاهرنگ یا قیر مانند؛ ادرار خونی یا کدر؛ تب همراه با یا بدون لرز (قبل از درمان وجود ندارد)؛ درد شدید یا تیز در ناحیه تحتانی پشت یا پهلو؛ نقاط قرمز رنگ سوزنی شکل در پوست؛ بثورات جلدی، کهیر، یا خارش؛ زخم یا لکه‌های سفید رنگ روی لبها یا در دهان؛ گلودرد (قبل از درمان وجود ندارد)؛ کاهش ناگهانی در مقدار ادرار؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی و خستگی یا ضعف غیرعادی.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر اسهال؛ افزایش تعریق؛ کاهش اشتها؛ تهوع یا استفراغ؛ انقباضات یا درد معده؛ ورم، درد یا حساس شدن ناحیه بالای شکم یا معده، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب و یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌نماید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

تاریخ تدوین: ۹۶/۰۳/۱۶