



کدیمکس® به صورت کپسول های خوارکی و به رنگ سفید است. هر کپسول حاوی ۳۲۵ میلی گرم استامینوفن، ۴۰ میلی گرم کافئین و ۲۰۰ میلی گرم ایبوپروفن است و در جعبه های ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

موارد مصرف: کدیمکس® برای تسکین موقتی دردهای خفیف ناشی از سرماخوردگی، سردگر، دندان درد، دردهای عضلانی، درد پشت، درد خفیف آرترویت، دردهای قاعده‌ی و کاهش موقت تپ بکار می‌رود.

راهنمایی‌های عمومی:
این دارو برای بیماری‌های شعاعی شما مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز پرسانید:
- ۱- وجود هرگونه حساسیت - ۲- بارداری یا شیردهی

موارد منع مصرف:

- ۱- سایقه حساسیت به استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن و هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- سایقه و اکنش آرژیک شدید مانند آنافیلاکسی یا آنژیوادم، آسم، آبریزش بینی، کهیرون و پولیپ‌های بینی همراه با برونوکواسیاسم (اسیاسم برونش) ناشی از مصرف آسیب‌پرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- ۳- مصرف هم‌مان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ایبوپروفن و کافئین
- ۴- جهت درمان دردهای پیش از جراحی با پس سرخرگ کرونت قلب
- ۵- مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - به تنظر نمی‌رسد مصرف این دارو باعث بروز ناهنجاری‌های مادرزادی و یا سایر عوارض در جنبین گردد. اگرچه مصرف مقادیر زیاد کافئین در دوران بارداری ممکن است باعث اختلال در ریتم قلب و رشد جنبین شود. مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک متخصص و با اختیاط انجام گیرد.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد، اگرچه بروز عوارض جانبی در کودکان شیرخوار گزارش نشده است. مطالعات نشان داده است که وجود مقادیر زیاد کافئین در شیر زنان شیرده باعث بروز تحریک پذیری و عصبانیت در نوزادان شیرخوار می‌گردد. لذا مصرف این دارو طی دوران شیردهی باید تحت نظر پزشک باشد.

هشدارهای:

- ۱- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌گردد.
- ۲- برخی عوارض جانبی مانند اغتشاش شعور، روم صورت، یا ساق‌ها، کاهش ناگهانی مقدار ادرار و مشکلات گوارشی در افراد سالخورده که در مقایسه با افراد جوان حساس‌تر می‌باشند، گزارش شده است.
- ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
 - سوء مصرف الکل، آسم، آلوژی‌ها، بیماری‌های گوارشی، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، صرع و اختلالات تشنجی، سایقه پولیپ‌های بینی، هیاتیت یا سایر بیماری‌های کبدی و کلیوی - احتمال بروز عوارض جانبی جدی در این بیماریها ممکن است افزایش یابد.

بیماری‌های قلبی عروقی - ایبوپروفن و کافئین موجود در این دارو ممکن است باعث و خامت این بیماریها گردد.

موارد احتیاط:

- ۱- در صورت مصرف طولانی مدت و یا مصرف مقادیر زیاد این دارو و همچنین به منظور بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. این موضوع بخصوص در افراد سالخورده که در مقایسه با افراد جوان تر به مشکلات کلیوی جدی مبتلا می‌گردند، اهمیت دارد.
- ۲- در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
 - اگر این دارو را برای کاهش تب استفاده می‌نمایید، درد استفاده می‌نمایید، درد بیشتر از ۱۰ روز ادامه یابد (۵ روز برای کودکان) و یا بدتر شود و یا آن که علایم جدید و قرمزی یا تورم تاحیه درد ایجاد شود.
 - اگر این دارو برای گلودرده استفاده می‌نمایید، گلودرده سپیار دردناک شود و به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و یا با تب، سردگر، بثورات جلدی، تهوع یا استفراغ همراه شود.
 - مصرف هم‌مان این دارو با سایر داروهای که حاوی استامینوفن، ایبوپروفن و یا کافئین می‌باشند، ممکن است منجر به بروز اثرات ناخواسته و یا مسمومیت دارویی گردد.
 - مصرف هم‌مان برخی از داروها مانند دیکلوفناک، فنوتیوفن، ایندوماتاسین، کنپوروفن، مفتانیک اسید، نایپروکسین، پیروکسیکام، سولینداک، تونکسیکام، تولمتین با این دارو، احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش می‌دهد.
 - این دارو ممکن است در نتایج برخی آزمون‌های پزشکی تأثیر بگذارد. لذا در صورت مصرف آن طی ۳ الی ۴ روز قبل از انجام آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نماید.
 - مصرف این دارو ممکن است باعث نتایج کاذب در برخی آزمون‌های قند خون و ادرار شود. در صورت مشاهده هرگونه تغییر در نتایج آزمایش با پزشک خود مشورت نمایید.
 - کافئین ممکن است با نتایج آزمون اندازه‌گیری جربان خون در برخی از رگ‌های خونی که از آذونزین با دی‌پیریدامول استفاده می‌شود، تداخل نماید. بنابراین از مصرف این دارو به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمون اجتناب نمایید.

- ۸- در هنگام مصرف این دارو، از آشامیدن مقادیر زیاد نوشابه‌های حاوی کافئین، قهوه و چای خودداری نمایید.
- ۹- کافئین ممکن است باعث عصبانیت، تحریک پذیری، اشکال در بخواب رفت، گیجی و ضربان سریع و یا کوینده قلب گردد. در صورت بروز این عوارض، از مصرف این دارو و نوشابه‌های حاوی کافئین خودداری نمایید.
- ۱۰- به منظور جلوگیری از مشکل به خواب رفت، این دارو یا نوشابه‌های حاوی کافئین را با فاصله مناسب تا هنگام خواب مصرف نمایید.
- ۱۱- مصرف هم‌مان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه‌های حاوی الكل ممکن است باعث مشکلات بینی ممده‌ای شود.

- ۱۲- درمان با این دارو می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی شود. گاهی اوقات این عوارض می‌تواند بدون علایم باشد. اگرچه علایم هشدار دهنده مانند درد شدید معده، مدفوع سماهونگ و قیری شکل، استفراغ خون یا مواد مشابه با دانه‌های قهوه، افزایش غیر عادی وزن و بثورات جلدی اعلیٰ در هنگام مصرف نماید.
- ۱۳- این دارو ممکن است باعث اغتشاش شعور، خواب آلودگی، گیجی، منگی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد. همچنین ممکن است علایم جدی بیماری‌های قلبی مانند درد قفسه سینه، ضربان سریع یا نامنظم قلبی، گرفگرفتگی غیر عادی یا گرمای پوست بروز نماید. در چنین مواردی سریعاً صرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.

- ۱۴- این دارو ممکن است باعث اغتشاش شعور، خواب آلودگی، گیجی، منگی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد. همچنین ممکن است باعث تاری دید یا سایر مشکلات بینی‌ای در برخی افراد شود. لذا توصیه می‌گردد قبل از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشایی کامل دارد، اختیاط نمایید.
- ۱۵- برخی افراد در هنگام مصرف این دارو ممکن است نسبت به نور خورشید بیشتر حساس باشند. تماس با نور خورشید حتی اگر به مدت کوتاه باشد ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، ایجاد تاول بر روی پوست، بثورات جلدی، قرمزی، خارش با تغییر رنگ پوست و تغییرات پیشانی گردد.

- ۱۶- در صورت مشاهده لرزه، تب، درد یا کوفوتگی عضلات و سایر علایم مشابه با انسفولانزا بخصوص اگر با بثورات جلدی همراه گردد، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید. این اثرات ممکن است بندرت اولین علایم ناشی از عوارض جانبی دارو باشد.
- ۱۷- مصرف این دارو ممکن است باعث یک واکنش آنافیلاکسی گردد. این واکنش اغلب در بیمارانی بروز می‌نماید که به آسیب‌پرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند. در آنفالیکسی به درمان‌های فوریت دار پزشکی نیاز است. از بیشترین علایم این واکنش می‌توان به تنفس سریع یا نامنظم، خس کردن و سنتکوب اشاره نمود. از سایر علایم می‌توان تغییر رنگ پوست صورت؛ ضربان قلب یا نبض سریع یا نامنظم؛ ورم کهیرون مانند پوست و ورم پلک‌ها را نام برد. در چنین شرایطی، بالاگله درمان‌های فوریت دار پزشکی موردنیاز است.

- ۱۸- در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، بیمار باید سریعاً به مرکز فوریت‌های پزشکی منتقل گردد. علایم مسمومیت با استامینوفن ممکن است ۲ تا ۴ روز پس از مصرف دارو ظاهر شود، اما به منظور جلوگیری از آسیب کبدی یا مرگ، درمان باید طی ۲۴ ساعت اول مسمومیت با دارو انجام پذیرد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

صرف طولانی مدت کلک، داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی - خطر سمیت کبدی با مصرف طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفون ممکن است در افراد کلکی و یا بیمارانی که از سایر داروهایی با سمیت کبدی استفاده می‌نمایند، افزایش یابد.

صرف طولانی مدت باربیترات‌ها (بجز بوتالپیتال) یا پرمیدون باعث کاهش اثرات درمانی استامینوفون می‌گردد.

داروهای ضد عقد خون کومارینی یا مشتق‌ات ایندانیون - مصرف همزمان و طولانی مدت مقادیر زیاد استامینوفون و ایبوپروفن ممکن است اثر ضد انعقادی را افزایش دهد.

داروهای ضد التهاب غیر استروییدی، آسپیرین و سایر سالیسیلات‌ها - مصرف همزمان و طولانی مدت استامینوفون با یک سالیسیلات و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروییدی دیگر ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

توشاوهای حاوی کافئین، سایر داروهای حاوی کافئین و سایر داروهای محرك سیستم اعصاب مرکزی - مصرف همزمان این داروها با کافئین همراه با تحریک بیش از حد سیستم اعصاب مرکزی بوده و ممکن است منجر به عصبانیت، تحریک پذیری، خواهی، احتمال تشنج و ارتیمتی قلب شود.

مکمل‌های حاوی کلریم - مصرف مقادیر بسیار زیاد کافئین ممکن است جذب کلریم را مهار نماید.

داروهای مهار کننده متامین آکسیدار (MAO) شامل فوارازولیدون، بروکاربازن و سجیلین - مصرف مقادیر زیاد کافئین ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

شدن ضربان قلب و افزایش خفیق فشار خون شود.

سایر گزانتین‌ها مانند آمنوفیلین، تیوفیلین و تیوفیلین - کافئین ممکن است دفع کلیوی تیوفیلین و احتمالاً سایر گزانتین‌ها را کاهش دهد و منجر به بروز اثرات سمی آنها شود.

دخانیات - مصرف همزمان با تباکو، سرعت دفع کافئین را افزایش می‌دهد.

داروهای ضد تشنج هیدانتوئین بخصوص فتی توئین - مصرف همزمان با فتی توئین ممکن است دفع کلیوی کافئین را افزایش دهد.

ارتروماسین و تروتلاندوماسین - مصرف همزمان ممکن است دفع کبدی کافئین را کاهش دهد.

داروهای پیشگیری از بارداری خوارکی - مصرف همزمان ممکن است متاپولیسم کافئین را کاهش دهد.

سبروفلوکساسین و اونکساسین - متاپولیسم کبدی و دفع کلیوی کافئین ممکن است کاهش یابد.

سامپتیدین - کاهش متاپولیسم کبدی کافئین باعث تأخیر در دفع و افزایش مقدار کافئین در خون می‌گردد.

مهار کننده‌ای آنزیم مبدل آنزیوتاپسین - احتمال کاهش اثرات ضد فشار خون این داروها و افزایش بیماری کلیوی گزارش شده است.

الکل، کورتیکوستروتیدهای خوارکی، کورتیکوتروپین و مکمل‌های حاوی پتاسیم - احتمال کاهش اثرات ضد فشار خون بروز مشکلات جدی معده مانند زخم و خونریزی ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد انعقاد، هارپین، پلیکاماپسین، والبرونیک اسید - خطر خونریزی ممکن است افزایش یابد.

سیکلوسوزورین، گلیکوژیدهای دیپتالیس، لیتیم، متواترکسات و فتی توئین - مقدار این داروها در خون و همچنین احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.

پروپنسید - مقدار ایبوپروفن در خون و احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.

تریامترن - احتمال بروز مشکلات کلیوی ممکن است افزایش یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پیش‌تیغ می‌کنند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درد، تب یا علایم خفیف آرتیتی: بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال به بالا - معمولاً ۱ یا ۲ کیپسول هر ۶ الی ۱۲ ساعت در روز است. حداکثر مقدار مصرف ۶ عدد کیپسول در روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای سوددههای میگوئی: بزرگسالان و نوجوانان ۱۲ سال به بالا - معمولاً ۲ کیپسول در روز است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این نظرور کاهش اثرات تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا یا یک لیوان آب میل نمایید. پس از مصرف دارو، به مدت حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در حالت خوابیده قرار نگیرید. در غیر اینصورت، تحریکات ممکن است منجر به اشکال در بلع گردد.

۲- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف تماشی، مصرف زیاد استامینوفون ممکن است منجر به آسیب کبدی یا سایر مشکلات گردد.

۳- مصرف این دارو ممکن است در تسکین درد شدید، قرمزی، تورم یا سفتی ناشی از التهاب مزمن یا شدید یا آرتیت روماتویید موثر نیاید، مگر آن که به مقادیر زیاد و به مدت طولانی استفاده شود که با این روش توصیه نمی‌گردد.

۴- چیز جالب‌گیری از خواهی، از مصرف این دارو در هنگام خواب خودداری فرمایید.

۵- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض زیر سریعاً باشد. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پیشک یا داروساز خود مشورت نمایید: گمتر شایع یا نادر - سرفه؛ اشکال در بلع؛ گیجی؛ منگی با احساس شدید سنکوب؛ تنفس سریع و نامنظم؛ خربیان سریع و نامنظم قلب؛ گرگفتگی؛ ضربان سریع یا نامنظم قلب؛ تکنگی نفس یا اشکال در تنفس؛ کاهش ناگهانی حجم ادرار؛ مدفع خونی، سیاه رنگ یا قیر مانند؛ ادرار خونی یا کدر؛ تب همراه با یاد بدون لرز؛ درد شدید یا تبز در ناحیه تحتانی پشت یا پهلو؛ نقاط قرمز رنگ سوزنی شکل در پوست؛ بثورات جلدی، کهپر با خارش؛ رُخم یا لکه‌های سفید روی لبهای پوستی؛ تورم پلکها؛ صورت یا لبهای اگشتنان، پاهای یا پایین ساق‌ها؛ خونریزی یا کبودی غیر عادی؛ خستگی یا ضعف غیر عادی؛ استفراغ خون یا موادی مشابه ذرات قهقهه؛ افزایش وزن؛ زردی چشمها یا یوست.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل اشکال در به خواب رفتن؛ عصبانیت یا بیقراری؛ واکنش پوست به نور؛ انقباضات، درد یا ناراحتی خفیف تا متوسط شکم یا معده؛ اسهال؛ گیجی؛ خواب آلودگی؛ سردد خفیف تا متوسط؛ سوزش معده؛ سوء هاضمه؛ تهوع و استفراغ با پیشک خود مشورت نمایید.

عوارضی نظیر ادرار خونی یا کدر؛ کاهش حجم ادرار؛ تورم یا افزایش وزن ممکن است پس از قطع مصرف دارو بروز نماید. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، سریعاً با پیشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پیشک یا بیقراری؛ از دست دادن حس شنایی؛ ادرار خون آلود؛ اشتشاش شعر بیانی؛ تشنج، اسهال شدید یا مداوم؛ گیجی یا منگی؛ خواب آلودگی شدید؛ تنفس سریع یا عمیق؛ ضربان سریع یا نامنظم قلب؛ تکرر ادرار؛ توهمات؛ سردد شدید یا مداوم؛ حساسیت شدید به لمس یا درد؛ افزایش تعریق؛ افزایش تشنگی؛ از دست دادن شتها؛ اتفاقاً یا گرفتگی عضلاتی؛ تهوع یا استفراغ مداوم و گاهی خونی؛ صدا یا وزوز کردن مداوم در گوش‌ها؛ گرفتگی، درد شدید یا مداوم معده؛ اشکال در به خواب رفتن؛ مشکلات بینایی و خستگی شدید، بیمار باید فوراً به پیشک یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کوکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدی

فاسس ۱۳۲۵

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۷، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۲۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۹۷/۰۳/۲۳

