

کلداکس® روز و شب به صورت قرص‌های خوارکی، روکشدار، خطدار، کشیده، محدب و به رنگ‌های زرد (روز) و آبی (شب) می‌باشدند. هر قرص روز حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن، ۵ میلی‌گرم فنیل افرين هیدروکلرايد و ۱۵ میلی‌گرم دکسترومتروفان هیدروبرمايد و هر قرص شب حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن، ۵ میلی‌گرم فنیل افرين هیدروکلرايد، ۱۵ میلی‌گرم دکسترومتروفان هیدروبرمايد و ۲ میلی‌گرم کلرفیرامین مالثات است که در نوارهای ۸ عددی قرص (۶ عدد قرص روز و ۲ عدد قرص شب) و جعبه ۱۶ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

این دارو برای برطرف نمودن علایم درد، احتقان سینوس، آبریزش بینی، عطسه و سرفه ناشی از سرماخوردگی‌ها، عفونت‌های مجاری تنفسی فوقانی و آلرژی‌ها بکار می‌رود. راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت
- بارداری یا شیردهی
- در صورت رعایت هو گونه رژیم غذایی خاص مانند کم نمک یا کم قند
- استفاده از سایر داروها
- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

۱- سابقة حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
۲- نوزادان تازه متولد شده یا نارس

۳- زنان شیرده
۴- آب سیاه چشم با زاویه باریک
۵- بزرگ شدن علامتی پروستات

۶- انسداد گردن مثانه
۷- مصرف همزمان یا طی ۱۴ روز اخیر در بیماران تحت درمان با فورازولیدون و یا داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (مانند فلزین)

۸- درمان علایم مجاری تنفسی تحتانی شامل آسم و حملات آسمی

۹- فشار خون بسیار بالا، بیماری شدید عروق خونی قلب، ضربان سریع قلب و یا بیماری‌های قلبی شدید

صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - بنظر نمی‌رسد مصرف موردي این دارو باعث بروز مشکلات در جنین یا نوزاد تازه متولد شده گردد، اگر چه مصرف مقادیر بیشتر و یا به مدت طولانی احتمال بروز خطر را افزایش می‌دهد. مصرف این دارو با نظر پزشک متخصص در دوران بارداری مجاز است.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته مانند هیجان یا تحریک‌پذیری غیرعادی در کودک شیر خوار گردد، ضمن آن که ممکن است جریان شیر را نیز کاهش دهد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- کودکان با سن بسیار پایین معمولاً به اثرات این دارو بیشتر حساس می‌باشند. احتمال بروز کابوس‌های شبانه، هیجان غیرعادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک‌پذیری و افزایش فشار خون در کودکان بیشتر است.

۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند. اغتشاش شعور، توهمات، اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک، گیجی، خواب آلودگی، حملات تشنジ، افزایش فشار خون، احساس از حال رفت، خشکی دهان، بینی و گلو، کابوس‌های شبانه یا هیجان غیر عادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک‌پذیری ممکن است بیشتر در افراد مسن بروز نماید.

۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نماید:

سابقه اعتیاد به الكل - استامینوفن موجود در این دارو، احتمال آسیب کبدی را افزایش می‌دهد.

بیماری قند (دیابت ملیتوس) - فنیل افرين موجود در این دارو ممکن است خطر بیماری‌های قلبی یا عروقی در بیماران مبتلا به بیماری قند را افزایش دهد.

بزرگ شدن پروستات، انسداد دستگاه ادراری یا اشکال در دفع ادرار - برخی اثرات کلرفیرامین مالثات ممکن است باعث خامت مشکلات ادراری گردد.

گلوكوم - افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است بروز نماید.

بیماری کبد - به دلیل احتمال تجمع این دارو در بدن، شناس بروز عوارض جانی افزایش می‌باید.

بیماری‌های قلبی یا عروقی و فشار خون بالا - فنیل افرين موجود در این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.

بیماری کلیه - احتمال بروز اثرات ناخواسته این دارو به دلیل تجمع آن در بدن ممکن است افزایش یابد.

پُرکاری غده تیروئید - در پُرکاری غده تیروئید که منجر به ضربان سریع قلب شده است، فنیل افرين موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

موارد احتیاط:

۱- در صورت عدم بهبودی سرفه به مدت بیشتر از ۷ روز از شروع مصرف دارو یا مشاهده تب بالا، بثورات جلدی، سردهد مداوم یا گلودرد همراه با سرفه با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- نتایج آزمون‌های پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می‌گیرد، ممکن است تحت تأثیر مصرف این دارو واقع شود. بنابراین لازم است قبل از انجام هر گونه آزمون فوق، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نماید.

۳- در صورت سوء مصرف الكل؛ مصرف سایر داروهای ضد هیستامین یا داروهای مؤثر بر تب یونجه، سایر آلرژی‌ها و سرماخوردگی‌ها؛ مسکن‌های آرام بخش‌ها یا داروهای خواب آور؛ داروهای ضد درد با نسخه یا مخدراه؛ باربیتورات‌ها؛ داروهای ضد تشنج؛ شل کننده‌های عضلانی؛ داروهای بیهوشی شامل بی‌حس کننده‌های دندان با پزشک

معالج خود مشورت کنید.

۴- این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی، گیجی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

۵- اثرات ناشی از مصرف مقادیر زیاد آسپیرین مانند صدا کردن در گوش، ممکن است با مصرف قرص شب (به علت کلرفنیرآمین مالات موجود) مخفی گردد.

۶- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان گردد. برای تسکین موقت خشکی دهان می‌توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های بخ در دهان و یا جانشین‌های بزرگ استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته، دندانپزشک خود را مطلع نمایید. طولانی شدن خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماری‌های دندان و لثه و عفونت‌های قارچی گردد.

۷- این دارو ممکن است اثرات تحریکی داروهای رژیمی بر روی سیستم عصبی مرکزی را افزایش دهد. لذا از مصرف همزمان این دارو با داروهای رژیمی یا کنترل کننده آشتها، بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.

۸- این دارو ممکن است باعث عصبانیت، بیقاراری یا اشکال در به خواب رفتن در برخی افراد گردد. در صورت اشکال در به خواب رفتن، آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از زمان خواب مصرف نمایید.

۹- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جویان مصرف این دارو قرار دهید.

۱۰- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

تداخل‌های دارویی:

بنابلوکرهای (مانند بروپراپانول)، فورازولیدون، ایندوموتاسین، ایزوپیازید، مهارکننده‌های متوازن اکسیداز (مانند فنتلزین)، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای - اثرات ناخواسته کلداکس[®] روز و شب ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد انعقاد خون (مانند وارفارین)، دیگوکسین - احتمال بروز خونریزی، ضربان نامنظم قلب یا حمله قلبی ممکن است افزایش یابد.

بروموکریپتین یا هیدانتوئین (مانند فنی توئین) - اثرات ناخواسته این داروها ممکن است با مصرف کلداکس[®] روز و شب افزایش یابد.

گوانوتیدین، مکامیل آمین، متیل دوپا، رزپین - کارآیی این داروها ممکن است با مصرف کلداکس[®] روز و شب کاهش یابد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
بزرگسالان و افراد بالاتر از ۱۲ سال: ۲ قرص هر ۶ ساعت یک بار است. مقدار مصرف نباید بیشتر از ۸ قرص (بزرگسالان) و ۴ قرص (افراد ۱۲ سال به بالا) در طی ساعت باشد.

کودکان کمتر از ۱۲ سال: مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- مصرف یک لیوان آب پس از هر نوبت مصرف دارو، به نرم کردن موکوس یا خلط موجود در ریه‌ها کمک می‌نماید.

۲- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید.

۳- به منظور کاهش تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا یا یک لیوان آب یا شیر میل نمایید.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو بندرت عوارض جانبی جدی بروز نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد، در مقادیر مصرف بالا و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:
بثورات جلدی، کهیر و یا خارش؛ از دست دادن مهارت در انجام کار یا بی‌ثباتی؛ حملات تشنجی؛ خواب آلودگی شدید؛ خشکی شدید دهان، بینی یا گلو؛ برافروختگی یا قرمزی صورت؛ توهمنات؛ بیقراری شدید؛ کوتاه شدن تنفس یا اشکال در نفس کشیدن؛ ضربان سریع یا آهسته قلب؛ گلودرد و تب نامشخص؛ خستگی یا ضعف غیرعادی؛ زرد شدن چشم‌ها یا پوست.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل بیبوست؛ کاهش تعریق؛ اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک؛ گیجی یا منگی؛ خواب آلودگی؛ خشکی دهان، بینی یا گلو؛ احساس کاذب خوب بودن؛ افزایش حساسیت پوست به نور خورشید؛ تهوع یا استفراغ؛ کابوس‌های شبانه؛ درد معده؛ غلیظ شدن ترشحات موکوس؛ اشکال در به خواب رفتن؛ هیجان، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیرعادی با پزشک مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظیر اسهال؛ افزایش تعریق؛ از دست دادن اشتها، تهوع یا استفراغ؛ انصبابات یا درد معده؛ تورم یا حساس شدن بالای شکم یا ناحیه معده؛ ضربان سریع، کوبنده یا نامنظم قلب؛ سردرد مداوم و شدید؛ تهوع یا استفراغ شدید؛ عصبانیت یا بیقراری شدید؛ تنگی نفس یا اشکال در تنفس شدید یا مداوم، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۵۶
تلفن شکایات: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۷۷۷
دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۷۷۷
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۰۲۱-۴۴۵۰۰۷۷۷
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: info@abidipharma.com
پست الکترونیک: www.abidipharma.com
سایت اینترنتی: طیبی ۱۳۷۵

