

Coldax® Flu

Acetaminophen / Phenylephrine HCl

کلداکس® آنفلوانزا

استامینوفن / فنیل افیرین هیدروکلراید

کلداکس® آنفلوانزا به صورت قرص های خوارکی، آبی رنگ، کشیده، محدب و خط دار می باشد. هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی گرم استامینوفن و ۵ میلی گرم فنیل افیرین هیدروکلراید است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- ۵- ابتلاء به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- مصرف همزمان و یا در طی دو هفته اخیر با داروهای مهار کننده منو آمین اکسیداز

۳- مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال

۴- مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن، داروهای ضد احتقان یا ضد سرفه و سرماخوردگی

صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - به نظر نمی رسد مصرف مورده این دارو باعث بروز مشکلات در جنین یا نوزاد تازه متولد شده گردد. مصرف این دارو طی دوران بارداری باید با نظر پزشک معالج انجام گیرد.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته در کودک شیرخوار گردد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با نظر پزشک انجام گیرد.

هشدارها:

۱- کودکان با سن بسیار پایین معمولاً به اثرات این دارو بیشتر حساس می باشند. احتمال بروز افزایش فشار خون در کودکان بیشتر است. مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی گردد.

۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می باشند.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
سابقه اعتیاد به الكل - استامینوفن موجود در این دارو احتمال آسیب کبدی را افزایش می دهد.

بیماری قند (دیابت ملیتوس) - فنیل افیرین موجود در این دارو ممکن است خطر بیماریهای قلبی یا عروقی در بیماران مبتلا به بیماری قند را افزایش دهد.
هپاتیت یا سایر بیماریهای کبد - به دلیل احتمال تجمع این دارو در بدن، شناس بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

بیماریهای قلبی یا عروق خونی و فشار خون بالا - فنیل افیرین موجود در این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.
بیماری کلیه - اگر دارو به مقادیر زیاد و به مدت طولانی مصرف گردد، ممکن است کلیه ها را تحت تأثیر قرار دهد.

پُرکاری غده تیروئید - در پُرکاری غده تیروئید که منجر به ضربان سریع قلب شده است، فنیل افیرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

موارد احتیاط :

۱- در صورت عدم بهبودی علایم و یا وخیم شدن آنها و یا مشاهده تب بالا، با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- این دارو ممکن است باعث عصبانیت، بیقراری یا اشکال در به خواب رفتن در برخی افراد گردد. در صورت اشکال در به خواب رفتن، آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از زمان خواب مصرف نمایید.

۳- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

۴- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه های حاوی الكل، ممکن است باعث آسیب کبدی شود.

۵- مصرف همزمان این دارو با داروهای کنترل کننده اشتها باید با احتیاط انجام گیرد.

- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

کومارین‌ها (شامل وارفارین) - با مصرف روزانه استامینوفن به مدت طولانی، اثر ضد انعقادی ممکن است افزایش یابد که منجر به احتمال خونریزی می‌گردد. در چنین شرایطی ممکن است مقدار مصرف داروهای ضد انعقاد کاهش یابد.

داروهای افزایش دهنده تخلیه معده (مانند متوكلوبرامید) - این مواد جذب استامینوفن را افزایش می‌دهند.

داروهای کاهش دهنده تخلیه معده (مانند پروپانتلین، داروهای ضد افسردگی با اثرات آنتی‌کولینرژیک، داروهای ضد درد مخدر) - این مواد جذب استامینوفن را کاهش می‌دهند.

داروها با احتمال سمیت کبدی یا داروهای القاء‌کننده آنزیم‌های میکروزومی (مانند الکل، داروهای ضد تشنج) - احتمال سمیت با استامینوفن ممکن است افزایش یابد.

پروبنسید - ممکن است بر روی دفع استامینوفن تأثیر بگذارد و مقدار آن را در خون تغییر دهد.

کلستیرامین - اگر همزمان یا در طی یک ساعت با استامینوفن مصرف شود، جذب استامینوفن را کاهش می‌دهد.

داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز - مصرف همزمان با فنیل افرین ممنوع است.

آمین‌های سمتاومیمیک - مصرف همزمان فنیل افرین یا سایر آمین‌های سمتاومیمیک می‌تواند باعث افزایش احتمال بروز عوارض جانبی قلبی عروقی گردد. بتاپلوكرها و سایر داروهای کاهنده فشار خون (شامل دبریزوکین، گوانتیدین، رزربین، متیل دوبا) - فنیل افرین ممکن است کارآیی داروهای بتاپلوكر و داروهای

کاهنده فشار خون را کاهش دهد. خطر افزایش فشار خون و سایر عوارض جانبی قلبی عروقی ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (مانند آمی‌تریپتیلین) - خطر عوارض جانبی قلبی عروقی فنیل افرین ممکن است افزایش یابد.

دیگوکسین و گلیکوزیدهای قلبی - خطر ضربان نامنظم قلب یا حمله قلبی را افزایش می‌دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درد و احتقان سینوس:

بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال - ۱ تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار در روز است. مقدار مصرف نباید بیشتر از ۸ عدد قرص در روز باشد.

کودکان کمتر از ۱۲ سال - مصرف آن توصیه نمی‌گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این داروا فقط براساس دستور پزشک و یا راهنمای دارو مصرف نمایید. از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید، مگر آن که پزشک تجویز نموده باشد.

۲- از مصرف آن به مدت بیشتر از ۴۸ ساعت در کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

۳- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موزات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو بندرت عوارض جانبی جدی بروز می‌نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

و اکنش‌های آرژیک؛ کم خونی؛ عوارض قلبی؛ تحریک سیستم اعصاب مرکزی؛ گیجی شدید؛ عصبانیت یا بیقراری شدید؛ دیسکرازی خونی؛ هپاتیت (التهاب کبد) و سمیت کبدی

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظیر بیقراری؛ تحریک پذیری؛ افزایش فشار خون؛ کند شدن ضربان قلب رفلکسی؛ اغتشاش شعور؛ توهمندی و حملات تشنجی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدیف

سایت: www.abidipharma.com

تلفن: ۰۲۱ - ۰۴۵۰۰۲۲۹

فاکsim: ۰۲۱ - ۰۴۵۰۰۴۷۸۷

ایمیل: info@abidipharma.com

ایمیل: PMQC@abidipharma.com

ایمیل: info@abidipharma.com

ایمیل: www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۴/۲/۲۷

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۸، خیابان دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶ تلفن: ۰۲۱ - ۰۴۵۰۰۲۲۹
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com