

کلداکس® سینوس و آلرژی به صورت قرص‌های خوراکی سفید، کشیده، محدب و خط‌دار می‌باشد. هر قرص حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم استامینوفن، ۵ میلی‌گرم فنیل‌افرین هیدروکلراید و ۲۵ میلی‌گرم دیفن‌هیدرامین هیدروکلراید است که در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه‌های ۲۰ و یا ۵۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- نوزادان تازه متولد شده یا نارس
- ۳- زنان شیرده
- ۴- آب سیاه چشم با زاویه باریک
- ۵- زخم معده
- ۶- بزرگ شدن علامتی پروستات
- ۷- انسداد گردن مثانه
- ۸- انسداد معده - روده
- ۹- مصرف همزمان در بیماران تحت درمان با داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - بنظر نمی‌رسد مقادیر کم و یا کوتاه مدت این دارو باعث بروز مشکلات در جنین یا نوزاد تازه متولد شده گردد، اگر چه مصرف مقادیر بیشتر و یا به مدت طولانی شانس خطر را افزایش می‌دهد. مصرف این دارو با نظر پزشک در دوران بارداری مجاز است.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته مانند هیجان یا تحریک پذیری غیرعادی در کودک شیرخوار گردد، ضمن آن که ممکن است جریان شیر را نیز کاهش دهد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- کودکان با سن بسیار کم معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند. عوارض ناخواسته نظیر افزایش فشار خون، کابوس‌های شبانه، هیجان غیر عادی، عصبانیت، بیقراری، تحریک پذیری و همچنین تغییرات ذهنی ممکن است بیشتر در کودکان ایجاد شود. لذا مصرف آن باید تحت نظر پزشک معالج صورت گیرد.

۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند. اغتشاش شعور، اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک، گیجی، خواب‌آلودگی، احساس از حال رفتن، خشکی دهان، بینی و گلو، کابوس‌های شبانه یا هیجان غیر عادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری ممکن است بیشتر در افراد مسن بروز نماید.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید. اعتیاد به الکل - استامینوفن موجود در این دارو شانس آسیب کبدی را افزایش می‌دهد.

آسم، آلرژی‌ها، پولیپ‌های بینی یا سابقه آن و حملات آسمی - اگر چه مصرف دیفن‌هیدرامین باعث باز شدن مجاری نایژه‌ای می‌گردد، اما به دلیل سایر اثرات ممکن است باعث غلیظ شدن ترشحات شود به طوری که در هنگام یک حمله آسمی، خروج آنها با سرفه مشکل می‌گردد. مرض قند (دیابت) - فنیل‌افرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن احتمال خطر بیماریهای قلبی یا عروقی در بیماران مبتلا به مرض قند شود. بزرگ شدن پروستات، انسداد دستگاه ادراری یا اشکال در دفع ادرار - برخی اثرات دیفن‌هیدرامین ممکن است باعث وخامت مشکلات ادراری گردد. گلوکوم - افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است بروز نماید.

هیپاتیت یا سایر بیماریهای کبدی - به دلیل امکان تجمع این دارو در بدن، شانس بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد. بیماریهای قلبی یا عروقی و فشار خون بالا - فنیل‌افرین موجود در این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد. بیماری شدید کلیه - اگر دارو به مقدار زیاد و به مدت طولانی مصرف گردد، ممکن است کلیه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. پرکاری غده تیروئید - در پرکاری غده تیروئید که منجر به ضربان سریع قلب شده است، فنیل‌افرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

موارد احتیاط:

۱- این دارو ممکن است در نتایج آزمون‌های پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می‌گیرد تأثیر بگذارد، بنابراین لازم است قبل از انجام هرگونه آزمون فوق، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

۲- در صورت عدم بهبودی علائم بیماری، وخیم شدن آن و یا همراه شدن آن با تب، پزشک خود را مطلع نمایید.

۳- در صورت استفاده از الکل؛ سایر داروهای ضد هیستامین یا داروهای مؤثر بر تب یونجه، سایر آلرژی‌ها و سرماخوردگی‌ها؛ مسکن‌ها، آرام‌بخش‌ها یا داروهای خواب‌آور؛ داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرها؛ باربیتورات‌ها؛ داروهای ضد تشنج؛ شل‌کننده‌های عضلانی؛ داروهای بیهوشی شامل بی‌حس‌کننده‌های دندان با پزشک معالج خود مشورت کنید.

۴- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه‌های حاوی الکل ممکن است باعث آسیب کبدی شود.

۵- این دارو ممکن است سبب خواب‌آلودگی، گیجی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

۶- این دارو ممکن است باعث عصبانیت، بیقراری یا اشکال در به خواب رفتن در برخی افراد گردد. در صورت اشکال در به خواب رفتن، آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از زمان خواب مصرف نمایید.

- ۷- این دارو ممکن است اثر تحریکی بر روی سیستم اعصاب مرکزی و سایر اثرات داروهای رژیمی را افزایش دهد. لذا از مصرف همزمان این دارو با داروهای رژیمی یا کنترل کننده اشتها بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- ۸- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت‌دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۹- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی و گلو گردد. برای تسکین موقت خشکی دهان، میتوان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های یخ در دهان و یا جانشین‌های بزاق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته، دندانپزشک خود را مطلع نمایید. طولانی شدن خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماری‌های دندان و لثه و عفونت‌های قارچی گردد.
- ۱۰- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.
- ۱۱- مصرف مقادیر کم یا متناوب این دارو معمولاً در آزمون‌های قند ادرار تأثیر نمی‌گذارد. در صورت عدم کنترل مناسب بیماری قند، با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:
الکل، داروهای بیهوشی، گلیکوزیدهای دیژیتال، داروهای آنتی‌کولینرژیک، داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، داروهای ضد فشار خون، داروهای مسدود کننده بتا آدرنرژیک خوراکی، داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی، مهار کننده‌های منوآمین اکسیداز (MAO)، آلکالوئیدهای راولفیا، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی شامل آسپیرین یا سایر سالیسیلات‌ها و زیدوودین

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا: معمولاً ۱ تا ۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت یک بار در روز. حداکثر مقدار مصرف ۸ عدد قرص در روز است.
کودکان کمتر از ۱۲ سال: مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- این دارو را فقط بر اساس دستور راهنمای دارو مصرف نمایید، از مصرف مقادیر مکرر و بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید.
- به منظور کاهش تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا، یک لیوان آب یا شیر میل نمایید.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو بندرت عوارض جانبی جدی بروز می‌نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد، در مقادیر مصرف بالا و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

تهوع یا استفراغ؛ درد خفیف معده؛ مدفوع خونی یا سیاه رنگ؛ تغییرات در ادرار یا اشکال در دفع ادرار؛ بثورات جلدی، کهیر یا خارش؛ گلودرد و تب؛ تورم صورت، پاها و بخش تحتانی ساق‌ها؛ احساس فشار در قفسه سینه؛ خونریزی یا کبودی غیر عادی؛ خستگی یا ضعف غیر عادی؛ استفراغ خون یا موادی که مشابه با ذرات قهوه می‌باشند؛ افزایش غیر عادی وزن؛ زرد شدن چشم‌ها یا پوست
برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل خواب‌آلودگی؛ غلیظ شدن ترشحات موکوس؛ تاری دید؛ اغتشاش شعور؛ اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک؛ گیجی؛ خشکی دهان، بینی یا گلو؛ سردرد؛ از دست دادن اشتها؛ کابوس‌های شبانه؛ ضربان قلب کوبنده؛ صدا کردن یا وزوز کردن در گوش؛ بثورات جلدی؛ دل‌به‌هم خوردگی یا درد معده؛ هیجان غیر عادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک پذیری با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر از دست دادن مهارت در انجام کار و بی‌ثباتی؛ تشنج؛ خواب‌آلودگی شدید؛ خشکی شدید دهان، بینی یا گلو؛ ضربان سریع قلب؛ برافروختگی و سرخی صورت؛ توهمات؛ سردرد مداوم و یا شدید؛ افزایش تعریق؛ تهوع یا استفراغ شدید یا مداوم؛ تنگی نفس یا اشکال در تنفس؛ گرفتگی یا درد شدید یا مداوم معده؛ اشکال در به خواب رفتن؛ اسهال؛ از دست دادن اشتها؛ تورم یا حساس شدن غیر طبیعی بالای شکم یا ناحیه معده، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.
شرایط نگهداری:

- دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری شود.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵

تاریخ تدوین: ۹۸/۰۳/۰۴