



شربت کوریزان® سرماخوردگی کودکان به صورت محلول شفاف، قرمز رنگ، با طعم و بوی تمشک، در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری که هر ۵ میلی لیتر آن حاوی ۰/۶۷ میلی گرم کلرفنیرامین مالتات و ۱۰ میلی گرم سودوافدرین هیدروکلرايد است، توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۳- استفاده از سایر داروها

- ۲- بارداری یا شیردهی

- ۱- وجود هرگونه حساسیت

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- نوزادان تازه متولد شده یا نارس

۳- زنان شیرده

۴- آب سیاه چشم با زاویه باریک

۵- زخم معده

۶- بزرگ شدن عالمی پروسات

۷- انسداد گردن مثانه - روهد

۹- مصرف همزمان در بیماران تحت درمان با داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - بنظر نمی رسد مقادیر کم و یا مصرف کوتاه مدت این دارو باعث بروز مشکلات در جنین یا نوزاد تازه متولد شده گردد، اگر چه مصرف مقادیر بیشتر و یا به مدت طولانی احتمال خطر را افزایش می دهد. مصرف این دارو با نظر پزشک در دوران بارداری مجاز است.

شیردهی - این دارو به مقادیر جزی وارد شیر مادر می شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته مانند هیجان یا بی قراری غیرعادی در کودک شیرخوار گردد. همچنین ممکن است جریان شیر را مهار نماید. لذا مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

۱- کودکان با سن بسیار کم معمولاً به اثرات این دارو بیشتر حساس می باشند. افزایش فشار خون، کابوس های شبانه، هیجان غیرعادی، عصبانیت، بی قراری و تحریک پذیری ممکن است بیشتر در کودکان ایجاد شود. لذا مصرف آن باید تحت نظر پزشک معالج صورت گیرد.

۲- افراد مسن معمولاً به اثرات این دارو بیشتر حساس می باشند. اغتشاش شعور، اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک، گیجی، خواب آلودگی، خشکی دهان، تشنج، کابوس های شبانه، هیجان غیرعادی، عصبانیت، بی قراری و تحریک پذیری ممکن است بیشتر در افراد مسن ایجاد شود.

۳- حضور بیماری های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید: دیابت (مرض قند) - سودوافدرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن احتمال بروز بیماری های قلبی یا عروقی در بیماران مبتلا به دیابت گردد.

بزرگ شدن پروسات، انسداد دستگاه ادراری یا اشکال در دفع ادرار - برخی اثرات ناشی از کلرفنیرامین ممکن است باعث و خامت مشکلات ادراری گردد. گلکوم (آب سیاه چشم) - افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است ایجاد شود.

بیماری های قلبی یا عروقی و فشار خون بالا - سودوافدرین ممکن است باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.

پرکاری غده تیروئید - در پرکاری غده تیروئید که منجر به ضربان سریع قلب شده است، سودوافدرین موجود در این دارو ممکن است باعث بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

احتباس ادراری - با مصرف سودوافدرین وضعیت ممکن است بدتر شود.

موارد احتیاط:

۱- این دارو ممکن است در نتایج آزمون های پوستی که برای تشخیص آرزوی انجام می گیرد تأثیر بگذارد، بنابراین لازم است قبل از انجام هر گونه آزمون فوق، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

۲- این دارو ممکن است اثرات ناشی از مصرف مقادیر زیاد آسپیرین مانند صدا کردن در گوش ها را مخفی نماید.

۳- در صورت استفاده از الکل و سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی مانند سایر داروهای ضد هیستامین یا داروهای مؤثر بر تپ یونجه یا سایر حساسیت ها، سرماخوردگی ها، مسکن ها، آرام بخش ها، یا داروهای خواب آور، داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرهای باربیتورات ها؛ داروهای ضد تشنج؛ شل کننده های عضلانی؛ داروهای بیهودشی شامل بی حس کننده های دندان با پزشک معالج خود مشourt نمایید.

۴- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی، گیجی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

۵- از مصرف همزمان این دارو، با داروهای رژیمی یا کنترول کننده اشتها بدون تجویز پزشک خودداری کنید.

۶- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث عصبانیت، بی قراری یا اشکال در به خواب رفتن شود، در صورت اشکال در به خواب رفتن، آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از زمان خواب استفاده نمایید.

۷- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی و گلو گردد. برای تسکین موقت خشکی دهان می توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه های یخ در دهان و یا جانشین های بزاق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته، دندانپزشک خود را مطلع نمایید. طولانی شدن خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماری های دندان و لثه و عفونت های قارچی گردد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:
الکل - اثراتی نظری خواب آلودگی ممکن است شدت یابد.

داروهای آنتی کولینرژیک (دارو برای گرفتگی‌ها یا انقباضات شکم یا معده) - عوارض جانبی مانند خشکی دهان ناشی از مصرف این دارو یا داروهای آنتی کولینرژیک ممکن است بیشتر بروز نماید.

داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی - برخی اثرات نظری خواب آلودگی ممکن است شدت یابد.
گلیکوزیدهای دیپیتال (مانند دیگوکسین) - مصرف این دارو ممکن است در ضربان قلب تأثیر بگذارد.

ماپروتیلین و داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای (آمی‌تریپتیلین، آموکسپین، کلوامین، دیپرامین، دکسپین، ایمی‌برامین، نورتریپتیلین، پروتریپتیلین و تریمی‌برامین) - برخی اثرات نظری خواب آلودگی ممکن است شدت یابد. همچنین مصرف همزمان این داروها ممکن است برخی عوارض جانبی مانند خشکی دهان را تشید نماید.

داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAO) (ایزوکربوکسازید، فنلزین، پروکاربازین، سلجنیلین و ترانیل سیپرومین) - در صورت مصرف همزمان و یا در طی ۲ هفته اخیر هر یک از داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز با این دارو، عوارض جانبی این دارو ممکن است شدت یابد. لذا از مصرف همزمان آنها باید خودداری نمود.

آلکالوئیدهای راولفیا (رزرپین) - این داروها ممکن است اثر سوداواردین موجود در این دارو را افزایش یا کاهش دهند.

آمانتادین، آمفاتامین، داروهای کاهنده استهای به استثنای فن‌فلورامین، کافئین، داروهای ضد آسم یا سایر مشکلات تنفسی، داروهای ضد سوماخوردگی، مشکلات سینوسی، تب یونجه یا سایر آرلژی‌ها (شامل قطره‌ها یا اسپری‌های بینی) و متیل‌فنیدیت - مصرف همزمان هر یک از این داروها با این شربت ممکن است باعث عوارض جانبی تحریکی بیش از حد نظری اشکال در به خواب رفتن، مشکلات ضربان قلب، عصبانیت و تحریک پذیری گردد.

داروهای مسدود کننده بتا آدرنرژیک (آتنولول، متوبروول، نادولول، پیندولول، پروپرانولول، سوتالول و تیمولول) - مصرف هر یک از این داروها با این شربت ممکن است باعث افزایش فشار خون و مشکلات قلبی (مانند کندی غیرعادی ضربان قلب) گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
کودکان ۲ تا ۶ سال : نصف تا یک قاشق مرباخوری هر ۴ تا ۶ ساعت است.

کودکان ۶ تا ۱۱ سال : دو قاشق مرباخوری هر ۴ تا ۶ ساعت است.
در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور راهنمای دارو خودداری کنید.

۲- به منظور کاهش تحريكات گوارشی، دارو را همراه با غذا یا یک لیوان آب یا شیر میل نمایید.

۳- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عارض جانی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو به ندرت عوارض جانبی جدی بروز می‌نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد، در مقادیر مصرف بالا و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر - درد پشت، ساق‌ها یا معده؛ مدفع سیاه رنگ و چسبنده؛ خونریزی از لشه‌ها؛ ادرار خونی، کدر یا تیره رنگ و یا کاهش ناگهانی در مقدار ادرار؛ افزایش فشار خون؛ تاری دید؛ درد قفسه سینه؛ اغتشاش شعور؛ اسهال؛ گیجی؛ از حال رفتن یا منگی در هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته؛ تب یا لرز؛ مدفع کم رنگ؛ تغییرات خلقی یا ذهنی؛ خونریزی از بینی؛ گلو درد و تب؛ بثورات جلدی یا کهیر؛ زایمان نوزاد مرده؛ تورم دهان، گلو، صورت، انگشتان، پاه، غدد یا بخش تحتانی ساق‌ها؛ تعریق ناگهانی؛ احساس تنگی نفس؛ اشکال در تنفس؛ انقباض، در هم رفتن یا حرکات مکرر کنترل نشده صورت؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیرعادی؛ استفراغ خون؛ افزایش وزن ناگهانی؛ زرد یا کمرنگ شدن چشم‌ها یا پوست.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌رونند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل خواب آلودگی و غلیظ شدن ترشحات برونش با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

- دارو از بخ زدگی محافظت گردد.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدی‌پرداز

تأسیس ۱۳۲۵