Children
Corizan®
Pain & Fever
Acetaminophen

کودکان
کوریزان®
درد و تب
استامینوفن

شربت کوریزان® کودکان درد و تب به صورت محلول شفاف، قرمز رنگ، با طعم و بوی توت فرنگی، در بطری های ۱۲۰ میلی لیتری که هر ۵ میلی لیتر آن حاوی ۱۲۰ میلی‌گرم استامینوفن است، توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر

۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

۱- حساسیت به استامینوفن و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری ـ اگرچه مطالعات کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، ولیکن بروز مشکلات گزارش نگردیده است. مصرف این دارو با نظر پزشک در دوران بارداری مجاز است.

شیردهی ـ این دارو در مقادیر کم در شیر مادر ترشح می‌شود. تاکنون عوارض ناخواسته در نوزادان شیرخوار گزارش نشده است. بنابراین مصرف آن طی دوران شیردهی تحت نظر پزشک معالج مجاز است.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو در کودکان عوارض جانبی متفاوت را با گروه سنی بزرگسالان نشان نداده است.

۲- با مطالعات انجام شده، مصرف این دارو در افراد مسن مشکلات وابسته به سن که مفید بودن آن را محدود نماید، نشان نداده است.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

سوء مصرف الکل، بیماری شدید کلیه، هپاتیت یا سایر بیماریهای کبدی ـ احتمال بروز عوارض ناخواسته ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط:

۱- موارد زیر را با پزشک یا دندانپزشک خود در میان بگذارید:

- در صورت مصرف این دارو برای تسکین درد شامل درد آرتریتی، درد به مدت بیشتر از ۱۰ روز در بزرگسالان یا ۵ روز در کودکان ادامه یافته و یا آن که شدت یابد، علایم جدید ایجاد شود یا ناحیه دردناک قرمز یا متورم گردد.
- در صورت مصرف این دارو برای کاهش تب، تب به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد یا بازگشت نماید، شدت یافته، علایم جدید ایجاد شود و قرمزی یا ورم نمایان گردد.
- در صورت مصرف این دارو برای گلودرد، گلودرد بسیار دردناک است و به مدت بیشتر از ۲ روز ادامه یابد، یا با تب، سردرد، بثورات جلدی، تهوع و استفراغ همراه گردد.

۲- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

۳- مصرف همزمان برخی داروها با استامینوفن ممکن است احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. میزان خطر به مقدار مصرف روزانه هر یک از داروها و مدت زمان مصرف همزمان آنها بستگی دارد. اگر پزشک یا دندانپزشک شما مصرف همزمان این داروها را بر اساس یک برنامه مشخص تجویز نموده باشد، دستورات وی را به دقت دنبال نمایید.

۴- استامینوفن ممکن است با نتایج برخی آزمون‌های پزشکی تداخل نماید، بنابراین لازم است قبل از انجام هر گونه آزمون، پزشک را از مصرف استامینوفن در طی ۳ یا ۴ روز گذشته مطلع نمایید.

۵- استامینوفن ممکن است باعث نتایج کاذب در برخی آزمون‌های قند خون گردد. در صورت مشاهده هر گونه تغییر در نتایج آزمون بخصوص در صورت عدم کنترل مناسب بیماری قند خود، با پزشک مشورت نمایید.

۶- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار باید سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی منتقل شود، حتی اگر علایمی از مسمومیت مشاهده نگردد. علایم مسمومیت شدید ممکن است تا چند روز پس از مصرف بیش از حد دارو ظاهر نگردد، اگرچه درمان به منظور جلوگیری از آسیب کبدی یا مرگ باید هر چه سریع‌تر شروع شود. شروع درمان ۲۴ ساعت پس از مصرف بیش از حد دارو ممکن است مؤثر نباشد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

مصرف طولانی مدت الکل، داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی ـ خطر سمیت کبدی با مصرف مقادیر سمی و یا طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفن ممکن است در افراد الکلی و یا بیمارانی که از سایر داروها با سمیت کبدی استفاده می نمایند، افزایش یابد.

مصرف طولانی مدت باربیتورات ها (بجز بوتالبیتال) یا پریمیدون باعث کاهش اثرات درمانی استامینوفن می‌گردد.

داروهای ضد انعقاد خون کومارینی یا مشتقات ایندانديون ـ مصرف همزمان و طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفن ممکن است اثر ضدانعقادی را افزایش دهد.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپیرین و سایر سالیسیلات‌ها ـ مصرف همزمان و طولانی مدت استامینوفن با یک سالیسیلات و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی دیگر ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو در هر نوبت مصرف به فواصل ۴ تا ۶ ساعت به طور کلی به صورت زیر است:

سن	وزن	دوز
۲-۱ سال	۱۲-۸ کیلوگرم	۷/۵-۵ میلی لیتر
۴-۲ سال	۱۶-۱۲ کیلوگرم	۱۰-۷/۵ میلی لیتر
۶-۴ سال	۲۰-۱۶ کیلوگرم	۱۲/۵-۱۰ میلی لیتر
۸-۶ سال	۲۵-۲۰ کیلوگرم	۱۵-۱۲/۵ میلی لیتر

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو ممکن است باعث آسیب کبد و کلیه شود.

۲- مصرف دارو در کودکان تا سن ۱۲ سال نباید بیشتر از ۵ بار در روز انجام گیرد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همهٔ این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر ـ زرد شدن چشم‌ها یا پوست؛ مدفوع خونی یا سیاهرنگ، قیر مانند؛ ادرار خونی یا کدر؛ تب همراه یا بدون لرز (قبل از درمان وجود ندارد)؛ درد شدید و یا سخت در بخش تحتانی پشت و یا پهلو؛ نقاط قرمز سوزنی روی پوست؛ بثورات جلدی، کهیر، یا خارش؛ زخم، یا نقاط سفید رنگ روی لبها یا در دهان؛ گلو درد (قبل از درمان وجود ندارد)؛ کاهش ناگهانی در مقدار ادرار؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی و خستگی یا ضعف غیرعادی.

توجه- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظیر اسهال؛ افزایش تعریق؛ کاهش اشتها؛ تهوع یا استفراغ؛ انقباضات یا درد معده؛ ورم، درد یا حساس شدن ناحیه بالای شکم یا معده، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.
- دارو از یخ زدگی محافظت گردد.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶- ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش : ۹۶/۰۵/۲۳

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

2212358
210mm×150 mm /2212358/ 1