

دیپارون® به صورت قرص های خوراکی، گرد، روکشدار، محدب و سبز رنگ است. هر قرص حاوی ۳۰، ۶۰ و یا ۹۰ میلی گرم سینا کلست (به صورت هیدروکلراید) است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

موارد مصرف:

دیپارون® جهت درمان هیپرپاراتیروئیدی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه تحت دیالیز بکار می رود. هیپرپاراتیروئیدی یک بیماری است که به علت افزایش ترشح مقادیر زیاد هورمون پاراتیروئید توسط غدد پاراتیروئید که در ناحیه گردن قرار گرفته اند، ایجاد می شود. این هورمون مقادیر کلسیم و فسفر در خون را کنترل می نماید. دیپارون® به کاهش مقدار هورمون پاراتیروئید که نقش کاهنده غلظت کلسیم و فسفر در خون را دارد، کمک می نماید. دیپارون® همچنین در کاهش میزان کلسیم در خون بیماران مبتلا به سرطان پاراتیروئید بکار می رود. این دارو فقط با نسخه پزشک می تواند در دسترس قرار گیرد.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- استفاده از سایر داروها
- ۳- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۴- بارداری یا شیردهی

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه واکنش حساسیتی به سینا کلست و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- هیپوکلسمی (کاهش کلسیم خون تا حد پایین طبیعی)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. اگرچه مطالعات انجام شده در حیوانات، وزن پایین نوزاد در هنگام تولد را نشان داده است. مصرف این دارو در دوران بارداری باید با احتیاط و براساس سنجش مقایسه ای منافع در برابر مضرات احتمالی آن تحت نظر پزشک انجام گیرد.
شیردهی - تاکنون مشخص نیست که این دارو در شیر انسان ترشح گردد. به دلیل احتمال ترشح این دارو در شیر و بروز عوارض ناخواسته در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

- ۱- بی خطری و اثر بخشی مصرف این دارو در کودکان ثبت نشده است.
- ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، مشکلات وابسته به سن که مفید بودن مصرف این دارو را محدود نماید، نشان نداده است. تنظیم مقدار مصرف این دارو در افراد سالخورده ضروری نمی باشد.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
نارسایی متوسط و شدید کبد - مقدار دارو در خون ممکن است افزایش یابد. تغییر مقدار مصرف دارو توسط پزشک ممکن است ضروری باشد.
سابقه حملات تشنجی - مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش خطر حملات تشنجی گردد. لذا مقدار کلسیم خون در این بیماران باید به دقت مورد پایش قرار گیرد.
هیپوکلسمی - این دارو میزان کلسیم خون را کاهش می دهد. لذا شروع مصرف دارو باید در شرایطی انجام گیرد که میزان کلسیم خون کمتر از حد پایین محدوده طبیعی نباشد. ضمناً بیماران به لحاظ بروز هیپوکلسمی نیز باید مورد پایش قرار گیرند. علائم هیپوکلسمی، حملات تشنجی، انقباضات عضلانی، ضعف عضلانی، بی حسی و تتانی را شامل می گردد.
نارسایی قلبی - مصرف دارو در این بیماران باید با احتیاط انجام گیرد.

موارد احتیاط:

- ۱- به منظور بررسی اثر بخشی این دارو، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- از مصرف همزمان سایر داروها بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید. پزشک ممکن است در هنگام مصرف همزمان، مقدار مصرف دیپارون® و یا سایر داروها را تغییر دهد.
- ۳- این دارو ممکن است مقدار کلسیم در خون را کاهش دهد. علائم ناشی از کلسیم پایین در خون، انقباضات شکمی، اغتشاش شعور، حملات تشنجی؛ اشکال در تنفس؛ ضربان نامنظم قلب؛ تغییرات خلقی یا ذهنی؛ انقباضات عضلانی در دست ها، بازوان، ساق ها و یا صورت؛ بی حسی و مور مور شدن اطراف دهان، نوک انگشتان یا پاها؛ تنگی نفس و لرزش را شامل می گردد. در صورت مشاهده هر یک از این علائم سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
- ۴- این دارو ممکن است احتمال بروز حملات تشنجی در بیماران با سابقه حملات تشنجی را افزایش دهد.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشک خود را مطلع سازید:
آمی تریپتیلین، دزیپرامین، نورتریپتیلین، کلومیپرامین - در مصرف همزمان با این دارو، مقدار آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین (متابولیت فعال) و سایر داروها در خون ممکن است در برخی بیماران افزایش یابد.

کارودیلول، فلکایناید، متوپرولول، تیوریدازین، اکثر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای، وین بلاستین - در مصرف توأم، تنظیم مقدار مصرف این داروها ممکن است ضروری باشد.

اریترومایسین، ایتراکونازول، کتوکونازول، وریکونازول، تلیترومایسین، ریفامپیسین، سیپروفلوکساسین، ریتوناویر، فلووکسامین - در مصرف توأم، مقدار سیناکلست در خون ممکن است افزایش یابد.

در مصرف همزمان کتوکونازول و سیناکلست، تنظیم مقدار مصرف سیناکلست ممکن است ضروری باشد و میزان کلسیم در خون به دقت مورد پایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:
برای هیپرکلسمی همراه با سرطان پاراتیروئید:

بزرگسالان - در شروع، خوراکی، ۳۰ میلی‌گرم دو بار در روز است. مقدار مصرف دارو هر ۲ تا ۴ هفته ممکن است توسط پزشک تغییر یابد.

کودکان - مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال بررسی نشده است. مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای هیپرپاراتیروئیدی ثانوی در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مزمن که تحت دیالیز می‌باشند:

بزرگسالان - در شروع، خوراکی، ۳۰ میلی‌گرم یک بار در روز است. مقدار مصرف دارو هر ۲ تا ۴ هفته ممکن است توسط پزشک تغییر یابد.

کودکان - مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال بررسی نشده است. مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید.

۲- این دارو باید همراه با غذا و یا بلافاصله پس از یک نوبت غذایی مصرف شود.

۳- قرص را به طور کامل بلع نموده، از خرد کردن، تقسیم کردن و یا جویدن آن خودداری شود.

۴- انجام آزمایشات ادواری خون طی دوره درمان به منظور پایش پیشرفت درمان و در صورت نیاز تنظیم مقدار مصرف دارو ضروری است.

۵- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت مشاهده عوارض زیر، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید:

بیشتر شایع - تاری دید؛ درد قفسه سینه؛ گیجی؛ سردرد؛ عصبانیت؛ احساس کوبیدن در گوش‌ها؛ ضربان کند یا سریع قلب

کمتر شایع - تشنج؛ سرفه یا گرفتگی صدا؛ تب یا لرز؛ از دست رفتن کنترل مثانه؛ درد بخش تحتانی پشت یا پهلو؛ انقباض یا حرکات تند و سریع اندام‌ها؛ ادرار کردن دردناک یا مشکل؛ از دست دادن ناگهانی هوشیاری

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل اسهال؛ اشکال در حرکت؛ درد مفاصل؛ از دست دادن توانایی؛ کاهش اشتها؛ درد، سفتی یا انقباض عضله؛ تهوع؛ ورم مفاصل؛ استفراغ و کاهش وزن با پزشک خود تماس بگیرید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر انقباضات شکمی؛ اغتشاش شعور؛ اشکال در تنفس؛ ضربان نامنظم قلب؛ تغییرات خلقی یا ذهنی؛ انقباضات در دست‌ها، بازوان، پاها، ساق‌ها یا صورت؛ بی‌حسی و مور مور شدن اطراف دهان، نوک انگشتان یا پاها؛ تنگی نفس و لرزش، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌نماید.

منابع:

- 1- USP DI 2007, Volume II-Advice for the Patient®, pages: 394 – 396
- 2- USP DI 2007, Volume I-Drug Information for the Health Care Professional, pages: 816 – 819
- 3- Drug Facts and Comparisons® 2015, pages: 668 – 670
- 4- PDR® 64th edition, 2010, pages: 640 – 643
- 5- BNF (British National Formulary) 68, September 2014-March 2015, page: 682

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۵/۰۹/۰۹

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۳۵



210mm×150 mm /221598671