

ازونیوم[®] عبیدی به صورت کپسول های انتریک کتد خوراکی به رنگ های بنفش تیره و سبز (۲۰ میلی گرم) و آبی تیره و سفید (۴۰ میلی گرم) است. هر کپسول به ترتیب حاوی ۲۰ و یا ۴۰ میلی گرم اس امپرازول (به صورت منیزیم تری هیدرات) است که در جعبه های ۱۴ و ۲۸ عددی کپسول توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماریهای دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت یا آنافیلاکسی به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- سابقه حساسیت به داروهای جایگزین بنزایمیدازول (رابرازول، پنتوپرازول و امپرازول)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در صورت نیاز قطعی به آن طی دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز است. شیردهی - ترشح این دارو در شیر انسان تاکنون مطالعه نشده است. به دلیل احتمال بروز عوارض ناخواسته جدی در کودکان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

- ۱- بی خطری و کارایی این دارو فقط در درمان کوتاه مدت بیماری برگشت محتویات معده به مری در کودکان ۱ تا ۱۷ سال ثبت شده است و در کودکان کمتر از یک سال ثبت نگردیده است. همچنین بی خطری و کارایی دارو در کودکان یک ماه تا یکسال برای درمان کوتاه مدت ازوفازیت فرسایشی به دلیل برگشت محتویات اسیدی معده به مری ثبت شده است، در حالی که در کودکان کمتر از یک ماه ثبت نگردیده است.
- ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، مشکلات یا عوارض جانبی متفاوت با افراد جوان تر را نشان نداده است. اگرچه، حساسیت بیشتر در برخی افراد سالخورده نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نماید:
بیماری کبدی یا سابقه آن - این بیماری ممکن است باعث تجمع اس امپرازول در بدن گردد. لذا مقدار مصرف آن ممکن است کاهش یابد.
کاهش مقدار منیزیم در خون - مصرف این دارو به مدت حداقل ۳ ماه و در بسیاری از موارد پس از یک سال در برخی بیماران با کاهش مقدار منیزیم در خون همراه بوده است.
سرطان معده - واکنش علامتی به درمان با این دارو، وجود بدخیمی معده را مخفی نمی نماید.
شکستگی استخوان - این دارو ممکن است خطر شکستگی های استخوان در ناحیه لگن، مچ و ستون فقرات ناشی از استئوپروز را افزایش دهد.
کمبود ویتامین B12 - مصرف طولانی مدت این دارو (بیشتر از ۳ سال)، ممکن است منجر به سوء جذب سیانوکوبالامین (ویتامین B12) گردد.
واکنش های حساسیتی - با مصرف این دارو در برخی بیماران حساسیت و آنافیلاکسی گزارش شده است.

موارد احتیاط:

به منظور کنترل پیشرفت درمان، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن وضعیت، با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:
آموکسی سیلین و کلاریترومایسین - مصرف همزمان ممکن است باعث افزایش مقدار اس امپرازول و ۱۴- هیدروکسی کلاریترومایسین در خون گردد.
داروهای ضد قارچ آزول (مانند ایتراکونازول، کتوکونازول) - مصرف اس امپرازول باعث افزایش pH دستگاه گوارش می گردد و ممکن است جذب این داروها را کاهش دهد. مصرف توأم داروها ممنوع است.
بنزودیازپین ها (مانند دیازپام، تریازولام) - در مصرف همزمان، مقدار بنزودیازپین ها در خون افزایش می یابد. کاهش مقدار مصرف بنزودیازپین ها و یا افزایش فواصل مصرف دو دارو توصیه می گردد.
کلوپیدوگرول - با مصرف توأم داروها، فعالیت ضد پلاکت کلوپیدوگرول ممکن است کاهش یابد.
دیگوکسین - مصرف همزمان داروها ممکن است باعث افزایش مقدار دیگوکسین در خون شود.
ارلوتینیب - مصرف اس امپرازول ممکن است با جذب ارلوتینیب تداخل نماید. از مصرف توأم داروها باید خودداری شود.
متوترکسات - اس امپرازول ممکن است با کاهش دفع کلیوی متوترکسات، باعث افزایش مقدار آن در خون گردد و بدین ترتیب خطر سمیت با آن را افزایش دهد. در صورت مصرف توأم داروها، تعیین مقدار متوترکسات در خون و علائم ناشی از سمیت دارو باید به دقت مورد پایش قرار گیرد.
مایکوفنولات - مقدار مایکوفنولات در خون و اثرات فارماکولوژیک آن ممکن است کاهش یابد.
تولترودین پیوسته رهش - آزاد سازی تولترودین از شکل پیوسته رهش دارو ممکن است افزایش یابد که دلیل آن افزایش pH معده پس از مصرف اس امپرازول است. تنظیم مقدار مصرف تولترودین ضروری است.
سالیسیلات ها با روکش انتریک - سالیسیلات ها ممکن است سریع تر حل شوند و عوارض جانبی گوارشی ناشی از مصرف آنها تشدید گردد.
وارفارین - مصرف همزمان ممکن است باعث افزایش INR و زمان پروترومبین گردد و منجر به خونریزی غیرعادی و حتی مرگ شود. لذا تغییرات INR و زمان پروترومبین باید مورد پایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان بیماری برگشت محتویات معده به مری:

بزرگسالان - ۲۰ یا ۴۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۴ تا ۸ هفته است. در صورت عدم بهبودی طی ۴ تا ۸ هفته اول درمان، پزشک ممکن است مصرف دارو را به مدت ۴ تا ۸ هفته دیگر

کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
 برای درمان کوتاه مدت (حداکثر ۸ هفته) بیماری برگشت محتویات معده به مری:
 کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال - ۲۰ یا ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۸ هفته است.
 کودکان تا سن ۱۲ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
 برای پیشگیری از بیماری برگشت محتویات معده به مری:
 بزرگسالان - ۲۰ میلی‌گرم یک بار در روز است.
 کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
 برای درمان زخم اثنی عشر همراه با عفونت هلیکوباکتر پیلوری:
 بزرگسالان - ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز همراه با ۱۰۰۰ میلی‌گرم (۱ گرم) آموکسی‌سیلین دو بار در روز و ۵۰۰ میلی‌گرم کلاریترومایسین دو بار در روز به مدت ۱۰ روز است.
 کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
 برای کاهش احتمال بروز زخم معده ناشی از مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی:
 بزرگسالان - ۲۰ یا ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۶ ماه است.
 برای درمان سندرم زولینجر الیسون:
 بزرگسالان - ۴۰ میلی‌گرم دو بار در روز است. مقدار مصرف بر اساس نیاز فرد تنظیم می‌گردد. حداکثر مقدار مصرف تا ۲۴۰ میلی‌گرم در روز می‌باشد.
 کودکان تا سن ۱۸ سال - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را حداقل یک ساعت قبل از غذا میل نمایید.
- ۲- کپسول را به طور کامل بلعیده، از خورد کردن، شکستن یا جویدن آن خودداری نمایید. در صورت عدم توانایی در بلع کامل کپسول، آن را باز نموده، محتویات را در یک قاشق غذا خوری حاوی کمیوت میوه یا ماست پراکنده کرده و بلافاصله میل نمایید. ضمناً می‌توان پلت‌ها را با مقداری آب یا آب میوه مخلوط کرده و بلافاصله میل نمود. می‌توان از آب سیب یا آب پرتقال به عنوان آب میوه استفاده نمود. از جویدن و خورد کردن محتویات کپسول خودداری نمایید.
- ۳- این دارو را برای دوره کامل درمان حتی در صورت احساس بهبودی مصرف نمایید.
- ۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

تاول، ورقه و شل شدن پوست؛ نفخ؛ لرزش؛ سرفه؛ ادرار تیره؛ اشکال در بلع؛ گیجی؛ ضربان سریع قلب؛ تب؛ کهیر؛ سوءهاضمه؛ خارش؛ درد مفصل یا عضله؛ از دست دادن اشتها؛ درد معده، پهلو یا شکم که احتمالاً به پشت انتشار می‌یابد؛ پف یا ورم پلک‌ها یا اطراف چشم‌ها، صورت، لبها یا زبان؛ قرمزی و تحریک چشم‌ها؛ زخم‌های قرمز پوستی اغلب با مرکز ارغوانی؛ تنگی نفس؛ بیثورات جلدی؛ گلو درد؛ زخم یا نقاط سفید در دهان یا روی لبها؛ خستگی یا ضعف غیرعادی؛ استفراغ؛ خس خس کردن؛ زردی چشم‌ها یا پوست.
 برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل معده ترش؛ آروغ زدن؛ سوزش معده؛ سوءهاضمه؛ ناراحتی، دل بهم خوردگی یا درد معده با پزشک خود مشورت نمایید.
 توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر تاری دید؛ اغتشاش شعور؛ ازدیاد تعریق؛ خواب‌آلودگی؛ خشکی دهان؛ گرگرفتگی؛ سردرد؛ تهوع و تندی ضربان قلب، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
 (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
 صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
 تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
 شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
 ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
 پست الکترونیک: info@abidipharma.com
 سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
 تاریخ ویرایش: ۹۶/۰۷/۱۰

References :

- 1) USP DI 2007, Volume II - Advice for the Patient[®], pages : 677-679
- 2) USP DI 2007, Volume I - Drug Information for the Health Care Professional, pages : 1283-1286
- 3) Drug Facts and Comparisons[®] 2015, pages : 2076-2083
- 4) PDR. net[®]
- 5) http://www.micromedexsolutions.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۳۵

