LANZO® Abidi
Lansoprazole

لانزو® عبیدی
لانسوپرازول

لانزو® عبیدی به صورت کپسول های انتریک کوتد خوراکی به رنگ سبز و صورتی (۱۵ میلی‌گرم) و صورتی (۳۰ میلی‌گرم) می باشد. هر کپسول به ترتیب حاوی ۱۵ و یا ۳۰ میلی‌گرم لانسوپرازول است و در جعبه‌های ۱۴ و یا ۲۸ عددی کپسول توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت
۲- بارداری یا شیردهی
۳- استفاده از سایر داروها
۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به لانسوپرازول و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری- مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در صورت نیاز قطعی به آن طی دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز است.

شیردهی- تاکنون مشخص نمی‌باشد که این دارو در شیر انسان ترشح شود، اگرچه در شیر موش های صحرایی ترشح می‌گردد. به دلیل بروز اثرات ناخواسته در حیوانات، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان کمتر از یک سال ثبت نشده است. ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان ۱ تا ۱۷ سال برای درمان کوتاه مدت علایم بیماری بازگشت اسید از معده به مری و التهاب فرسایشی مری ثبت گردیده است.

۲- بر اساس مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، دفع دارو از بدن کاهش می یابد.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید :

نارسایی عملکرد کبدی- به دلیل طولانی شدن نیمه عمر پلاسمایی لانسوپرازول، کاهش مقدار مصرف آن در بیماران مبتلا به بیماری شدید کبدی ممکن است ضروری باشد.

موارد احتیاط :

به منظور کنترل پیشرفت درمان، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن وضعیت با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

استرهای آمپی سیلین، دیگوکسین، نمک های آهن و کتوکونازول- لانسوپرازول باعث مهار طولانی مدت ترشح اسید معده می‌گردد. لذا ممکن است با جذب این داروها تداخل نماید.

سیانوکوبالامین- لانسوپرازول ممکن است باعث کاهش جذب سیانوکوبالامین گردد.

سوکرالفیت- جذب لانسوپرازول به تأخیر می‌افتد و فراهمی زیستی آن کاهش می‌یابد. لانسوپرازول باید حداقل ۳۰ دقیقه قبل از سوکرالفیت مصرف گردد.

تئوفیلین- دفع تئوفیلین ممکن است به میزان جزیی افزایش یابد. در برخی بیماران، تنظیم مقدار مصرف تئوفیلین در شروع و یا خاتمه درمان با لانسوپرازول ممکن است ضروری باشد.

وارفارین- مصرف همزمان این داروها ممکن است باعث افزایش INR گردد. لذا تغییرات INR و زمان پروترومبین باید مورد پایش قرار گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان بیماری بازگشت اسید از معده به مری :

بزرگسالان- ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز است.
کودکان کمتر از ۱ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
کودکان ۱ تا ۱۸ سال- ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز به مدت ۸ تا ۱۲ هفته است.

برای درمان زخم های اثنی عشر :
بزرگسالان- ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۴ هفته است. در بیماران نیازمند به درمان نگهدارنده، ۱۵ میلی گرم یک بار در روز مصرف می‌گردد.
کودکان تا سن ۱۸ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای درمان زخم های اثنی عشر همراه با عفونت هلیکوباکترپیلوری :
بزرگسالان- ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم (۱ گرم) آموکسی سیلین و ۵۰۰ میلی گرم کلاریترومایسین قبل از غذا دو بار در روز و به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز است. درمان دیگر، ۳۰ میلی گرم لانسوپرازول همراه با ۱۰۰۰ میلی گرم (۱ گرم) آموکسی سیلین قبل از غذا سه بار در روز و به مدت ۱۴ روز است.
کودکان تا سن ۱۸ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای درمان زخم های معده:
بزرگسالان- ۱۵ تا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز حداکثر به مدت ۸ هفته است.
کودکان تا سن ۱۸ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

برای درمان افزایش بیش از حد اسید معده :
بزرگسالان- در شروع، ۶۰ میلی گرم یک بار در روز است. پزشک ممکن است در صورت نیاز مقدار مصرف را افزایش دهد.
کودکان تا سن ۱۸ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
۱- این دارو را قبل از غذا و ترجیحاً در هنگام صبح میل نمایید.
۲- کپسول را به طور کامل بلعیده، از خرد کردن، شکستن یا جویدن آن خودداری نمایید. در صورت عدم توانایی در بلع کامل کپسول، آن را باز نموده، محتویات را در یک قاشق غذاخوری حاوی کمپوت میوه پراکنده کرده و بلافاصله میل نمایید. ضمناً می‌توان محتویات را با مقداری آب میوه یا سبزیجات مخلوط کرده و بلافاصله میل نمایید. از جویدن یا خرد کردن محتویات کپسول خودداری نمایید.
۳- این دارو را برای دوره کامل درمان حتی در صورت احساس بهبودی مصرف نمایید.
۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همهٔ این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
بیشتر شایع- اسهال؛ بثورات جلدی یا خارش
کمتر شایع- درد شکم یا معده؛ افزایش یا کاهش اشتها؛ درد مفصل؛ تهوع و استفراغ
برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل گیجی و سردرد با پزشک خود مشورت نمایید.
توجه- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶- ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱ دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش : ۹۵/۰۸/۰۱

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران - ایران
عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

2215833
210mm×150 mm / 2215833/ 0