



موتیدون® به صورت قرص های خوراکی، روکشدار، گرد، محدب و کرم رنگ است. هر قرص حاوی ۱۰ میلی گرم دمپریدون (به صورت مالئات) می باشد و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

## راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

## موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به دمپریدون و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- خونریزی، انسداد مکانیکی یا سوراخ شدن دستگاه گوارشی
- ۳- نارسایی متوسط یا شدید عملکرد کبد
- ۴- افزایش ترشح پرولاکتین ناشی از تومور غده هیپوفیز
- ۵- مصرف همزمان خوراکی با کتوکونازول، اریترومايسين، فلوکونازول، وریکونازول، کلاریترومایسین، آمیودارون

## مصرف در بارداری و شیردهی:

**بارداری** - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، لذا مصرف این دارو باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.  
**شیردهی** - این دارو در مقادیر بسیار کم در شیر مادر ترشح می شود. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن طی دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

## هشدارها:

- ۱- بی خطری و کارآیی مصرف این دارو در کودکان ثبت نشده است. مصرف دارو در کودکان با وزن کمتر از ۳۵ کیلوگرم توصیه نمی گردد.
- ۲- اطلاعات بخصوصی در مورد مصرف این دارو در افراد سالخورده در مقایسه با سایر گروههای سنی در دسترس نمی باشد.
- ۳- از مصرف همزمان داروهای آنتی اسید یا ضد ترشح اسید معده با این دارو خودداری نمایید. مصرف داروهای آنتی اسید باید بعد از غذا انجام گیرد.
- ۴- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیه نباید بیشتر از یک یا دو بار در روز انجام گیرد.

## موارد احتیاط :

- ۱- در طول مصرف این دارو به منظور بررسی پیشرفت درمان و تغییر احتمالی در مقدار مصرف دارو، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- در صورت عدم مشاهده بهبودی در علائم بیماری طی چند روز از مصرف دارو و یا بدتر شدن آن، با پزشک خود مشورت نمایید.

## تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای آنتی کولینرژیک - مصرف همزمان این داروها با دمپریدون، ممکن است اثرات دمپریدون را به حداقل برساند.

داروهای ضد قارچ گروه آزول، داروهای مهار کننده پروتئاز ویروس نقص ایمنی در انسان (HIV)، آنتی بیوتیک های ماکرولیدی و نفازودون - در مصرف همزمان این داروها با دمپریدون، ممکن است مقدار دمپریدون در خون افزایش یابد. لذا مصرف همزمان آنها باید با احتیاط انجام شود.

داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAO) – رعایت احتیاط در مصرف همزمان این داروها با دمنپریدون ضروری است.

داروهای با فرمولاسیون آهسته رهش یا انتریک کوتد – دمنپریدون با افزایش حرکات معده و روده کوچک ممکن است باعث افزایش جذب داروها از روده کوچک و یا کاهش جذب داروها از معده شود، بخصوص اگر دارو با فرمولاسیون آهسته رهش یا انتریک کوتد باشد.

### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

### برای اختلالات حرکات گوارشی :

بزرگسالان – یک قرص (۱۰ میلی گرم) سه تا چهار بار در روز است. حداکثر مقدار مصرف ۲۰ میلی گرم سه تا چهار بار در روز است.

### برای تهوع و استفراغ :

بزرگسالان – دو قرص (۲۰ میلی گرم) سه تا چهار بار در روز است.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- دارو را ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل از غذا و یا در هنگام خواب مصرف نمایید.

۲- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع – از دست دادن تعادل یا کنترل عضله؛ تورم دهان.

نادر – ضربان قلب یا نبض سریع، نامنظم و کوبنده؛ ورم صورت، دست، ناحیه تحتانی ساق پا یا پا.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل ترشح شیر از نوک پستان؛ خشکی دهان؛ تورم پستان در آقایان؛ سردرد؛ کهیر؛ گرگرفتگی؛ خارش پوست؛ خارش، قرمزی، درد یا تورم چشم؛ بی نظمی قاعدگی و درد پستان با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر اشکال در تکلم؛ عدم تعادل؛ گیجی؛ سنکوپ؛ ضربان نامنظم قلب؛ منگی؛ از دست دادن تعادل یا کنترل عضله، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

### شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۸،

خیابان دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۷۸۷

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۲/۰۵/۲۰

### ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵