

- قرص روکشدار نئوتادین® ۵ به صورت قرص‌های خوراکی، روکشدار، آبی رنگ، گرد و محدب است. هر قرص حاوی ۵ میلی‌گرم دِس لوراتادین است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.
- شربت نئوتادین® به صورت شربت شفاف، تقریباً بی‌رنگ و با طعم و بوی میوه است که هر ۵ میلی‌لیتر آن حاوی ۲/۵ میلی‌گرم دِس لوراتادین می‌باشد و در بطری‌های ۱۲۰ میلی‌لیتری توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- رعایت رژیم کم نمک، کم قند یا هرگونه رژیم خاص دیگر
- ۳- بارداری و شیردهی
- ۴- استفاده از سایر داروها
- ۵- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۶- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به دِس لوراتادین و هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو و یا لوراتادین

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در انسان طی دوران بارداری مورد مطالعه قرار نگرفته است. اگرچه مطالعات انجام شده در حیوانات بروز ناهنجاریهای مادرزادی یا سایر مشکلات را نشان نداده است. لذا مصرف آن طی این دوران باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.
شیردهی - این دارو در مقادیر جزئی در شیر مادر ترشح می‌شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته در کودک شیرخوار گردد، ضمن آن که ممکن است جریان شیر را نیز کاهش دهد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

- ۱- در افراد سالمند احتمال بروز اثرات آنتی کولینرژیکی یا اثرات سیستم اعصاب مرکزی ناشی از مصرف دارو جزئی است.
- ۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
انسداد گردن مثانه، هیپر تروفی علامتی پروستات و احتباس ادرار - این دارو ممکن است باعث وخامت احتباس ادراری گردد.
اختلال در متابولیسم دِس لوراتادین - در افرادی که متابولیسم دِس لوراتادین به کندی انجام می‌شود، اثرات ناخواسته وابسته به دوز ممکن است بیشتر ایجاد شود.

گلوکوم - افزایش مختصر در فشار داخلی چشم ممکن است ایجاد شود که باعث وخامت بیماری می‌گردد.

موارد احتیاط:

- ۱- این دارو ممکن است در نتایج آزمون‌های پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می‌گیرد، تأثیر بگذارد. بنابراین لازم است قبل از انجام هرگونه آزمون، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- ۲- این دارو ممکن است علائم ناشی از مصرف مقادیر زیاد آسپیرین را مخفی نماید.
- ۳- این دارو به اثرات الکلی، سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (CNS) شامل مسکن‌ها، آرام بخش‌ها یا داروهای خواب‌آور، داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرها، باربیتورات‌ها، داروهای ضد تشنج، شُل کننده‌های عضلانی، داروهای بیهوشی شامل بیحس کننده‌های دندان می‌افزاید.
قبل از مصرف هر یک از داروهای فوق با پزشک معالج خود مشورت نمایید.
- ۴- این دارو بندرت باعث خواب آلودگی می‌شود. لذا قبل از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، از واکنش خود به دارو اطمینان حاصل نمایید.
- ۵- این دارو کمتر باعث خشکی دهان، بینی و گلو می‌گردد. برای درمان موقت خشکی دهان می‌توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های یخ در دهان و یا جانشین‌های بزاق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از دو هفته، پزشک یا دندانپزشک خود را مطلع نمایید. تداوم خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماریهای دندان و لثه و عفونت‌های قارچی گردد.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
اریترومایسین، آزیترومایسین، کتوکونازول، فلوکستین، سایمتیدین - مصرف همزمان این داروها ممکن است سطح پلاسمایی دس‌لوراتادین را بدون تغییر در اثرات بالینی دارو، افزایش دهد.

داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAO) شامل ایزوکربوکسازید، فنلزین، پروکاربازین، سلجیلین و ترانیل سیپرومین - در صورت مصرف همزمان یا در طی ۲ هفته اخیر با یک داروی مهار کننده MAO، عوارض جانبی دس‌لوراتادین ممکن است شدت یابد. لذا از مصرف همزمان این داروها باید خودداری شود.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای رینیت آلرژیک و کهیر مزمن ایدئوپاتیک

بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال به بالا - ۵ میلی‌گرم یک بار در روز است.

کودکان کمتر از ۱۲ سال: مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک و یا راهنمای مصرف دارو مصرف نمایید.

۲- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع یا نادر - شوک آنافیلاکتیک (سرفه؛ اشکال در بلع؛ گیجی؛ ضربان سریع قلب؛ کهیر؛ خارش؛ ورم پلک‌ها یا اطراف چشم‌ها، صورت، لبها یا زبان؛ تنگی نفس؛ بثورات جلدی، تنگی در قفسه سینه، خستگی یا ضعف غیرعادی؛ حس خس‌خس سینه؛ آریتمی قلبی؛ طپش قلب؛ ضربان سریع قلب و کهیر.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند سردرد؛ التهاب گلو؛ گیجی؛ خواب‌آلودگی؛ خشکی دهان، بینی و گلو؛ دیسمنوره؛ سوء هاضمه؛ خستگی؛ میالژی (درد عضله) و تهوع با پزشک خود تماس بگیرید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر ضربان سریع یا نامنظم قلب، خواب‌آلودگی شدید، توهم، حملات تشنجی، اشکال در خواب، کاهش فشار خون و خواب‌آلودگی غیرعادی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- قرص را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- شربت را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید. از یخ زدگی محافظت گردد.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۹۷/۰۲/۰۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵

