

روپیکسون[®] به صورت قرص‌های خوارکی، روکشدار، گرد و محدب به رنگ زرد (۵ میلی‌گرم) و صورتی (۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ میلی‌گرم رزوواستاتین (به صورت کلسیم) است و در نوارهای آلو-آلو حاوی ۱۰ عدد قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۵- ابتلاء به دیابت
- ۶- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به رزوواستاتین و یا هر یک از مواد متشکله این دارو
- ۲- بیماری فعال کبدی یا افزایش نامشخص و پایدار در ترانس آمینازهای سرمی
- ۳- بارداری و شیردهی

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در زنان باردار به دلیل بروز نابهنجاریهای مادرزادی در جنین ممنوع است.

شیردهی - تاکنون مشخص نیست این دارو در شیر زنان شیرده ترشح گردد. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

- ۱- بی خطری و کارآیی این دارو در کودکان ثبت نشده است. مطالعات انجام شده هیچ گونه مشکل خاصی که مفید بودن این دارو در کودکان با سن بالاتر از ۸ سال را محدود نماید، نشان نداده است.
- ۲- مشکلات خاص وابسته به سن در افراد سالخورده گزارش نشده است.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
سابقه احتیاد به الکل، سابقه بیماری کبدی و حد بالا و پایدار آنزیم‌های کبدی - مصرف این دارو ممکن است این شرایط را وخیم تر نماید.
اختلالات شدید الکتروولیتی، متابولیکی و غدد درون ریز، عفونت شدید، تشنج کنترل نشده و سابقه اخیر جراحی بزرگ یا ضربه - توصیه می‌شود به دلیل احتمال بروز مشکلات عضلانی با احتیاط تجویز شود.
- بیماریهای کلیه و افراد سالخورده - احتمال بروز عوارض جانبی جدی افزایش می‌یابد.
- دیابت - این دارو همانند سایر استاتین‌ها ممکن است باعث افزایش میزان قند خون شود.
- بیماریهای عضلانی - مصرف این دارو ممکن است باعث وحامت بیماریهای عضلانی گردد.
- پروتئین در ادرار - مصرف این دارو ممکن است باعث حضور پروتئین در ادرار گردد. در چنین مواردی پزشک ممکن است مقدار مصرف دارو را کاهش دهد.
- کم کاری تیروئید درمان نشده - احتمال بروز مشکلات عضلانی وجود دارد.

موارد احتیاط :

- ۱- در طول مصرف دارو به منظور بررسی کارآیی دارو در کاهش میزان کلسترول و تری‌گلیسرید و تصمیم‌گیری به ادامه درمان، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- در صورت احتمال بارداری، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. این دارو ممکن است در طی دوران بارداری باعث بروز نابهنجاریهای مادرزادی یا سایر مشکلات در نوزاد گردد.
- ۳- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی‌های دندان) یا سایر فوریت‌های پزشکی، پزشک یا دندانپزشک معالج خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۴- مصرف همزمان نوشابه‌های حاوی مقادیر بسیار زیاد الکل با این دارو، اثرات ناخواسته این دارو بر روی کبد را افزایش می‌دهد.
- ۵- در صورت احساس هرگونه درد نامشخص، حساس شدن یا ضعف عضله بخصوص اگر با خستگی یا تب همراه شود، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.

اثرات ناخواسته این دارو بر روی عضله منجر به مشکلات جدی کلیوی می‌گردد.
۶- در صورت عدم بهبودی علایم و یا بدتر شدن آنها با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
داروهای آنتی اسید حاوی هیدروکسید آلومینیم و منیزیم - مصرف توأم این داروها ممکن است باعث کاهش مقدار رزوواستاتین در خون شود. داروهای آنتی اسید را حداقل ۲ ساعت پس از مصرف رزوواستاتین میل نمایید.
سیکلوسپورین و جم فیبروزبل - مصرف توأم این داروها ممکن است منجر به افزایش قابل توجه میزان رزوواستاتین در خون و افزایش احتمال بروز میوپاتی (ضعف عضلانی) شود. کاهش مقدار مصرف رزوواستاتین توصیه می‌گردد.
فیبرات‌ها، نیاسین و سایر درمان‌های پایین آورنده چربی - احتمال بروز میوپاتی ممکن است افزایش یابد.
وارفارین - بیماران تحت درمان با هر دو دارو باید تحت پایش دقیق قرار گیرند.
لوپیناویر و ریتوناویر - مصرف توأم این داروها، بطور قابل توجهی مقدار رزوواستاتین در خون را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی مقدار مصرف رزوواستاتین باید کاهش یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:
بزرگسالان - خوارکی، ۵ تا ۴۰ میلی‌گرم یک بار در روز، همراه با غذا و یا با معده خالی است. حداقل مقدار مصرف ۴۰ میلی‌گرم در روز است.
کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
۱- این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک مصرف نمایید. از مصرف مقادیر کمتر یا بیشتر و به مدت طولانی تراز دستور پزشک خودداری نمایید. همچنین بهترین اثر دارو زمانی است که مقدار ثابتی از آن در خون موجود باشد. در این صورت نباید هیچ یک از نوبت‌های مصرف دارو را فراموش کرده و هر روز آن را در یک زمان مشخص مصرف نمود.
۲- به یاد داشته باشید که این دارو بیماری شما را درمان قطعی نمی‌نماید، بلکه به کنترل آن کمک می‌کند. لذا مصرف آن را مطابق دستور پزشک ادامه دهید.
۳- قبل از مصرف این دارو، پزشک ممکن است رژیم غذایی خاصی را در کنترل بیماری شما تجویز نماید. چنین رژیمی حاوی مقادیر اندکی از چربیها، قندها و یا کلسترول است. بسیاری از بیماران با رعایت دقیق دستورات پزشک برای رژیم غذایی و تمرینات بدنی مناسب قادر به کنترل بیماری خود می‌باشند. این دارو فقط زمانی تجویز می‌گردد که کمک‌های اضافی مورد نیاز باشد و در صورتی موثر است که با برنامه رژیم غذایی و تمرینات بدنی مناسب همراه گردد.
۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید:
عوارض نادر یا با شیوع نامشخص - ادرار تیره رنگ؛ تب؛ درد، حساس شدن یا ضعف عضلانی؛ انقباضات یا گرفتگی‌های عضلانی؛ خستگی یا ضعف غیر عادی؛ درد شکم یا معده؛ بشورات ناحیه‌ای؛ مدفوع به رنگ خاک رس؛ بوی بد تنفس؛ استفراغ خون و زرد شدن چشم‌ها یا پوست.
سایر عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل درد بدن؛ احتقان بینی؛ سرفه؛ خشکی یا درد گلو؛ سردرد؛ گرفتگی صدا؛ آبریزش بینی؛ حساس شدن یا تورم غدد گردنی؛ اشکال در بلع و تغییرات گفتاری با پزشک خود مشورت نمایید.

شوابط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری کنید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، جادة مخصوص کرج، کیلومتر ۸،
خیابان دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۵۶
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۷۸۷
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
ایمیل کترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
تاریخ تدوین: ۹۴/۰۷/۲۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران - ایران
عبدیفار
ناسیم ۱۳۲۵