TAVANEX®

تاوانکس®

Levofloxacin 500 & 750 mg

لِوفلوکساسین ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی‌گرم

تاوانکس® به صورت قرص‌های خوراکی، روکشدار، کشیده، خط‌دار، محدب و به رنگ نارنجی (۵۰۰ میلی‌گرم) و یا روکشدار، کشیده، بدون خط، محدب و به رنگ سفید (۷۵۰ میلی‌گرم) می‌باشد. هر قرص به ترتیب حاوی ۵۰۰ میلی‌گرم و یا ۷۵۰ میلی‌گرم لووفلوکساسین (به صورت همی‌هیدرات) است.

تاوانکس® در بسته بندی‌های زیر توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود:

- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۵ عددی قرص ۵۰۰ میلی‌گرم
- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۷ عددی قرص ۵۰۰ میلی‌گرم
- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۵ عددی قرص ۷۵۰ میلی‌گرم
- جعبه حاوی یک نوار بلیستر ۷ عددی قرص ۷۵۰ میلی‌گرم

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به لووفلوکساسین و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو، سایر فلوروکینولون‌ها و یا سایر ترکیبات وابسته به مشتقات فلوروکینولون.

۲- التهاب یا پارگی تاندون مربوط به مصرف داروهای گروه کینولون.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری ـ مطالعات دقیق و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است، لذا مصرف این دارو طی این دوران باید فقط تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی ـ این دارو ممکن است در شیر مادر ترشح شود و به دلیل امکان بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- بی‌خطری و کارآیی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.

۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

بیماری مغزی و ستون فقرات شامل سفتی سرخرگهای مغزی، بیماری صرع یا سایر حملات تشنجی ـ مصرف لووفلوکساسین ممکن است خطر بروز حملات تشنجی را افزایش دهد.

دیابت ملیتوس (دیابت قندی) ـ لووفلوکساسین ممکن است باعث تغییر در میزان قند خون شود، لذا ممکن است باعث اختلال در کنترل میزان قند خون گردد.

بیماری کلیه ـ به دلیل کاهش دفع لووفلوکساسین از بدن، اثرات این دارو ممکن است افزایش یابد.

برادی‌کاردی (آهسته شدن ضربان قلب) ـ لووفلوکساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT در بیماران مبتلا به برادی‌کاردی گردد.

هیپوکالمی (کاهش پتاسیم خون) ـ لووفلوکساسین ممکن است باعث آریتمی قلبی و طولانی شدن فاصله QT شود.

موارد احتیاط :

۱- در صورت عدم بهبودی علایم طی چند روز از شروع مصرف دارو و یا بدتر شدن آن، با پزشک خود مشورت نمایید.

۲- از مصرف همزمان داروهای ضد اسید حاوی آلومینیم، کلسیم یا منیزیم، دیدانوزین، مکمل‌های آهن، سوکرالفیت و روی با این دارو پرهیز نمایید. این داروها باعث جلوگیری از اثر بخشی مناسب لووفلوکساسین می‌گردند. لذا بهترین زمان مصرف این داروها حداقل ۲ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از مصرف لووفلوکساسین است.

۳- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث حساسیت بیشتر پوست نسبت به نور خورشید شود. تماس با نور خورشید حتی برای دوره‌های کوتاه مدت ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، بثورات جلدی، قرمزی، خارش یا سایر تغییرات رنگی پوست گردد. در صورت مشاهده واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- در صورت بروز بثورات جلدی یا سایر علایم واکنش‌های آلرژیک، مصرف این دارو را قطع نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

۵- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث بروز گیجی، منگی، خواب آلودگی یا کاهش هوشیاری گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

۶- لووفلوکساسین ممکن است باعث درد، التهاب یا پارگی تاندون شود. در صورت مشاهده این علایم در دست‌ها، شانه‌ها و ساق‌ها، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک تماس حاصل نمایید. از انجام فعالیت‌های ورزشی خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

۷- مصرف این دارو در برخی بیماران دیابتی تحت درمان با انسولین یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، ممکن است باعث هیپوگلیسمی (اُفت قند خون) گردد. علایم کمی قند خون باید قبل از آن که منجر به بیهوشی گردد، درمان شود. این علایم در افراد مختلف ممکن است متفاوت بوده و شامل خستگی یا ضعف، احساس اضطراب، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، رنگ پریدگی، اشکال در تمرکز، خواب آلودگی، گرسنگی شدید، سردرد، تهوع، عصبانیت، ضربان سریع قلب و لرزش غیرطبیعی می‌باشد. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

۸- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به پایین بودن مقدار پتاسیم خون، ممکن است منجر به ضربان تند، کند یا نامنظم قلب گردد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد اسید حاوی آلومینیم، کلسیم، منیزیم، دیدانوزین، سولفات آهن، سوکرالفیت و روی ـ مصرف این داروها ممکن است جذب لووفلوکساسین را کاهش دهد، بنابراین مصرف همزمان

آنها توصیه نمی‌گردد. بهتر است بین مصرف هر یک از این داروها با لووفلوکساسین حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.

داروهای ضد آریتمی گروه Ia (کوئینیدین، پروکائین آمید) و گروه III (آمیودارون، سوتالول) ــ در مصرف همزمان احتمال بروز آریتمی قلبی به علت طولانی شدن فاصله QT در نوار قلب، ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد دیابت ــ در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون یا انسولین، مصرف همزمان این داروها با لووفلوکساسین ممکن است منجر به کاهش یا افزایش قند خون شود. لذا پایش میزان قند خون توصیه می‌گردد.

داروهای ضد التهاب غیر استروییدی ــ مصرف همزمان احتمال بروز تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی را ممکن است افزایش دهد.

داروهای کورتیکواستروییدی ــ مصرف همزمان ممکن است منجر به پارگی تاندون‌های شانه، دست، آشیل یا سایر تاندون‌ها گردد که نیاز به عمل جراحی داشته و یا آن که منجر به ناتوانی طولانی مدت بخصوص در افراد سالخورده می‌گردد.

وارفارین ــ لووفلوکساسین باعث تشدید اثرات وارفارین می‌گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان عفونت :

بزرگسالان ــ ۲۵۰ تا ۷۵۰ میلی‌گرم یک بار در روز.

کودکان کمتر از ۱۸ سال ــ مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱ - دارو ممکن است با معده خالی یا همراه با غذا مصرف شود.

۲ - این دارو را همراه با مایعات فراوان مصرف نمایید. مصرف مایعات فراوان به جلوگیری از بروز برخی اثرات ناخواسته دارو کمک می‌نماید.

۳ - به منظور حفظ مقدار ثابتی از دارو در خون یا ادرار، مصرف هیچ یک از نوبت‌ها را فراموش نکنید. همچنین دارو را مطابق با زمان‌ها و فواصل زمانی تعیین شده مصرف نمایید. اگر دارو را یک بار در روز مصرف می‌کنید، آن را هر روز در یک زمان مشخص میل نمایید.

۴ - در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همهٔ این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر ــ بثورات جلدی، خارش یا قرمزی پوست؛ درد یا گرفتگی شدید ناحیه شکم یا معده؛ حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار؛ آشفتگی؛ تاول؛ اغتشاش شعور؛ اسهال آبکی شدید یا خونی؛ تب؛ توهمات؛ درد، التهاب یا تورم ساق‌ها، شانه‌ها یا دست‌ها؛ جنون؛ احساس سوزش پوست؛ قرمزی و تورم پوست؛ لرزش.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل درد یا ناراحتی معده یا شکم؛ تغییر حس چشایی؛ یبوست؛ اسهال؛ گیجی؛ خواب آلودگی؛ سردرد؛ منگی؛ تهوع؛ عصبانیت؛ اشکال در به خواب رفتن؛ خارش و ترشح واژن و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

علایمی نظیر درد یا گرفتگی شدید معده یا شکم؛ حساسیت ناحیه شکم به لمس یا فشار؛ اسهال آبکی شدید یا خونی و تب ممکن است پس از قطع مصرف دارو بروز نماید. در صورت مشاهده هر یک از این علایم، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه ــ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید فوراً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

References :

1) USP DI 2007, Volume II – Advice for the Patient®, pages : 999-1001
2) USP DI 2007, Volume I – Drug Information for the Health Care Professional, pages : 1823-1828
3) Drug Facts and Comparisons® 2016, pages : 2252-2261, 2266-2269
4) PDR® 64th edition, 2010, pages : 2629-2643

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶- ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش : ۹۷/۱۰/۰۲

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران - ایران
عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

210mm×150mm / 2215721 / 1