vSOL®
Solifenacin Succinate

ویسول®
سولیفناسین سوکسینات

ویسول® به صورت قرص های خوراکی، روکشدار، گرد، محدب و به رنگ زرد (قرص ۵ میلی‌گرم) و یا صورتی (قرص ۱۰ میلی‌گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۵ و یا ۱۰ میلی‌گرم سولیفناسین سوکسینات است و در نوارهای ۱۰ عددی قرص و جعبه ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت
۲- بارداری یا شیردهی
۳- استفاده از سایر داروها
۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
۲- احتباس معده‌ای
۳- آب سیاه چشم با زاویه باریک که کنترل نشده است
۴- احتباس ادراری

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری ـ مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مطالعات انجام شده در حیوانات نشان داده است که مصرف این دارو می تواند باعث عوارض جانبی در جنین گردد. لذا مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک معالج و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی ـ تاکنون مشخص نشده که این دارو در شیر انسان ترشح شود. با توجه به ترشح بسیاری از داروها در شیر مادر، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- سلامتی و بی‌خطری این دارو در کودکان ثبت نشده است.

۲- در مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، مشکلات خاص وابسته به سن که مصرف دارو را در این گروه سنی محدود نماید، نشان داده نشده است. اگرچه افراد سالخورده نسبت به این دارو و داروهای مشابه بیشتر حساس بوده و ممکن است مقدار مصرف در آنها کاهش یابد.

۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید :

آب سیاه چشم، بیماری‌های معده و احتباس ادرار ـ مصرف این دارو ممکن است باعث وخامت این بیماری ها گردد.

بیماری‌های کلیه و کبد ـ مقدار مصرف این دارو ممکن است کاهش یابد.

طولانی شدن فاصله QT در نوار قلبی ـ مصرف این دارو ممکن است باعث وخامت این شرایط گردد.

موارد احتیاط:

۱- این دارو ممکن است در برخی بیماران باعث مشکلات بینایی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به دید کافی دارد، خودداری نمایید.

۲- در طی تمرینات ورزشی و یا قرار گرفتن در هوای بسیار گرم احتیاط نمایید. هوای بسیار گرم ممکن است باعث گرمازدگی شود.

۳- این دارو ممکن است باعث یبوست شود. در صورت درد شدید معده و یا بروز یبوست به مدت بیشتر از ۳ روز با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان شود. به منظور تسکین موقتی خشکی دهان از آب نبات و یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های یخ در دهان و یا از جانشین های بزاق استفاده نمایید. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته با پزشک و یا دندانپزشک خود مشورت نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای آنتی کولینرژیک- اثرات و عوارض هر دو دارو ممکن است افزایش یابد.

داروهای کولینرژیک- احتمال کاهش اثرات ویسول®می‌باشد.

داروهای مهارکننده آنزیم CYP3A4 مانند کتوکونازول، وراپامیل، دیلتیازم، اریترومایسین-مصرف توام آنها ممکن است باعث افزایش مقدار سولیفناسین در خون گردد. مصرف ویسول® ۵ توصیه می‌شود.

داروهای محرک آنزیم CYP3A4 مانند فنی‌توئین، کاربامازپین، ریفامپیسین- مصرف توام انها ممکن است باعث کاهش مقدار سولیفناسین در خون گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به‌طورکلی به‌صورت زیر است:

ـ برای درمان علایم پُرکاری مثانه :

بزرگسالان ـ ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم یک بار در روز است.

کودکان ـ مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را همراه با مایعات مصرف کرده و آن را به طور کامل بلع نمایید.

۲- مصرف این دارو می‌تواند همراه با غذا و یا با معده خالی انجام گیرد.

۳- در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، دیگر آن را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار مصرف دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

عوارض شایع(بیش از ده درصد): خشکی دهان.

عوارض نسبتا شایع(کمتر از ده درصد):یبوست، احساس پری معده، تهوع، درد شکم.

عوارض نا شایع(کمتر از یک درصد): تاری دید، ریفلاکس، خشکی چشم، خشکی پوست،خشکی گلو، خستگی، ورم اندام تحتانی، خواب آلودگی، عفونت مثانه، کاهش حس چشایی.

عوارض نادر(کمتر از یک هزارم درصد): سردرد و سرگیجه، خارش و بثورات پوستی، یبوست شدید، استفراغ، احتباس ادرار.

عوارض جانبی شایع به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. در صورت تشدید هر کدام از عوارض با پزشک تماس بگیرید.

توجه- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعا به پزشک یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری شود.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶- ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹ دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش : ۹۵/۰۹/۳۰

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

210mm×150mm /2215875/ 1