

زالربان® به صورت قرص های خوراکی، گرد، روکشدار و به رنگ های صورتی کمرنگ (۱۰ میلی‌گرم)، صورتی (۱۵ میلی‌گرم) و یا قرمز (۲۰ میلی‌گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ میلی‌گرم ریواروکسابان است و در نوارهای ۷ عددی قرص و جعبه ۱۴ عددی (۱۰ میلی‌گرم) و یا ۲۸ عددی (۲۰ و ۱۵ میلی‌گرم) توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

زالربان® حاوی ماده موثره ریواروکسابان است و در افراد بزرگسال در موارد زیر مصرف می‌شود:

- جلوگیری از ایجاد لخته های خون در مغز (استروک) و سایر عروق خونی در بدن در شرایطی که بیمار مبتلا به ریتم نامنظم قلب به نام فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریاچه ای است.
- درمان لخته‌های خونی در وریدهای ساق (ترومبوز عمیق وریدی) و در عروق خونی ریه (انسداد جریان خون ریوی) و به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد لخته های خونی در عروق خونی ساق‌ها و یا ریه‌ها
- پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل ران یا زانو

زالربان® وابسته به گروهی از داروها بنام داروهای ضد ترومبوز می‌باشد. مکانیسم اثر این دارو از طریق مهار فاکتور انعقاد خون (فاکتور Xa) است و بدین ترتیب باعث کاهش تمایل خون به تشکیل لخته می‌گردد.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- استفاده از سایر داروها ۳- ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص مشکلات خونریزی و یا بیماریهای کبد یا کلیه ۴- بارداری یا شیردهی

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه واکنش حساسیتی شدید به ریواروکسابان و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو (مانند آنزیموادم، واکنش های آنافیلاکتوئید یا آنافیلاکتیک)
- ۲- خونریزی زیاد
- ۳- ابتلا به بیماری یا در شرایطی که در یک ارگان بدن احتمال خونریزی جدی افزایش می‌یابد (مانند زخم معده، جراحی و یا خونریزی در مغز، جراحی اخیر مغز یا چشم‌ها)
- ۴- مصرف همزمان با داروهای جلوگیری کننده از لخته خون (مانند وارفارین، دابگاتران، آپیکسابان یا هپارین) مگر هنگامی که درمان با داروهای ضد انعقاد در حال تغییر است و یا در شرایطی که هپارین به منظور بازنگهداشتن ورید و یا شریان دریافت می‌گردد.
- ۵- ابتلا به بیماری کبدی که به افزایش خطر خونریزی منتهی می‌گردد.
- ۶- در صورت بارداری یا شیردهی

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری نمایید. در صورت شناس بارداری، در هنگام مصرف این دارو از یک روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده نمایید. در صورت باردار شدن در حین مصرف این دارو، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.

شیردهی - تاکنون مشخص نیست که این دارو در شیر انسان ترشح گردد. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

- ۱- مصرف این دارو در افراد کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی‌گردد. اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان موجود نمی‌باشد.
- ۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
- افزایش خطر خونریزی در موارد زیر:
- بیماری شدید کلیه - در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کلیه به دلیل کاهش دفع کلیوی دارو، خطر خونریزی ممکن است افزایش یابد.
- مصرف سایر داروهای جلوگیری کننده از لخته خون (مانند وارفارین، دابگاتران، آپیکسابان یا هپارین) و در هنگام تغییر درمان دارویی ضد انعقاد یا در حین دریافت هپارین از طریق ورید یا شریان به منظور بازنگهداشتن آن
- اختلالات خونریزی
- فشار خون بسیار بالا که توسط سایر درمان‌های دارویی کنترل نشده است.
- بیماری معده یا روده که ممکن است به خونریزی منجر شود، مانند التهاب روده یا معده و یا التهاب مری به دلیل بیماری ریفلاکس معده ای - روده ای (در این بیماری اسید معده به سمت مری می‌رود)
- رتینوپاتی یا مشکل مربوط به عروق خونی در پشت چشم‌ها
- برونشکنازی یا بیماری ریه که در آن برونش‌ها عریض شده و از خلط پر می‌گردد، یا سابقه خونریزی از ریه
- دریاچه قلب مصنوعی
- فشار خون پایدار، درمان دارویی دیگر و یا روش جراحی که برای خارج کردن لخته خون از ریه‌ها برنامه ریزی می‌گردد.
- نارسایی عملکرد کبدی - از مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی متوسط و شدید کبدی و یا در هر بیماری کبدی همراه با مشکلات انعقادی خودداری شود، زیرا که تماس با دارو و احتمال خونریزی ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط:

- ۱- در صورت نیاز به عمل جراحی به نکات زیر توجه نمایید:
- مصرف این دارو قبل یا بعد از عمل جراحی باید دقیقاً در زمان‌های تعیین شده توسط پزشک انجام گیرد.
- در صورتی که عمل جراحی شامل کاتتر یا تزریق داخل نخاعی (مانند برای اپیدورال، بی‌حسی نخاعی و یا کاشی دره) باشد به نکات زیر توجه نمایید:
- مصرف این دارو قبل یا بعد از تزریق کاتتر باید دقیقاً مطابق با دستور پزشک انجام گیرد.
- در صورت بی‌حسی یا ضعف ساق‌ها یا مشکلات مربوط به روده یا مثانه پس از پایان بی‌حسی، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
- ۲- این دارو ممکن است باعث گیجی (عارضه جانبی شایع) و کاهش سطح هوشیاری شود. لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.
- ۳- این دارو حاوی لاکتوز می‌باشد. در صورت بیماری عدم تحمل برخی قندها، با پزشک خود تماس بگیرید.
- ۴- پایش ادواری و ارزیابی بیماران برای نشانه‌ها و علائم از دست رفتن خون مانند کاهش هموگلوبین و یا هماتوکریت انجام گیرد. در طی دوره درمان، آزمایشات ادواری شمارش کامل گلبول‌های خون شامل شمارش پلاکت‌ها و آزمایشات مربوط به وجود خون مخفی در مدفوع توصیه می‌گردد.
- ۵- پایش بیماران برای نشانه‌ها و علائم اختلالات عصبی توصیه می‌گردد.
- ۶- پایش ادواری بیماران برای ارزیابی عملکرد کلیوی و کبدی ضروری است.

تداخل‌های دارویی:

- در صورتی که اخیراً از داروهای دیگر استفاده نموده و یا در حال مصرف آن می‌باشید و همچنین داروهایی که بدون نسخه داده می‌شوند، بخصوص موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- سایر داروهای ضد انعقاد خون
- برخی از داروها که برای عفونت‌های قارچی بکار می‌روند (مانند کنوکونازول، ایتراکانازول، وریکونازول، پوزاکونازول)، مگر آن که به صورت پوستی مصرف شوند.
- برخی داروهای ضد ویروس برای HIV/AIDS (مانند ریتوناویر، لویناویر، ایندیناویر)
- سایر داروهای که برای کاهش لخته خون استفاده می‌شوند (مانند انوکسپارین، کلوییدوگرل یا آنتاگونیست‌های ویتامین K مانند وارفارین و آسنوکومارول)
- داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و مسکن درد (مانند ناپروکسن یا اسید استیل سالیسیلیک)
- دروندارون یا داروهای که برای درمان ضریان غیر عادی قلب بکار می‌روند
- ویرامیل
- آزیترومایسین (سیستمیک)
- آزیترامیاسین (سیستمیک)
- دیلنیتازم
- کلاریترومایسین
- اسیدهای چرب امگا ۳
- ویتامین E
- پروژستین‌ها
- مصرف همزمان داروهای فوق ممکن است باعث کاهش اثرات زالیبران* گردد.
- مصرف همزمان داروهای فوق ممکن است باعث کاهش اثرات زالیبران* گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو :

مقدار مصرف این دارو صرفاً توسط پزشک تعیین می‌گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- این دارو را هر روز در یک زمان مشخص مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید. مدت زمان مصرف و یا قطع مصرف دارو باید توسط پزشک انجام گیرد.
- قرص را همراه با غذا و ترجیحاً با آب بلع نمایید. در صورت اشکال در بلع کامل قرص، با پزشک مشورت نمایید. قرص ممکن است خرد شده، با آب یا پوره سیب مخلوط شود و فوراً مصرف گردد. پس از مصرف این مخلوط، بلافاصله غذا میل شود.
- در صورت نیاز، پزشک ممکن است قرص خرد شده را از طریق لوله معده انتقال دهد.
- به منظور جلوگیری از بروز لخته‌های خون در مغز و یا سایر عروق خونی در بدن و در صورت استفاده از روش Cardioversion (برگرداندن ریتم طبیعی قلب به وسیله شوک الکتریکی)، دارو باید در زمان‌های مشخص شده توسط پزشک مصرف گردد.
- قطع مصرف ناگهانی این دارو بدون مشورت با پزشک جداً خودداری شود، زیرا که این دارو بیماری‌های جدی را درمان و یا جلوگیری می‌نماید.
- پزشک شما ممکن است قبل از هرگونه عمل جراحی و یا اقدامات دندانپزشکی، قطع مصرف دارو را دستور دهد. شروع مصرف مجدد دارو نیز باید مطابق با دستور پزشک انجام گیرد.
- در صورت مصرف یک قرص ۲۰ میلی‌گرم و یا یک قرص ۱۵ میلی‌گرم یک بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. از مصرف بیشتر از یک قرص در روز به منظور جبران نوبت فراموش شده خودداری نمایید. قرص دیگر را روز بعد مصرف نموده و سپس مصرف یک قرص یک بار در روز را ادامه دهید.
- در صورت مصرف یک قرص ۱۵ میلی‌گرم دو بار در روز و فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. از مصرف بیشتر از دو قرص ۱۵ میلی‌گرم در روز خودداری شود. در صورت فراموش نمودن یک نوبت از مصرف دارو، دو قرص ۱۵ میلی‌گرم را در یک زمان واحد (معادل با ۳۰ میلی‌گرم) در روز مصرف نمایید. در روز بعد برنامه درمانی یک قرص ۱۵ میلی‌گرم دو بار در روز را ادامه دهید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. این دارو مانند سایر داروهای مشابه (داروهای ضد ترومبوز) ممکن است باعث خونریزی در اندام‌های مختلف شود که می‌تواند بطور بالقوه تهدید کننده زندگی باشد. خونریزی زیاد ممکن است منجر به افت ناگهانی فشار خون (شوگ) شود. در برخی موارد، خونریزی ممکن است آشکار نباشد. در صورت بروز عوارض زیر که ممکن است نشانه‌ای از خونریزی باشد، سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

خونریزی زیاد یا طولانی مدت، ضعف غیر عادی، خستگی، رنگ پریدگی، گیجی، سردرد، ورم غیر قابل توضیح، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا آئین پکتورس که می‌توانند علائمی از خونریزی باشند.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- پس از انقضای مدت مصرف که روی بلیستر و جعبه دارو قید شده است، از مصرف دارو خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق قانلاب یا زاله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی : تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص جرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۴۴۵۰۴۷۸
شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری : PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۳۵

تاریخ تدوین: ۱۳۸۸/۰۵/۹