

کلوبیوم® کلوبازام

Clobium® Clobazam

کلوبیوم® ۱۰ به صورت قرص‌های خوارکی، به رنگ صورتی تیره، گرد، تخت و خطدار می‌باشد. هر قرص حاوی ۱۰ میلی‌گرم کلوبازام است و در نوارهای ۲۰ عددی قرص و جعبه ۶۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به کلوبازام و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- جنون
- ۳- گلوکوم حاد با زاویه باریک
- ۴- کودکان با سن کمتر از ۶ ماه
- ۵- مصرف هم‌زمان باکتوکوناژول و ایتراکوناژول

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در سه ماهه اول بارداری ممکن است احتمال بروز ناهنجاری‌های مادرزادی را افزایش دهد. همچنین مصرف مداوم دارو در طی دوران بارداری ممکن است باعث واپستگی فیزیکی شده که با عوارض قطع مصرف دارو در نوزاد همراه است. لذا مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است، مگر آن که با نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد و ممکن است باعث خواب آلودگی، اشکال در تغذیه و کاهش وزن در نوزادان شیرخوار گردد. لذا مصرف دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

۱- کودکان بخصوص کودکان با سن بسیار پایین، معمولاً به اثرات سیستم اعصاب مرکزی ناشی از مصرف این دارو بیشتر حساس می‌باشند.

۲- افراد سالخورد معمولاً به اثرات سیستم اعصاب مرکزی ناشی از مصرف این دارو بیشتر حساس می‌باشند. لذا توصیه می‌گردد مقدار مصرف در حد پایین ترین مقدار موثر در نظر گرفته شده و در صورت نیاز بتدریج اضافه شود.

- ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

سابقه سوء مصرف الكل، سابقه سوء مصرف یا واپستگی به دارو - احتمال واپستگی به این دارو ممکن است افزایش یابد.

بیماری مغزی - تضعیف سیستم اعصاب مرکزی و سایر عوارض جانبی ناشی از مصرف این دارو ممکن است در این بیماران بیشتر بروز نماید.

اشکال در بلع (در کودکان)، آمفیززم، آسم، برونشیت یا سایر بیماری‌های مزمن ریه، تحرک زیاد، افسردگی، بیماری شدید روانی، ضعف عضلانی، پورفیری، وقفه موقتی تنفس در هنگام خواب - مصرف کلوبازام ممکن است این شرایط را وخیم‌تر نماید.

صرع و یا سابقه حملات تشنجی - شروع درمان یا توقف ناگهانی مصرف این دارو، احتمال بروز حملات تشنجی را افزایش می‌دهد.

گلوکوم با زاویه باریک - مصرف دارو در این بیماران ممنوع است.

گلوکوم با زاویه باز - مصرف دارو در این بیماران باید توسط پزشک به دقت مورد پایش قرار گیرد.

بیماری‌های کلیه و کبد - مقدار این دارو در خون افزایش می‌یابد و ممکن است احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهد.

موارد احتیاط:

۱- در صورت مصرف منظم و طولانی مدت دارو به نکات زیر توجه نمایید:

- به منظور بررسی پیشرفت درمان و اطمینان از عدم بروز عوارض ناخواسته، به طور منظم به پزشک خود مراجعه نمایید. همچنین با توجه به مصرف دارو در حملات تشنجی، این موضوع در چند ماه اول درمان حائز اهمیت است.

- لزوم ادامه مصرف دارو باید به طور مرتبت توسط پزشک کنترل گردد.

۲- همراه داشتن کارت شناسایی پزشکی یا دستبندی که نمایانگر مصرف دارو توسط شما باشد، ممکن است ضروری باشد.

۳- این دارو ممکن است باعث ایجاد واپستگی روانی یا فیزیکی شود، بخصوص اگر به مدت طولانی یا در مقادیر زیاد مصرف شود. برخی علایم واپستگی به دارو عبارتند از:

- میل زیاد یا نیاز به ادامه مصرف دارو

- نیاز به افزایش مقدار مصرف دارو به منظور دستیابی به اثرات آن

- عوارض قطع مصرف دارو (مانند تحریک پذیری، عصبانیت، اشکال در خواب، انقباضات شکمی یا معده، رعشه یا لرزش) که بعد از قطع مصرف دارو ایجاد می‌گردد.

۴- در صورت احساس واپستگی روانی یا فیزیکی به این دارو، با پزشک خود مشورت نموده و مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.

۵- اگر دارو را در مقادیر زیاد یا به مدت طولانی مصرف می‌نمایید، بدون مشورت با پزشک مصرف دارو را قطع نکنید. پزشک شما ممکن است قبل از قطع کامل مصرف دارو، مقدار مصرف را بتدریج کاهش دهد.

۶- این دارو ممکن است به اثرات الكل و سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی (داروهایی که باعث کم شدن هوشیاری یا خواب آلودگی می‌گردند) بیفزاید. از داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی می‌توان به داروهای ضد هیستامین یا داروهای موثر بر تپ یونجه، سایر آلرژی‌ها یا سرماخوردگی‌ها، آرام بخش‌ها، داروهای خواب آور؛ داروهای ضد درد با نسخه یا مخدراها؛ باربیتورات‌ها؛ داروهای ضد تشنج؛ داروهایی که شل کننده عضلانی؛ داروهایی که بیهوشی شامل بی‌حس کننده‌های دندان اشاره نمود. این اثر ممکن است تا چند روز پس از قطع مصرف دارو ادامه یابد. قبل از قطع مصرف هر یک از این داروهای با پزشک خود مشورت نمایید.

۷- اگر به مصرف بیش از حد دارو مشکوک می‌باشید، بالاصله فوریت‌های پزشکی را درخواست نمایید. مصرف بیش از حد دارو و یا مصرف هم‌زمان آن با نوشابه‌های حاوی الكل یا سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی ممکن است به بیهوشی و احتمالاً مرگ منجر گردد.

۸- در صورت انجام هرگونه آزمایش پزشکی، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

- ۹- مشاهده هرگونه افکار یا رفتار غیرعادی و عجیب در طی مصرف دارو را به پزشک خود اطلاع دهید.
- ۱۰- این دارو ممکن است باعث بروز خواب آلودگی، گیجی، منگی، از دست دادن مهارت در انجام کار، بی‌ثباتی و کاهش هوشیاری بخصوص در افراد سالخورد گردد. این دارو حتی اگر در هنگام خواب مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است باعث احساس خواب آلودگی یا هوشیاری کمتر در هنگام بلند شدن از خواب شود. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کافی دارند، خودداری نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

ساخیر داروهای انتیاد آور بخصوص داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی با اثر اعتعاد آور – مصرف طولانی مدت و همزمان این داروها ممکن است احتمال خطر وابستگی به دارو را افزایش دهد.

الکل و سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی – مصرف همزمان ممکن است اثرات تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی این داروها را افزایش دهد. مصرف نوشابه‌های حاوی الکل در طی درمان با این دارو توصیه نمی‌گردد. در صورت مصرف همزمان کلوبازام و یک داروی ضد درد مخدر، مقدار مصرف داروی ضد درد مخدر باید حداقل به مقدار یک سوم کاهش یابد.

کاربامازپین – مصرف توانم داروها ممکن است باعث افزایش سرعت متابولیسم، کاهش غلظت‌های سرمی و نیمه عمر دفعی کلوبازام گردد. مقدار کاربامازپین در خون ممکن است افزایش یابد، لذا پایش مقدار کاربامازپین در خون توصیه می‌گردد.

کلوبازام باید حداقل یک هفته قبل از شروع درمان با کلوزاپین متوقف گردد.

ایتراکونازول و کتوکونازول – مصرف همزمان داروها منوع است.

لوودوبا – مصرف همزمان داروها ممکن است باعث کاهش اثرات درمانی لوودوبا گردد.

زیدوودین – در مصرف همزمان با کلوبازام، دفع زیدوودین کاهش می‌یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای کنترل حملات تشنجی:

بزرگسالان – در شروع، ۵ تا ۱۵ میلی‌گرم در روز است. مقدار مصرف بر حسب نیاز ممکن است بتدریج توسط پزشک افزایش یابد. حداقل مقدار مصرف دارو ۸۰ میلی‌گرم در روز است.

کودکان ۲ تا ۱۶ سال – در شروع، ۵ میلی‌گرم در روز است. مقدار مصرف بر حسب نیاز ممکن است بتدریج توسط پزشک افزایش یابد. حداقل مقدار مصرف دارو ۴۰ میلی‌گرم در روز است.

کودکان کمتر از ۲ سال – مقدار مصرف بر اساس وزن بدن و توسط پزشک تعیین گردد.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک مصرف نمایید. از مصرف مقادیر بیشتر، تعداد و دفعات بیشتر از دستور پزشک خودداری کنید. مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است باعث ایجاد وابستگی به دارو شود.

۲- در صورت احساس عدم اثربخشی دارو طی چند هفته از مصرف آن، از افزایش مقدار مصرف دارو خودداری نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.

۳- به منظور کنترل حملات تشنجی، دارو باید هر روز در فواصل زمانی مشخص طبق دستور پزشک مصرف شود. این موضوع جهت ثابت نگهداشت مقدار دارو در خون ضرورت دارد. ضمناً مصرف هیچ یک از نوبتها نباید فراموش شود.

۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن طی یک ساعت از نوبت فراموش شده، فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع – اضطراب، اختشاش شعور (ممکن است در افراد سالخورد بیشتر شایع باشد); ضربان سریع، کوبنده یا نامنظم قلب؛ از دست دادن حافظه خودگذشتی که پس از مصرف دارو اتفاق افتاده باشد؛ افسردگی.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل از دست دادن مهارت در انجام کار یا بی‌ثباتی گیجی یا منگی؛ خواب آلودگی و اختلال در تکلم با پزشک خود تماس حاصل نمایید.

پس از قطع مصرف دارو، بدن شما ممکن است جهت تطبیق نیاز به زمان داشته باشد. در طی این مدت در صورت مشاهده علایمی چون تحریک پذیری؛ عصبانیت و اشکال در خواب با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظری اختشاش شعور مداوم؛ حملات تشنجی؛ خواب آلودگی شدید یا کما؛ لرزش شدید؛ ضربان کند قلب؛ رفلکس‌های کند؛ اشکال در تکلم در تلفون مداوم؛ تلوتو خوردن؛ اشکال در تنفس و ضعف شدید، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) : ۳۰۰۰۴۹۲۹

PMQC@abidipharma.com

info@abidipharma.com

www.abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدیف

ناسیں ۱۳۲۵

