

دیابزید® به صورت قرص‌های پیوسته رهش خوراکی و سفیدرنگ است. هر قرص حاوی ۳۰ و یا ۶۰ میلی‌گرم گلی‌کلازید می‌باشد و در جعبه‌های ۳۰ عددی (دیابزید ۳۰ و ۶۰) و یا ۶۰ عددی (دیابزید ۶۰) توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری‌های شکر تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و با توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به گلی‌کلازید و هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو، داروهای سولفونامیدی و مُدرهای تیازیدی
- سوختگی‌های شدید
- اغمای دیابتی
- گتواسیدوز دیابتی همراه با یا بدون اغما
- جراحی بزرگ
- دیابت نوع اول
- اسیدوز شدید
- نوسانات شدید قند خون وجود دارد
- در شرایطی که نیاز به انسولین به‌سرعت تغییر می‌یابد
- شیردهی
- بیماری‌های شدید کبدی یا کلیوی
- بیماران تحت درمان با میکونازول

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به‌خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی‌شود.

شیردهی - در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی‌گردد.

هشدارها:

- ۱- اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان موجود نیست. دیابت نوع دوم در این گروه سنی به‌ندرت دیده می‌شود.
- ۲- برخی افراد سالخورده ممکن است به اثرات این دارو حساس‌تر باشند، بخصوص اگر همزمان از چند داروی ضد دیابت مصرف نموده و یا آن که همزمان از داروهایی استفاده نمایند که بر روی قند خون اثر می‌گذارند. این موضوع باعث افزایش احتمال بروز کاهش قند خون در طی درمان می‌گردد.

موارد احتیاط:

- ۱- به‌منظور کنترل پیشرفت درمان، بخصوص در چند هفته اول مصرف دارو، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- دستورات پزشک در مورد مصرف الکل، استعمال دخانیات، مصرف همزمان سایر داروها، مسافرت و محافظت پوست در برابر نور مستقیم خورشید را به‌طور دقیق رعایت نمایید.
- ۳- در موارد نیاز به کمک‌های فوریت‌دار پزشکی، رعایت شرایط زیر ضروری است:
- استفاده دایم از دستبند و یا گردنبند در برگرفته مشخصات پزشکی، همچنین همراه داشتن کارت شناسایی پزشکی حاوی اطلاعات مربوط به این بیماری و داروهای مورد مصرف، به‌همراه داشتن قندهای سریع‌الاث‌ر به‌منظور درمان کمی قند خون.
- ۴- مصرف مقادیر بیش از حد دارو می‌تواند به کاهش قند خون (هیپوگلیسمی) منجر گردد.
- علائم کمی قند خون باید قبل از بروز بی‌هوشی درمان گردد. این علائم در افراد مختلف متفاوت است، لذا آگاهی داشتن از علائم معمول کمی قند خون به‌منظور درمان سریع آن ضروری است.

این علائم می‌تواند شامل موارد زیر گردد:

- احساس اضطراب، تغییر رفتار، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، پوست رنگ پریده سرد، اشکال در تمرکز حواس، خواب‌آلودگی، گرسنگی مفرط، ضربان تند قلب، سردرد، تهوع، عصبانیت، کایوس، خواب‌ناارام، لرزش، اشکال در تکلم، خستگی یا ضعف غیرعادی.
- علائم پایین بودن قند خون که ممکن است به‌سرعت پیشرفت نماید، ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
- سوء تغذیه، تأخیر در یک نوبت مصرف غذا یا عدم مصرف آن، فعالیت بیشتر از حد معمول، عدم توازن بین فعالیت فیزیکی و مصرف کربوهیدرات، مصرف مقادیر زیاد الکل، مصرف برخی داروها، درمان بیش از حد دارو، استفاده از مقادیر زیاد انسولین و بیماری (خصوصاً همراه با استفراغ و اسهال)، بی‌کفایتی کبدی و کلیوی، اختلالات تیروئیدی، کم‌کاری هیپوفیز و بی‌کفایتی غده فوق کلیوی.
- مصرف برخی قندهای سریع‌الاث‌ر در هنگام شروع علائم کمی قند خون، از شدت آن می‌کاهد.

منابع مناسب قند عبارتند از:

- آب میوه، نوشابه‌های غیر رژیمی (صاف فنجان)، شربت یا عسل (یک قاشق غذاخوری)، تکه‌های قند و شکر (حل شده در آب).
- از مصرف شکلات برهیزر پرهیز نمایید، زیرا که چربی آن ورود قند به جریان خون را کاهش می‌دهد.
- اگر برنامه مصرف تغذیه برای مدت یک ساعت یا بیشتر از آن در نظر گرفته نشده باشد، به عنوان تغذیه سبک می‌توان از نصف ساندویچ یا یک لیوان شیر استفاده نمود، مشکل دیگر در ارتباط با عدم کنترل بیماری دیابت، زیادی قند خون است. در صورت مشاهده هر یک از علائم زیادی قند خون، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. اگر زیادی قند خون درمان نگردد، هیپوگلیسمی شدید ایجاد شده، منجر به گتواسیدوز (اغمای دیابتی) و مرگ می‌گردد.
- علائم زیادی قند خون آهسته‌تر از علائم کمی قند خون ظاهر می‌گردد. این علائم می‌تواند شامل موارد زیر شود:
تاری دید، خواب‌آلودگی، خشکی دهان، برفروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، ازدیاد ادرار، کاهش اشتها، درد معده، تهوع یا استفراغ، خستگی، اشکال در تنفس (سریع و عمیق) و تشنگی غیرعادی.
- ۶- در گتواسیدوز یا اغمای دیابتی که زیادی قند خون شدید است و نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد، علائم شامل برفروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، حضور کتون‌ها در ادرار، بی‌هوشی ناگهانی و اشکال در تنفس (سریع و عمیق) می‌گردد. علائم زیادی قند خون ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
تب، اسهال یا عفونت.
- در صورت استفاده از انسولین، عدم مصرف مقدار کافی و یا از دست دادن یک نوبت از مصرف آن
- نداشتن تمرینات بدنی معمول
- خوردن بیش از حد یا عدم رعایت رژیم غذایی

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

میکونازول - به علت افزایش اثر کاهنده قند خون گلی‌کلازید با این دارو، احتمال بروز هیپوگلیسمی (افت قند خون) و حتی کما وجود دارد. مصرف توأم این داروها ممنوع است.



5000

فیل بوتازون = اثر کاهنده قند خون گلی کلایزد را افزایش می دهد و مصرف توام آنها توصیه نمی گردد. ترجیحا از یک داروی ضد التهاب دیگر استفاده شود.

الکل = اثر کاهندگی قند خون را افزایش می دهد که می تواند به شروع کمای هیپوگلیسمی ختم شود. از مصرف الکل و داروهای حاوی الکل همراه با این دارو خودداری شود.

سایر داروهای ضد دیابت (انسولین، کاربو، متفورمین، داروهای تiazolidinediones، مهارکننده های دی پپتیدیل پپتیداز، آگونیست های گیرنده های GLP-1)، بتا بلوکرها، فلوکونازول، داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (کاپتوپریل، الالاپریل)، آنتاگونیست های گیرنده H₂، داروهای مهارکننده منوآنزیم آکسیداز، سولفونامیدها، کلاریترومایسین و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی = اثر کاهنده قند خون این دارو تشدید می گردد و مصرف توام آنها باید با احتیاط انجام شود.

دنازول = مصرف توام این دارو به دلیل افزایش مقدار قند خون توصیه نمی گردد. در صورت نیاز به مصرف توام داروها، پایش دقیق میزان قند خون و ادرار ضروری است.

کلرپرومازین = مصرف مقادیر بالای کلرپرومازین (بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در روز)، میزان قند خون را افزایش می دهد و مصرف توام آنها باید با احتیاط انجام شود.

گلوکوکورتیکوئیدها = مصرف توام این داروها باعث افزایش مقدار قند خون و احتمال بروز کمز می گردد. رعایت احتیاط ضروری است.

ریتودرین، سالبوتامول، تربوتالین (ترتیفی) = مقدار قند خون افزایش می یابد. پایش دقیق میزان قند خون ضروری است.

داروهای ضد انعقاد (وارفارین) = گلی کلایزد ممکن است باعث تشدید اثرات ضد انعقادی داروهای ضد انعقاد شود.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان دیابت نوع دوم:

بزرگسالان = در شروع، ۳۰ میلی گرم یک بار در روز در هنگام صبح است. در صورت کنترل موثر میزان قند خون، این مقدار مصرف ممکن است به عنوان درمان نگهدارنده بکار رود. در صورت عدم کنترل میزان قند خون به حد کافی، مقدار مصرف ممکن است به ۶۰، ۹۰ یا ۱۲۰ میلی گرم در روز افزایش یابد. فواصل بین افزایش هر دوز نباید کمتر از یک ماه باشد، مگر در بیمارانی که مقدار قند خون آنها پس از دو هفته درمان کاهش نیافته باشد. در چنین مواردی مقدار مصرف ممکن است در پایان هفته دوم درمان افزایش یابد. حداکثر مقدار مصرف روزانه ۱۲۰ میلی گرم است.

کودکان = بی خطری و کارایی دارو در کودکان ثبت نگردیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید، حتی اگر احساس بهبودی نموده و علائمی از بالابودن میزان قند خون را مشاهده نکنید. این دارو را بیشتر و یا به مدت طولانی تر از دستور پزشک مصرف ننمایید. مصرف بیش از حد دارو ممکن است شانس بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. به یاد داشته باشید که این دارو بیماری قند را علاج نمی کند، ولیکن به کنترل آن کمک می نماید. لذا ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. اگر زیادی قند خون مورد درمان قرار نگیرد، می تواند باعث خطرات جدی مانند نارسایی قلب، بیماری های عروق خونی، چشم و کلیه گردد.
- قرص را به طور کامل بلع نموده، از خرد کردن و جویدن آن خودداری ننمایید.
- مقدار کالری مورد نیاز روزانه شما باید توسط پزشک یا متخصص تغذیه تعیین گردد و رعایت دقیق آن بسیار ضروری است.
- نوع فعالیت فیزیکی، بهترین زمان انجام و میزان آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
- بهترین روش برای کنترل مقدار مصرف دارو، برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی را می توان تنظیم نمود.
- در صورت ابتلا به بیماری های نظیر سرماخوردگی، تب و آنفلوآنزا، خصوصاً اگر با تهوع، استفراغ و یا اسهال همراه باشد، استفاده از مقدار مصرف معمول دارو ضروری است. معمولاً در عفونت نیاز به تولید انسولین افزایش می یابد.
- در صورت اشکال در بلع غذای جامد از آب میوه، نوشابه های غیر رژیمی، سوپ های رقیق، یا مقادیر کم غذاهای نرم استفاده ننمایید.
- میزان قند خون را حداقل هر ۴ ساعت یک بار اندازه گیری نموده و حضور کتون ها در ادرار را کنترل ننمایید. در صورت وجود کتون ها، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. در صورت استفراغ شدید یا طولانی به پزشک اطلاع دهید.
- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

بیشتر شایع = کاهش میزان قند خون.

کمتر شایع = حملات تشنجی، بیهوش شدن.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل تغییرات در احساس طعم، بیهوش، اسهال، سرگیجه، افزایش حجم یا دفعات ادرار، سوزش سردل، افزایش یا کاهش اشتها، دفع گاز، درد معده، احساس پری یا ناراحتی و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه = در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائم کاهش شدید میزان قند خون شامل اغما، حملات تشنجی و اختلالات عصبی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری ننمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری ننمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدم کردن داروهای مصرف نشده سوال ننمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۲۹ - ۴۴۵۰۰۲۱
سایت اینترنتی:
www.abidpharma.com
VOC@abidpharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری:
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران
عبیدی
تاسیس ۱۳۳۵





دیابزید[®] ۸۰ به صورت قرص های خوراکی، خط دار و سفید رنگ است. هر قرص حاوی ۸۰ میلی گرم گلی کلایزید می باشد و در جعبه های ۱۰۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمای های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هر گونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری های دیگر

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به گلی کلایزید و هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو، داروهای سولفونامیدی و مُدرهای تیازیدی
- اسیدوز شدید
- اسیدوز شدید
- کتواسیدوز دیابتی همراه با و یا بدون اغما
- در شرایطی که نوسانات شدید قند خون وجود دارد
- بیماری های شدید کبدی یا کلیوی
- اغمای دیابتی
- جراحی بزرگ
- در شرایطی که نیاز به انسولین به سرعت تغییر می یابد
- بارداری

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در انسان انجام نشده است. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی شود.
شیردهی - در مورد عبور این دارو از شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی گردد.
هشدارها:

- ۱- اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان موجود نیست. دیابت نوع دوم در این گروه سنی معمول نمی باشد.
- ۲- برخی افراد سالخورده ممکن است به اثرات این دارو حساس تر باشند، بخصوص اگر همزمان از چند داروی ضد دیابت مصرف نموده و یا آن که همزمان از داروهای استفاده نمایند که بر روی قند خون اثر می گذارند. این موضوع باعث افزایش احتمال بروز کاهش قند خون در طی درمان میگردد.

موارد احتیاط:

- ۱- به منظور کنترل پیشرفت درمان بخصوص در چند هفته اول مصرف دارو، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- دستورات پزشک را در مورد مصرف الکل، استعمال دخانیات، مصرف همزمان سایر داروها، مسافرت و محافظت پوست در برابر نور مستقیم خورشید به طور دقیق رعایت نمایید.
- ۳- در موارد نیاز به کمک های فوریت دار پزشکی، رعایت شرایط زیر ضروری است:
- استفاده دایم از دستبند و یا گردنبند در برگرفته مشخصات پزشکی، همچنین همراه داشتن کارت شناسایی پزشکی حاوی اطلاعات مربوط به این بیماری و داروهای مورد مصرف.
- به همراه داشتن قندهای سریع الاثر به منظور درمان کمی قند خون.
- ۴- مصرف مقادیر بیش از حد دارو می تواند به کاهش قند خون هیپوگلیسمی منجر گردد.
- علایم کمی قند خون قند خون باید قبل از بروز بیهوشی درمان گردد. این علایم در افراد مختلف متفاوت است، لذا آگاهی داشتن از علایم معمول کمی قند خون به منظور درمان سریع آن ضروری است.
این علایم می تواند شامل موارد زیر گردد:
احساس اضطراب، تغییر رفتار، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، پوست رنگ پریده سرد، اشکال در تمرکز حواس، خواب آلودگی، گرسنگی مفرط، ضربان تند قلب، سردرد، تهوع، عصبانیت، کابوس، خواب ناآرام، لرزش، اشکال در تکلم، خستگی یا ضعف غیر عادی.
- علایم کمی قند خون که ممکن است به سرعت پیشرفت نماید ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
تأخیر در یک نوبت مصرف غذا یا عدم مصرف آن، فعالیت بیشتر از حد معمول، مصرف مقادیر زیاد الکل، مصرف برخی داروها، مصرف بیش از حد دارو، استفاده از مقادیر زیاد انسولین و بیماری (خصوصا همراه با استفراغ و اسهال).
- مصرف برخی قندهای سریع الاثر در هنگام شروع علایم کمی قند خون، از شدت آن می کاهد.
منابع مناسب قند عبارتند از:

- آب میوه، نوشابه های غیر رژیمی (نصف فنجان)، شربت یا عسل (یک قاشق غذاخوری)، تکه های قند و شکر (حل شده در آب).
- از مصرف شکلات پرهمز نمایید، زیرا که چربی آن ورود قند به جریان خون را کاهش می دهد.
- اگر برنامه مصرف تنقلات برای مدت یک ساعت یا بیشتر از آن در نظر گرفته نشده باشد، به عنوان تنقلات سبکی می توان از نصف ساندویچ یا یک لیوان شیر استفاده نمود.
- ۵- مشکل دیگر در ارتباط با عدم کنترل بیماری دیابت، زیادی قند خون است. در صورت مشاهده هر یک از علایم زیادی قند خون، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. اگر زیادی قند خون درمان نگردد، هیپرگلیسمی شدید ایجاد شده، منجر به کتواسیدوز (اغمای دیابتی) و مرگ می گردد.
- علایم زیادی قند خون آهسته تر از علایم کمی قند خون ظاهر می گردد. این علایم می تواند شامل موارد زیر شود:
تاری دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، برفروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، ازدیاد ادرار، کاهش اشتها، درد معده، تهوع یا استفراغ، خستگی، اشکال در تنفس (سریع و عمیق) و تشنگی غیر عادی.
- ۶- در کتواسیدوز یا اغمای دیابتی که زیادی قند خون شدید است و نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد، علایم شامل برفروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، حضور کتون ها در ادرار، بیهوشی ناگهانی و اشکال در تنفس سریع و عمیق می گردد. علایم زیادی قند خون ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:
تب، اسهال یا عفونت
- در صورت استفاده از انسولین، عدم مصرف مقدار کافی و یا از دست دادن یک نوبت از مصرف آن
- نداشتن تمرینات بدنی معمول
- خوردن بیش از حد یا عدم رعایت رژیم غذایی

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل، داروهای ضد انعقاد خون، داروهای ضد قارچ سیستمیک مانند میکونازول و فلوکنازول، داروهای کاهنده اشتها، کورتیکواستروئیدها، مدرهای تiazیدی و لیتیم؛ باربیتورات‌ها، داروهای ضد فشار خون یا نارسایی قلبی مانند مسدود کننده بتا آدرنژیک، کاپتوپریل یا آنالاپریل، سایمتیدین و رانیتیدین، فلوروکینولون‌ها مانند سپروفلوکساسین، سالیسیلات‌ها در مقادیر زیاد، داروهای مهار کننده آنزیم کبدی مانند کلر آمفنیکل، داروهای با اتصال پروتئینی بالا مانند داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبوپروفن) و سولفونامیدها، داروهای ایجاد کننده هیپر گلیسمی مانند داروهای ضد تشنج هیدانتوئینی، داروهای مسدود کننده کانال کلسیم، کلونیدین، داناژول، دکستروتیروکسین، دیازوکسید تزریقی، استروژن‌ها، داروهای ضد بارداری خوراکی حاوی استروژن - پروژستین، فوروسماید، گلوکاگن، هورمون رشد، ایزونیاژید، مرفین، نیاسین، فنوتیازین‌ها مانند کلروپرومازین، داروهای مقلد سمپاتیک مانند آگونیست‌های بتا آدرنژیک و هورمون‌های تیروئیدی، داروهای ایجاد کننده هیپوگلیسمی مانند تتراسیکلین و تئوفیلین، انسولین.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به‌طور کلی به‌صورت زیر است:

برای درمان دیابت نوع دوم:

بزرگسالان - در شروع ۴۰ تا ۸۰ میلی گرم یک بار در روز است. درمان نگهدارنده ۱ تا حداکثر ۴ قرص ۳۲۰ میلی گرم در روز می‌باشد.

کودکان - بی‌خطری و کارایی دارو در کودکان ثبت نگردیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید، حتی اگر احساس بهبودی نموده و علائمی از بالا بودن میزان قند خون را مشاهده نکنید. آن را بیشتر و یا به مدت طولانی‌تر از دستور پزشک مصرف ننمایید. مصرف بیش از حد دارو ممکن است شانس بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. به یاد داشته باشید که این دارو بیماری قند را علاج نمی‌کند، ولیکن به کنترل آن کمک می‌نماید. لذا ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. اگر زیادی قند خون مورد درمان قرار نگیرد، می‌تواند باعث خطرات جدی مانند نارسایی قلب، بیماری‌های عروق خونی، چشم و کلیه گردد.
- ۲- مقدار کالری مورد نیاز روزانه شما باید توسط پزشک یا متخصص تغذیه تعیین گردد و رعایت دقیق آن بسیار ضروری است.
- ۳- نوع فعالیت فیزیکی، بهترین زمان انجام و میزان آن باید توسط پزشک تعیین گردد.
- ۴- بهترین روش برای کنترل صحیح بیماری، آزمایش قند خون است. بدین ترتیب مقدار مصرف دارو، برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی را می‌توان تنظیم نمود.
- ۵- در صورت ابتلا به بیماری‌هایی نظیر سرماخوردگی، تب و آنفلوآنزا، خصوصاً اگر با تهوع، استفراغ و یا اسهال همراه باشد، استفاده از مقدار مصرف معمول دارو ضروری است. معمولاً در عفونت نیاز به تولید انسولین افزایش می‌یابد.
- در صورت اشکال در بلع غذای جامد از آب میوه، نوشابه‌های غیر رژیمی، سوپ‌های رقیق یا مقادیر کم غذاهای نرم استفاده نمایید.
- میزان قند خون را حداقل هر ۴ ساعت یک بار اندازه‌گیری نموده و حضور کتون‌ها در ادرار را کنترل نمایید. در صورت وجود کتون‌ها سریعاً با پزشک تماس بگیرید. در صورت استفراغ شدید یا طولانی به پزشک اطلاع دهید.
- ۶- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - حملات تشنجی، بیهوش شدن.

بیشتر شایع - کاهش میزان قند خون.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل تغییرات در احساس طعم، بی‌بوست، اسهال، سرگیجه، افزایش حجم یا دفعات ادرار، سوزش سردل، افزایش یا کاهش اشتها، دفع گاز، درد معده، احساس پری یا ناراحتی و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری ننمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری ننمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۹ - ۴۴۵۵ - ۰۲۱
www.abidipharma.com
VOC@abidipharma.com
سایت اینترنتی:
ایمیل جهت ارتباط مشتری:

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵



210 mm x 150 mm / 2210095/2