

انالاپریل - عبیدی به صورت قرص‌های خوراکی، خط دار، به رنگ‌های سفید (۵ میلی‌گرم) و صورتی (۲۰ میلی‌گرم) که هر یک به ترتیب حاوی ۵ و ۲۰ میلی‌گرم انالاپریل مالئات می‌باشند، در جعبه‌های ۱۰۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

- انالاپریل - عبیدی یک مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین است که در موارد زیر بکار می‌رود:
- درمان فشار خون بالا در بزرگسالان و کودکان بالاتر از یک ماه
- کاهش فشار خون، ریسک بیماری‌های قلبی عروقی کشنده و غیر کشنده، بخصوص سکنه مغزی و انفارکتوس میوکارد را کاهش می‌دهد.
- درمان نارسایی قلبی علامت‌دار
- درمان اختلال عملکردی بطن چپ بدون علامت، کاهش سرعت گسترش نارسایی قلبی آشکار و کاهش بستری شدن در بیمارستان در نارسایی قلبی

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- ۲- بیماران با سابقه آنژیوادم مربوط به درمان قبلی با یک داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین
- ۳- بیماران با آنژیوادم موروثی یا ایدیوپاتیک

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص در سه ماهه دوم و سوم آن ممنوع است.

شیردهی - حضور این دارو در شیر مادر شناسایی شده است، به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها:

- ۱- اثرات ضد فشار خون این دارو در کودکان مبتلا به فشار خون بالا از ۱ ماه تا ۱۶ سال ثابت شده است. مصرف این دارو در نوزادان نارس و کودکان با میزان فیلتراسیون گلوبولینی کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه / ۱/۳۲ متر مربع توصیه نمی‌شود، زیرا اطلاعاتی در دسترس نیست.
- ۲- ریسک عوارض جانبی این دارو ممکن است در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه بیشتر باشد. از آنجایی که در سالمندان احتمال کاهش عملکرد کلیه بیشتر است، در انتخاب دوز باید دقت شود و پایش عملکرد کلیوی انجام گیرد.

۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

آنژیوادم (بیماری پوستی آلرژیک) با سابقه فامیلی یا با علت ناشناخته - در این بیماران مصرف دارو نباید انجام شود.

درمان‌های حساسیتی نیش زنبور، دیالیز - احتمال وقوع واکنش‌های حساسیتی جدی افزایش می‌یابد.

دهیدراتاسیون - اثرات کاهش فشار خون ممکن است افزایش یابد.

دیابت ملیتوس (دیابت قندی) - میزان پتاسیم در بدن ممکن است بسیار افزایش یابد.

حمله یا سکنه قلبی، بیماری قلبی یا عروق خونی، هیپوتانسیون (فشار خون پایین) - افت فشار خون ناشی از مصرف این دارو ممکن است مشکلات حاصل از این بیماری‌ها را تشدید نماید.

بیماری کلیه یا کبد - اثرات این دارو به دلیل دفع آهسته‌تر آن از بدن، ممکن است افزایش یابد.

عوارض قلبی ناشی از مصرف هر یک از داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین شامل کلفت شدن صدا؛ ورم صورت، دهان، دست‌ها یا پاها و یا مشکل ناگهانی در بلع یا تنفس - احتمال وقوع مجدد این عوارض افزایش می‌یابد.

اسکلرودمی، سابقه لوپوس اریتماتوز سیستمیک - احتمال بروز مشکلات خونی ناشی از مصرف این دارو افزایش می‌یابد.

موارد احتیاط:

- ۱- به منظور کنترل پیشرفت درمان، تغییر در مقدار مصرف دارو و کنترل عوارض ناخواسته، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۲- در صورت احتمال بارداری یا باردار شدن، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید. مصرف این دارو، بخصوص در سه ماهه دوم و سوم بارداری، ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ نوزاد متولد نشده گردد.
- ۳- از مصرف سایر داروها، مکمل‌های حاوی پتاسیم، یا جایگزین‌های نمک حاوی پتاسیم خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.
- ۴- پس از مصرف اولین نوبت دارو بخصوص اگر همراه با یک داروی مدر باشد، ممکن است گیجی، منگی یا سنکوپ ایجاد گردد. لذا از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.
- ۵- در صورت بروز سنکوپ یا احساس منگی در حین مصرف دارو، پزشک خود را مطلع سازید.
- ۶- در صورت مشاهده علائمی مانند تب، گلو درد یا لرز؛ پزشک خود را مطلع نمایید. این علائم می‌تواند نشانه‌ای از گسترش عفونت به علت کاهش شمارش گلبول‌های سفید خون باشد.
- ۷- در صورت مشاهده اشکال در تنفس یا ورم صورت، بازوها یا پاها با پزشک خود مشورت نمایید. این علائم ممکن است نشانه‌های یک واکنش حساسیتی جدی باشند.
- ۸- در هنگام مصرف این دارو، در صورت بیماری بخصوص اگر با استفراغ شدید یا مداوم و یا اسهال همراه باشد، پزشک خود را مطلع سازید. این شرایط ممکن است باعث از دست رفتن بیش از حد آب بدن شده و احتمالاً منجر به فشار خون پایین گردد.
- ۹- ورزش و یا حضور در هوای بسیار گرم ممکن است منجر به گیجی، منگی، یا سنکوپ گردد. تعریق زیاد یا دست رفتن بیش از حد آب بدن می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود. لذا توصیه می‌گردد ضمن ورزش یا در هوای بسیار گرم از خود مراقبت نمایید.

۱۰- بیماران سیاه پوست ممکن است به اثرات کاهندگی فشار خون این دارو کمتر حساس باشند. علاوه بر این احتمال بروز واکنش های حساسیتی جدی مانند ورم صورت، دهان، دست ها یا پاها ممکن است افزایش یابد.

۱۱- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا درمان فوریت دار، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایند، پزشک خود را مطلع سازید:

نوشابه های حاوی الکل، داروهای مدر یا سایر داروهای کاهنده فشار خون - اثرات کاهندگی فشار خون ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بخصوص ایندومتاسین - مصرف همزمان این داروها با آنالپرل ممکن است اثر ضد فشار خون آنالپرل را کاهش دهد.

خون از بانک خون، سیکلوسپورین، مدرهای حاوی پتاسیم، شیر کم نمک، داروهای حاوی پتاسیم، مکمل های پتاسیم یا مواد حاوی غلظت های بالای پتاسیم یا جایگزین های نمک - مصرف همزمان آنالپرل با این داروها ممکن است منجر به هیپرکالمی (افزایش پتاسیم در خون) گردد. مصرف همزمان این داروها در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب توصیه نمی گردد.

آپوورینسول، داروهای سیتوتوکسیک، پروکاتین آمید، کورتیکو استروئیدهای سیستمیک، داروهای ضعیف مغز استخوان - مصرف همزمان این داروها با آنالپرل ممکن است منجر به افزایش احتمال بروز نوتروپنی (کاهش گلبول سفید) و یا آگرانولوسیتوز گردد.

لیتیم - با مصرف همزمان این دارو با آنالپرل، افزایش قابل برگشت در میزان لیتیم سرم و سمیت دارو گزارش شده است.

داروهای سمیاتومیتیک - مصرف همزمان ممکن است باعث کاهش اثرات ضد فشار خون این داروها گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

فشار خون بالا:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۵ میلی گرم یک بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف پس از ۱ تا ۲ هفته توسط پزشک افزایش یابد. مقدار مصرف نگهدارنده ۱۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز در یک نوبت و یا در دو نوبت منقسم است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

نارسایی احتقانی قلب:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۲/۵ میلی گرم یک یا دو بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف پس از چند روز تا چند هفته توسط پزشک افزایش یابد. مقدار مصرف نگهدارنده ۵ تا ۴۰ میلی گرم در روز در یک نوبت و یا در دو نوبت منقسم است.

کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درمان ضعف عضله قلب:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۲/۵ میلی گرم دو بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف دارو ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در روز در چند نوبت منقسم توسط پزشک افزایش یابد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط مطابق با دستور پزشک و در یک زمان مشخص طی روز مصرف نمایید. از مصرف مقادیر و دفعات بیشتر از دستور پزشک خودداری کنید.

۲- در طی درمان، وزن و رژیم غذایی خود بخصوص مصرف سدیم را کنترل نمایید. از مصرف جایگزین های نمک و یا شیر حاوی مقادیر کم سدیم بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

۳- در برخی بیماران ممکن است علائم فشار خون بالا دیده نشود. در چنین شرایطی مصرف دارو حتی با احساس بهبودی نیز ادامه یابد.

۴- این دارو فشار خون بالا را علاج نمی کند ولی به کنترل آن کمک می نماید و ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. بنابراین قبل از قطع مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. عدم درمان فشار خون بالا با خطرات جدی همراه است.

۵- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - گیجی، منگی یا سنکوپ، بثورات جلدی همراه با و یا بدون خارش، تب یا درد مفاصل.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل سردرد؛ سرفه خشک یا مداوم؛ اسهال؛ از دست دادن طعم؛ خستگی غیرعادی و تهوع با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۲۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۹ - ۴۴۵۰۰۲۱

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۹/۱۴

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران
abidi
SINCE 1946

