

انالاپریل - عبیدی به صورت قرص‌های خوراکی، گرد، تخت، خط‌دار، به رنگ‌های زرد (۲/۵ میلی‌گرم)، صورتی (۵ میلی‌گرم)، زرد (۱۰ میلی‌گرم) و صورتی کدر (۲۰ میلی‌گرم) که هر یک به ترتیب حاوی ۲/۵، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم انالاپریل مالئات می‌باشند، در نوارهای ۱۰ عددی و جعبه ۱۰۰ عددی (۵، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم) و نوارهای ۲۰ عددی قرص و جعبه ۱۰۰ عددی (۲/۵ میلی‌گرم) توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- بیماران با سابقه آنژیوادم مربوط به درمان قبلی با یک داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین

۳- بیماران با آنژیوادم موروثی یا ایدیوپاتیک

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری- مصرف این دارو در دوران بارداری بخصوص در سه ماهه دوم و سوم آن ممنوع است.

شیردهی- این دارو از شیر مادر عبور می‌نماید، بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو فقط در افراد بزرگسال بررسی شده است و هیچ‌گونه اطلاعات خاصی در مورد مصرف آن در کودکان در مقایسه با سایر گروههای سنی در دسترس نیست.

۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

آنژیوادم (بیماری پوستی آلرژیک) با سابقه فامیلی یا با علت ناشناخته - این دارو در این بیماران نباید مصرف گردد.

درمان‌های حساسیتی نیش زنبور، دیالیز- احتمال وقوع واکنش‌های حساسیتی جدی افزایش می‌یابد.

دهیدراسیون- اثرات کاهندگی فشار خون ممکن است افزایش یابد.

دیابت ملیتوس (دیابت قندی)- احتمال آن می‌رود که میزان پتاسیم در بدن بسیار افزایش یابد.

حمله یا سکنه قلبی، بیماری قلبی یا عروق خونی، هیپوتانسیون (فشار خون پایین)- آفت فشار خون ناشی از مصرف این دارو ممکن است مشکلات حاصل از این بیماریها را بدتر نماید.

بیماری کلیه یا کبد- به علت دفع آهسته تر دارو از بدن، اثرات این دارو ممکن است افزایش یابد.

عوارض قبلی ناشی از مصرف هر یک از داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین شامل کلفت شدن صدا؛ تورم صورت، دهان، دستها یا پاها و یا مشکل ناگهانی در بلع یا تنفس- احتمال وقوع مجدد این عوارض افزایش می‌یابد.

اسکلرودرمی، سابقه لوپوس اریتماتوز سیستمیک - احتمال بروز مشکلات خونی ناشی از مصرف این دارو افزایش می‌یابد.

موارد احتیاط:

۱- به منظور کنترل پیشرفت درمان، تغییر در مقدار مصرف دارو و کنترل عوارض ناخواسته، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.

۲- در صورت احتمال بارداری یا باردار شدن، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید. مصرف این دارو، بخصوص طی سه ماهه دوم و سوم (بعد از ۳ ماهه اول) بارداری، ممکن است منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ نوزاد متولد نشده گردد.

۳- از مصرف سایر داروها، مکمل‌های حاوی پتاسیم، یا جایگزین‌های نمک حاوی پتاسیم خودداری نمایید، مگر آن که پزشک دستور داده باشد.

۴- پس از مصرف اولین نوبت دارو بخصوص اگر همراه با یک داروی مدر باشد، ممکن است گیجی، منگی یا سنکوپ ایجاد گردد. لذا از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری نمایید.

۵- در صورت بروز سنکوپ یا احساس منگی در حین مصرف دارو، پزشک خود را مطلع سازید.

۶- در صورت مشاهده علائمی مانند تب، گلودرد یا لرز، فقط پزشک خود را مطلع نمایید. این علائم می‌تواند نشانه‌ای از گسترش عفونت به علت کاهش شمارش گلبول‌های سفید خون باشند.

۷- در صورت مشاهده اشکال در تنفس یا تورم صورت، بازوها یا پاها با پزشک خود مشورت نمایید. این علائم ممکن است نشانه‌های یک واکنش حساسیتی جدی باشند.

۸- در صورت بیمار شدن در حین مصرف این دارو بخصوص اگر با استفراغ شدید یا مداوم و یا اسهال همراه باشد، پزشک خود را مطلع سازید. این وضعیت ممکن است باعث از دست رفتن بیش از حد آب بدن شده و احتمالاً منجر به فشار خون پایین گردد.

۹- ورزش و یا حضور در هوای بسیار گرم ممکن است منجر به گیجی، منگی، یا سنکوپ گردد. تعریق زیاد با از دست رفتن بیش از حد آب بدن می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود. لذا توصیه می‌گردد ضمن ورزش یا در هوای بسیار گرم از خود مراقبت نمایید.

۱۰- بیماران سیاه پوست ممکن است به اثرات کاهندگی فشار خون این دارو کمتر حساس باشند. علاوه بر این احتمال بروز واکنش‌های حساسیتی جدی مانند تورم صورت، دهان، دستها یا پاها ممکن است افزایش یابد.

۱۱- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا درمان فوریت‌دار، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
نوشابه‌های حاوی الکل، داروهای مدیا سایر داروهای کاهنده فشار خون - اثرات کاهندگی فشار خون ممکن است افزایش یابد.
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بخصوص ایندومتاسین - مصرف همزمان این داروها با انالپرل ممکن است اثر ضد فشار خون انالپرل را کاهش دهد.

خون از بانک خون، سیکلوسپورین، مدرهای حاوی پتاسیم، شیر کم نمک، داروهای حاوی پتاسیم، مکمل‌های پتاسیم یا مواد حاوی غلظت‌های بالای پتاسیم یا جایگزین‌های نمک - مصرف همزمان انالپرل با این داروها ممکن است منجر به هیپرکالمی (افزایش پتاسیم در خون) گردد.
مصرف همزمان این داروها در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب توصیه نمی‌گردد.

آلوپورینول، داروهای سیتوتوکسیک، پروکائین آمید، کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، داروهای مضعف مغز استخوان - مصرف همزمان این داروها با انالپرل ممکن است منجر به افزایش احتمال بروز نوتروپنی (کاهش گلبول سفید) و یا آگرانولوسیتوز گردد.
لیتیم - در مصرف همزمان با انالپرل، افزایش قابل برگشت در میزان لیتیم سرم و سمیت دارو گزارش شده است.
داروهای سمپاتومیمتیک - مصرف همزمان ممکن است باعث کاهش اثرات ضد فشار خون این داروها گردد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

فشار خون بالا:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۵ میلی‌گرم یک بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف پس از ۱ تا ۲ هفته توسط پزشک افزایش یابد. مقدار مصرف نگهدارنده ۱۰ تا ۴۰ میلی‌گرم در روز در یک نوبت و یا در دو نوبت منقسم است.
کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

نارسایی احتقانی قلب:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۲/۵ میلی‌گرم یک یا دو بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف پس از چند روز تا چند هفته توسط پزشک افزایش یابد. مقدار مصرف نگهدارنده ۵ تا ۴۰ میلی‌گرم در روز در یک نوبت و یا در دو نوبت منقسم است.
کودکان - مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

درمان ضعف عضله قلب:

بزرگسالان - خوراکی، ابتدا ۲/۵ میلی‌گرم دو بار در روز، سپس در صورت نیاز ممکن است مقدار مصرف دارو تا ۲۰ میلی‌گرم در روز در چند نوبت منقسم توسط پزشک افزایش یابد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را هر روز دقیقاً مطابق با دستور پزشک، در یک زمان مشخص در طی روز مصرف نمایید. از مصرف مقادیر و دفعات بیشتر از دستور پزشکی خودداری کنید.

۲- در طی درمان، وزن و رژیم غذایی خود بخصوص مصرف سدیم را کنترل نمایید. از مصرف جایگزین‌های نمک و یا شیر حاوی مقادیر کم سدیم بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

۳- در برخی بیماران ممکن است علائم فشار خون بالا دیده نشود. در چنین شرایطی مصرف دارو حتی با احساس بهبودی نیز ادامه یابد.

۴- این دارو فشار خون بالا را علاج نمی‌کند ولی به کنترل آن کمک می‌نماید و ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. بنابراین قبل از قطع مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. عدم درمان فشار خون بالا با خطرات جدی همراه است.

۵- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - گیجی، منگی یا سنکوپ، بشورات جلدی همراه با و یا بدون خارش، تب یا درد مفاصل.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل سردرد؛ سرفه خشک یا مداوم؛ اسهال؛ از دست دادن طعم؛ خستگی غیرعادی و تهوع با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.
شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۹۸/۰۷/۱۰

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵