



دیابزید® ۸۰ به صورت قرص‌های خواراکی، گرد، تخت، خطدار و سفید رنگ است. هر قرص حاوی ۸۰ میلی‌گرم گلی کلازید می‌باشد و در جعبه‌های ۱۰۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

**راهنمایی‌های عمومی:**

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

۳- استفاده از سایر داروها

۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

**موارد منع مصرف:**

- سابقه حساسیت به گلی کلازید و هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو، داروهای سولفونامیدی و مُدرهای تیازیدی
- سوختگی‌های شدید
- ضربات شدید
- شیردهی
- اغمای دیابتی
- جراحی بزرگ
- در شرایطی که نوسانات شدید قند خون وجود دارد
- بیماری‌های شدید کبدی یا کلیوی

**صرف در بارداری و شیردهی:**

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در انسان انجام نشده است. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی‌شود.

شیردهی - در مورد عبور این دارو از شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی‌گردد.

**هشدارها:**

۱- اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان موجود نیست. دیابت نوع دوم در این گروه سنی معمول نمی‌باشد.

۲- برخی افراد سالخورده ممکن است به اثرات این دارو حساس‌تر باشند، بخصوص اگر همزممان از چند داروی ضد دیابت مصرف نموده و یا آن که همزممان از داروهای استفاده نمایند که بر روی قند خون اثر می‌گذارند. این موضوع باعث افزایش احتمال بروز کاهش قند خون در طی درمان می‌گردد.

**موارد احتیاط:**

۱- به منظور کنترل پیشرفت درمان بخصوص در چند هفته اول مصرف دارو، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.

۲- دستورات پزشک را در مورد مصرف الكل، استعمال دخانیات، مصرف همزممان سایر داروها، مسافت و محافظت پوست در برابر نور مستقیم خورشید به طور دقیق رعایت نمایید.

۳- در موارد نیاز به کمک‌های فوریت‌دار پزشکی، رعایت شرایط زیر ضروری است:

- استفاده دایم از دستبند و یا گردنبند در برگیرنده مشخصات پزشکی، همچنین همراه داشتن کارت شناسایی پزشکی حاوی اطلاعات مربوط به این بیماری و داروهای مورد مصرف.

- به همراه داشتن قندهای سریع الاثر به منظور درمان کمی قند خون.

۴- مصرف مقادیر بیش از حد دارو می‌تواند به کاهش قند خون (هیپوگلیسمی) منجر گردد.

- علایم کمی قند خون که ممکن است به سرعت پیشرفت نماید، ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:

تأخری در یک نوبت مصرف غذا یا عدم مصرف آن، فعلیت بیشتر از حد معمول، مصرف مقادیر زیاد الكل، مصرف بیش از حد دارو، استفاده از مقادیر زیاد انسولین و بیماری (خصوصاً همراه با استفراغ و اسهال).

۵- مصرف برعی قندهای سریع الاثر در هنگام شروع علایم کمی قند خون، از شدت آن می‌کاهد.

منابع مناسب قند عبارتند از:

آب میوه، نوشابه‌های غیر رژیمی (نصف فنجان)، شربت یا عسل (یک قاشق غذاخوری)، تکه‌های قند و شکر (حل شده در آب).

۶- از مصرف شکلات پرهیز نمایید، زیرا که چربی آن ورود قند به جریان خون را کاهش می‌دهد.

- اگر برنامه مصرف تنقلات برای مدت یک ساعت یا بیشتر از آن در نظر گرفته نشده باشد، به عنوان تنقلات سبک می‌توان از نصف ساندویچ یا یک لیوان شیر استفاده نمود.

۷- مشکل دیگر در ارتباط با عدم کنترل بیماری دیابت، زیادی قند خون است. در صورت مشاهده هر یک از علایم زیادی قند خون، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. اگر زیادی قند خون درمان نگردد، هیپرگلیسمی شدید ایجاد شده، منجر به کتو اسیدوز (اغمای دیابتی) و مرگ می‌گردد.

- علایم زیادی قند خون آهسته‌تر از علایم کمی قند خون ظاهر می‌گردد. این علایم می‌توانند شامل موارد زیر شود:

تاری دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، برافروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، ازدیاد ادرار، کاهش اشتها، درد معده، تهوع یا استفراغ، خستگی، اشکال در تنفس (سریع و عمیق) و تشنگی غیرعادی.

۸- در کتو اسیدوز یا اغمای دیابتی که زیادی قند خون شدید است و نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد، علایم شامل برافروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، حضور کتونها در ادرار، بیهوشی ناگهانی و اشکال در تنفس (سریع و عمیق) می‌گردد. علایم زیادی قند خون ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:

- تب، اسهال یا عفونت.

۹- در صورت استفاده از انسولین، عدم مصرف مقدار کافی و یا از دادن یک نوبت از مصرف آن

۱0- نداشتن تمرينات بدنه معمول

۱1- خوردن بیش از حد یا عدم رعایت رژیم غذایی

## تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل؛ داروهای ضد انعقاد خون؛ داروهای ضد قارچ سیستمیک مانند میکونازول و فلوكونازول؛ داروهای کاهنده اشتها؛ کورتیکوستروئیدها، مدرهای تیازیدی و لیتیم؛ باریتوات‌ها؛ داروهای ضد فشار خون یا نارسایی قلبی مانند مسدود کننده بتا آدرنرژیک، کاپتوپریل یا انالاپریل؛ سایمتیدین و رانیتیدین؛ فلوروکینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین؛ سالیسیلات‌ها در مقادیر زیاد؛ داروهای مهارکننده آنزیم کبدی مانند کلرآمفنیکل؛ داروهای با اتصال پروتئینی بالا مانند داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (ایبوپروفن) و سولفونامیدها؛ داروهای ایجاد کننده هیپرگلیسمی مانند داروهای ضد تشنج هیدانوتئینی، داروهای مسدود کننده کانال کلسیم، کلونیدین، دانازول، دکستروتیروکسین، دیازوکسید تزریقی، استروژن‌ها، داروهای ضد بارداری خوارکی حاوی استروژن - پروژستین، فوروسماید، گلوکاگن، هورمون رشد، ایزونیازید، مرفین، نیاسین، فنتوتیازین‌ها مانند کلروپرومازین، داروهای مقلد سمپاتیک مانند آگونیست‌های بتا آدرنرژیک و هورمون‌های تیروئیدی؛ داروهای ایجاد کننده هیپوگلیسمی مانند تتراسیکلین و تنوفیلین؛ انسولین.

### مقادیر و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:  
برای درمان دیابت نوع دوم:

بزرگسالان - در شروع، ۴۰ تا ۸۰ میلی‌گرم یک بار در روز است. درمان نگهدارنده ۱ تا حداقل ۴ قرص (۳۲۰ میلی‌گرم) در روز می‌باشد.  
کودکان - بی‌خطری و کارآیی دارو در کودکان ثبت نگردیده است.

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید، حتی اگر احساس بهبودی نموده و علایمی از بالا بودن میزان قند خون را مشاهده نکنید. آن را بیشتر و یا به مدت طولانی‌تر از دستور پزشک مصرف ننمایید. مصرف بیش از حد دارو ممکن است شناس بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. به یاد داشته باشید که این دارو بیماری قند را علاج نمی‌کند، ولیکن به کنترل آن کمک می‌نماید. لذا ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. اگر زیادی قند خون مورد درمان قرار نگیرد، می‌تواند باعث خطرات جدی مانند نارسایی قلب، بیماریهای عروق خونی، چشم و کلیه گردد.

۲- مقدار کالری مورد نیاز روزانه شما باید توسط پزشک یا متخصص تعذیبه تعیین گردد و رعایت دقیق آن بسیار ضروری است.

۳- نوع فعالیت فیزیکی، بهترین زمان انجام و میزان آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

۴- بهترین روش برای کنترل صحیح بیماری، آزمایش قند خون است. بدین ترتیب مقدار مصرف دارو، برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی را می‌توان تنظیم نمود.

۵- در صورت ابتلاء به بیماریهایی نظیر سرماخوردگی، تب و آنفلوآنزا، خصوصاً اگر با تهوع، استفراغ و یا اسهال همراه باشد، استفاده از مقدار مصرف معمول دارو ضروری است. معمولاً در عفونت نیاز به تولید انسولین افزایش می‌باشد.

- در صورت اشکال در بلع غذای جامد از آب میوه، نوشابه‌های غیر رژیمی، سوبهای رقیق، یا مقادیر کم غذاهای نرم استفاده نمایید.

- میزان قند خون را حداقل هر ۴ ساعت یک بار اندازه گیری نموده و حضور کتون‌ها در ادرار را کنترل نمایید. در صورت وجود کتون‌ها، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. در صورت استفراغ شدید یا طولانی به پزشک اطلاع دهید.

۶- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

### عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کمتر شایع - حملات تشنجه؛ بیهوش شدن.

بیشتر شایع - کاهش میزان قند خون.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل تغییرات در احساس طعم؛ یبوست؛ اسهال؛ سرگیجه؛ افزایش حجم یا دفعات ادرار؛ سوزش سردهل؛ افزایش یا کاهش اشتها؛ دفع گاز؛ درد معده؛ احساس پُری یا ناراحتی و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید. توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

### سرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری  
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۵۶

تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) :

ایمیل جهت ارتباط مشتری :

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:

تاریخ ویرایش: ۹۶/۰۲/۱۶

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدالحق

ناسیب ۱۳۲۵

دیابزید® به صورت قرص های پیوسته رهش خوراکی، گرد، محدب و سفید رنگ است. هر قرص حاوی ۳۰ میلیگرم گلی کلازید می باشد و در جعبه های ۳۰ عددی و یا ۶۰ عددی (دیابزید® ۶۰) قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

#### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها ۴- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- ۵- ابتلاء به بیماری های دیگر

#### موارد منع مصرف:

- ساقه حساسیت به گلی کلازید و هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو، داروهای سولفونامیدی و مدرهای تیازیدی
- دیابت نوع اول ۱- اسیدوز شدید ۲- سوختگی های شدید
- جراحی بزرگ ۳- ضربات شدید ۴- بیماری های شدید کبدی یا کلیوی
- شیردهی ۵- در شرایطی که نوسانات شدید قند خون وجود دارد

#### مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی شود. شیردهی - در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. لذا مصرف آن طی این دوران توصیه نمی گردد.

#### هشدارها:

۱- اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان موجود نیست. دیابت نوع دوم در این گروه سنی بندرت دیده می شود.

۲- برخی افراد سالخورده ممکن است به اثرات این دارو حساس تر باشند، بخصوص اگر همزمان از چند داروی ضد دیابت مصرف نموده و یا آن که همزمان از داروهایی استفاده نمایند که بر روی قند خون اثر می گذارند. این موضوع باعث افزایش احتمال بروز کاهش قند خون در طی درمان می گردد.

#### موارد احتیاط:

۱- به منظور کنترل پیشرفت درمان بخصوص در چند هفته اول مصرف دارو، در فواصل منظم به پزشک خود مراجعه نمایید.

۲- دستورات پزشک در مورد مصرف الكل، استعمال دخانیات، مصرف همزمان سایر داروهای مسافت و محافظت پوست در برابر نور مستقیم خورشید را به طور دقیق رعایت نمایید.

۳- در موارد نیاز به کمک های فوریت دار پزشکی، رعایت شرایط زیر ضروری است:

- استفاده دایم از دستبند و یا گردنبند در برگیرنده مشخصات پزشکی، همچنین همراه داشتن کارت شناسایی پزشکی حاوی اطلاعات مربوط به این بیماری و داروهای مورد مصرف.

- به همراه دایم از دستبند و یا گردنبند در منظور دارمان کمی قند خون.

۴- مصرف مقادیر بیش از حد دارو می تواند به کاهش قند خون (هیپوگلیسمی) منجر گردد.

- علایم کمی قند خون باشد قیل از بروز بیهوشی درمان گردد. این علایم در افراد مختلف متفاوت است، لذا آگاهی داشتن از علایم معمول کمی قند خون به منظور درمان سریع آن ضروری است.

این علایم می تواند شامل موارد زیر گردد:

احساس اضطراب، تغییر رفتار، تاری دید، عرق سرد، اغتشاش شعور، پوست رنگ پریده سرد، اشکال در ترکز حواس، خواب آلودگی، گرسنگی مفرط، ضربان تندر قلب، سردرد، تهوع، عصبانیت، کابوس، خواب نارام، لرزش، اشکال در تکلم، خستگی یا ضعف غیر عادی.

- علایم کمی قند خون که ممکن است به سرعت پیشرفت نماید، ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:

سوء تغذیه، تأخیر در یک نوبت مصرف غذا یا عدم مصرف آن، فعالیت بیشتر از حد معمول، عدم توازن بین فعالیت فیزیکی و مصرف کربوهیدرات، مصرف مقادیر زیاد الكل، مصرف برخی داروهای مصرف بیش از حد دارو، استفاده از مقادیر زیاد انسولین و بیماری (خصوصا همراه با استفراغ و اسهال)، بی کفایتی کبدی و کلیوی، اختلالات تیروئیدی، کم کاری هیپوفیز و بی کفایتی غده فوق کلیوی.

- مصرف برخی قندهای سریع الاثر در هنگام شروع علایم کمی قند خون، از شدت آن می کاهد.

منابع مناسب قند عبارتند از:

آب میوه، نوشابه های غیر رژیمی (نصف فنجان)، شربت یا عسل (یک قاشق غذاخوری)، تکه های قند و شکر (حل شده در آب).

- از مصرف شکلات پرهیز نمایید، زیرا که چربی آن ورود قند به جریان خون را کاهش می دهد.

- اگر برنامه مصرف تنقلات برای مدت یک ساعت یا بیشتر از آن در نظر گرفته نشده باشد، به عنوان تنقلات سبک می توان از نصف ساندویچ یا یک لیوان شیر استفاده نمود.

۵- مشکل دیگر در ارتباط با عدم کنترل بیماری دیابت، زیادی قند خون است. در صورت مشاهده هر یک از علایم زیادی قند خون، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. اگر زیادی قند خون درمان نگردد، هیپوگلیسمی شدید ایجاد شده، منجر به کتواسیدوز (اغمای دیابتی) و مرگ می گردد.

- علایم زیادی قند خون آهسته تر از علایم کمی قند خون ظاهر می گردد. این علایم می تواند شامل موارد زیر شود: تاری دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، برافروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، ازدیاد ادرار، کاهش اشتها، درد معده، تهوع یا استفراغ، خستگی، اشکال در تنفس سریع و عمیق) و تشنجی غیر عادی.

۶- در کتواسیدوز یا اغمای دیابتی که زیادی قند خون شدید است و نیاز به بستری شدن در بیمارستان را دارد، علایم شامل برافروختگی و خشکی پوست، بوی تنفس استونی، حضور کتون ها در ادرار، بیهوشی ناگهانی و اشکال در تنفس (سریع و عمیق) می گردد. علایم زیادی قند خون ممکن است به دلایل زیر ایجاد شود:

- تب، اسهال یا عفونت.

- در صورت استفاده از انسولین، عدم مصرف مقدار کافی و یا از دست دادن یک نوبت از مصرف آن

- نداشتن تمرينات بدنه معمول

- خوردن بیش از حد یا عدم رعایت رژیم غذایی

#### تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

میکونازول - به علت افزایش اثر کاهنده قند خون گلی کلازید با این دارو، احتمال بروز هیپوگلیسمی (افت قند خون) و حتی کوما وجود دارد. مصرف توان این داروها منع است.

فنیل بوتاژون - اثر کاهنده قند خون گلی کلازید را افزایش می دهد و مصرف توأم آنها توصیه نمی گردد. ترجیحاً از یک داروی ضد التهاب دیگر استفاده شود.

الکل - اثر کاهنده قند خون را افزایش می دهد که می تواند به شروع کومای هیپوگلیسمی ختم شود. از مصرف الكل و داروهای حاوی الكل همراه با این دارو خودداری شود.

ساخیر داروهای ضد دیابت (انسولین، آکاربوز، متفورمین، داروهای تیازولیدیندیون، مهارکننده های دی پیتیدیل پیتیداز، آگونیست های گیرنده های GLP-1)،

بتابلوکرها، فلوكونازول، داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنزیم مهارکننده های گیرنده  $H_2$ ، داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز، سولفونامیدها، کلاریتروومایسین و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی - اثر کاهنده قند خون این دارو تشدید می گردد و مصرف توأم آنها باید با احتیاط انجام شود. دانازول - مصرف توأم این داروها به دلیل افزایش مقدار قند خون توصیه نمی گردد. در صورت نیاز به مصرف توأم داروها، پایش دقیق میزان قند خون و ادار ضروری است. کلرپرومازین - مصرف مقادیر بالای کلرپرومازین (بیشتر از ۱۰۰ میلی گرم در روز)، میزان قند خون را افزایش می دهد و مصرف توأم آنها باید با احتیاط انجام شود. گلوكورتیکوئیدها - مصرف توأم این داروها باعث افزایش مقدار قند خون و احتمال بروز کتوز می گردد. رعایت احتیاط ضروری است. ریتودرین، سالبوتامول، تربوتالین (تزریقی) - مقدار قند خون افزایش می باید. پایش دقیق میزان قند خون ضروری است. داروهای ضد انعقاد (وارفارین) - گلی کلازید ممکن است باعث تشدید اثرات ضد انعقادی داروهای ضد انعقاد شود.

### قدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پیشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:  
برای درمان دیابت نوع دوم :

بزرگسالان - در شروع، ۳۰ میلی گرم یک بار در روز در هنگام صحیح است. در صورت کنترل موثر میزان قند خون، این مقدار مصرف ممکن است به عنوان درمان نگهدارنده بکار رود. در صورت عدم کنترل میزان قند خون به حد کافی، مقدار مصرف ممکن است به ۶۰، ۹۰ یا ۱۲۰ میلی گرم در روز افزایش یابد. فواصل بین افزایش هر دوز نباید کمتر از یک ماه باشد، مگر در بیمارانی که مقدار قند خون آنها پس از دو هفته درمان کاهش نیافته باشد. در چنین مواردی مقدار مصرف ممکن است در پایان هفته دوم درمان افزایش یابد. حداقل مقدار مصرف روزانه ۱۲۰ میلی گرم است.

کودکان - بی خطری و کارآبی دارو در کودکان ثبت نگردیده است.  
درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید، حتی اگر احساس بهبودی نموده و علایمی از بالا بودن میزان قند خون را مشاهده نکنید. این دارو را بیشتر و یا به مدت طولانی تر از دستور پزشک مصرف ننمایید. مصرف بیش از حد دارو ممکن است شناس برس عوارض ناخواسته را افزایش دهد. به یاد داشته باشید که این دارو بیماری قند را علاج نمی کند، ولیکن به کنترل آن کمک می نماید. لذا ممکن است مصرف آن برای تمام عمر ضروری باشد. اگر زیادی قند خون مورد درمان قرار نگیرد، می تواند باعث خطرات جدی مانند نارسایی قلب، بیماریهای عروق خونی، چشم و کلیه گردد.

۲- قرص را به طور کامل بلع نموده، از خرد کردن و جویدن آن خودداری نمایید.

۳- مقدار کالری مورد نیاز روزانه شما باید توسط پزشک یا متخصص تغذیه تعیین گردد و رعایت دقیق آن بسیار ضروری است.

۴- نوع فعالیت فیزیکی، بهترین زمان انجام و میزان آن باید توسط پزشک تعیین گردد.  
۵- بهترین روش برای کنترل صحیح بیماری، آزمایش قند خون است. بدین ترتیب مقدار مصرف دارو، برنامه غذایی و فعالیت فیزیکی را می توان تنظیم نمود.

۶- در صورت ابتلاء به بیماریهای نظری سرماخوردگی، تب و آنفلوانزا، خصوصاً اگر با تهوع، استفراغ و یا اسهال همراه باشد، استفاده از مقدار مصرف معمول دارو ضروری است. عموولاً در عفونت نیاز به تولید انسولین افزایش می یابد.

۷- در صورت اشکال در بلع غذای جامد از آب میوه، نوشابه های غیر رژیمی، سوپهای رقیق، یا مقادیر کم غذاهای نرم استفاده نمایید.

- میزان قند خون را حداقل هر ۴ ساعت یک بار اندازه گیری نموده و حضور کتون ها در ادرار را کنترل نمایید. در صورت وجود کتون ها، سریعاً با پزشک تماس بگیرید. در صورت استفراغ شدید یا طولانی به پزشک اطلاع دهید.

۸- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یادآوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

### عارض جانی :

هر دارو به موارد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:  
بیشتر شایع - کاهش میزان قند خون.

کمتر شایع - حملات تشنجی؛ بیهوش شدن.

برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل تغییرات در احساس طعم؛ یبوست؛ اسهال؛ سرگیجه؛ افزایش حجم یا دفعات ادرار؛ سوزش سرده؛ افزایش یا کاهش اشتها؛ دفع گاز؛ درد معده؛ احساس پُری یا ناراحتی و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.  
توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایم کاهش شدید میزان قند خون شامل اغماء، حملات تشنجی و اختلالات عصبی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

### شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.  
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری  
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶ - ۰۲۱

تلفن شکایات: ۰۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۴۵۰۰۲۲۹

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) :

ایمیل جهت ارتباط مشتری :

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۸/۰۱

### ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

**عبدی**

ناسیں

