

گلوریپا® به صورت قرص های خوارکی، روکشدار، گرد، محدب و به رنگ زرد است. هر قرص به ترتیب حاوی ۱۰ و یا ۲۵ میلی گرم امپاگلیفلوزین است و در جعبه های ۳۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

مورد مصرف:

دیابت ملیتوس نوع ۲ (دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین) به عنوان درمان کمکی در کنار رژیم غذایی و ورزش جهت بهبود کنترل قند خون.
راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
 - ۲- بارداری یا شیردهی
 - ۳- استفاده از سایر داروها
 - ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
 - ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب
- موارد منع مصرف:**

- ۱- حساسیت به امپاگلیفلوزین یا هر یک از مواد متشکله این دارو
- ۲- نارسایی شدید کلیوی
- ۳- بیماران تحت دیالیز
- ۴- مرحله انتهایی بیماری کلیوی
- ۵- دیابت نوع یک
- ۶- کتونی (افزایش کتونها در خون یا ادرار)

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو بخصوص طی سه ماهه دوم و سوم بارداری توصیه نمی شود.
شیردهی - در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. به دلیل احتمال بروز عوارض ناخواسته جدی در نوزاد شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.
هشدارها:

- ۱- بخطیری و کارآیی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.
- ۲- تنظیم مقدار مصرف دارو بر اساس سن ضرورت ندارد. احتمال کاهش حجم داخل عروقی، نارسایی کلیوی و عفونت مجاری ادراری در افراد سالخورده بیشتر است.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید: عفونت های قارچی دستگاه تناسلی - احتمال بروز عفونت های قارچی دستگاه تناسلی در بیماران با سابقه قبلی این عفونت ها و مردان ختنه نشده بیشتر است. کاهش فشار خون - احتمال کاهش فشار خون علامتی به علت کاهش حجم داخل عروقی، بخصوص در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، بیماران سالخورده، بیماران تحت درمان با داروهای مدر و بیماران با فشار خون سیستولی پایین وجود دارد.

اختلالات چربی خون - احتمال افزایش کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL-C) وجود دارد. لذا مقدار LDL-C باید مورد پایش قرار گیرد و در صورت نیاز درمان انجام شود.
بیماریهای کلیوی - احتمال غیرعادی شدن عملکرد کلیه بخصوص در بیماران سالخورده و بیماران با سابقه قبلی نارسایی کلیوی وجود دارد.
عفونت دستگاه ادراری - احتمال ابتلاء به عفونت دستگاه ادراری ممکن است افزایش یابد. علایم و نشانه های عفونت دستگاه ادراری باید مورد پایش قرار گیرد و در صورت لزوم درمان انجام شود.
کتونی (کتونی) - مصرف این دارو توصیه نمی شود.

دیابت ملیتوس نوع یک (دیابت وابسته به انسولین) - مصرف این دارو توصیه نمی گردد.
موارد احتیاط:

- ۱- این دارو ممکن است سبب گیجی در برخی افراد شود. این اثر در مصرف همزمان با الکل یا برخی داروهای ممکن است شدت یابد. لذا ضمن درمان، از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری کنید.
- ۲- امپاگلیفلوزین ممکن است باعث گیجی، منگی و یا سنکوپ گردد. احتمال بروز این اثرات بخصوص در مصرف همزمان با الکل، آب و هوای سیار گرم، ورزش یا تپ ممکن است افزایش یابد. به منظور جلوگیری از این اثرات، نشستن با ایستادن را به آرامی انجام دهید، بخصوص اگر در هنگام صبح باشد.
- ۳- همیشه کارت شناسایی خود که نشان دهنده ابتلاء شما به بیماری دیابت است را به همراه داشته باشید.
- ۴- برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید. رژیم غذایی صحیح، تمرینات ورزشی منظم و آزمایش مرتباً قند خون در اثربخشی این دارو دارای نقش موثری می باشد.
- ۵- مقدار قند خون را مطابق با دستور پزشک کنترل نمایید. در صورت افزایش یا کاهش مقدار قند خون در هنگام مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۶- مقدار مصرف دارو را بدون دستور پزشک افزایش ندهید.
- ۷- کنترل میزان قند خون در شرایط استرس مانند تپ، عفونت، جراحت یا شرایطی با پزشک خود مشورت نموده، بدون تجویز وی از تغییر مقدار مصرف دارو خودداری کنید.
- ۸- در هنگام مصرف این دارو، بخصوص در هوای گرم و یا فعالیت بدنی، مراقب از دست دادن آب بدن ممکن است باعث افزایش احتمال عوارض جانبی امپاگلیفلوزین گردد.
- ۹- در صورت استفراغ یا اسهال، به منظور جلوگیری از کاهش آب بدن، با پزشک خود تماس بگیرید.
- ۱۰- قبل از انجام هرگونه مراقبت های پزشکی یا دندانپزشکی، فوریت های پزشکی و یا جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۱۱- این دارو عموماً باعث قند خون پایین نمی شود، ولی اگر همزمان با سایر داروهای پایین آورنده قند خون مانند انسولین و سولفونیل اوردها مصرف گردد، ممکن است باعث افت قند خون شود. علایم کمی قند خون، اضطراب، تعریق، ضعف، گیجی، خواب آلودگی، سنکوپ، ضربان تند قلب، تغییرات بینایی، سردرد، لرزش و گرسنگی را شامل می گردد. مصرف برخی قندهای سریع الاثر مانند قرص یا ژل گلوكز برای درمان افت قند خون مفید است. در صورت عدم دسترسی به این مواد، خوردن یا آشامیدن منابع سریع قند مانند حبه قند، عسل، آب نبات، آب پرتقال

یا سودای غیر رژیمی کمک می نماید. به منظور جلوگیری از افت قند خون، وعده های مشخص طی روز مصرف نموده و هیچ یک از وعده های غذایی را از دست ندهید.

۱۲- این دارو باعث مثبت شدن آزمایش قند ادرار می گردد. لذا قبل از انجام این آزمایش، پزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

۱۳- در هنگام مصرف این دارو، آزمایشات مربوط به سطح کلسترول خون، عملکرد کلیوی، قند خون ناشتا و هموگلوبین A1c را انجام دهید. این آزمایشات به منظور پایش بیماری و یا کنترل عوارض جانبی صورت می گیرد. از این رو در فواصل منظم به پزشک مراجعه نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

آندروروژن ها (به غیر از دانازول)، انسولین و سایر داروهای کاهنده قند خون، پگویسومانت - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده قند خون امپاگلیفلوزین ممکن است افزایش یابد.

کورتیکواستروئید های سیستمیک، دانازول، سوماتروپین - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده قند خون امپاگلیفلوزین ممکن است کاهش یابد.

دلوكستین، لوودوبا - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده فشار خون وضعیتی ناشی از مصرف این داروها ممکن است افزایش یابد.

داروهای کاهنده فشار خون - با مصرف همزمان داروها، عوارض جانبی و سمیت سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است کاهش یابد.

هورمون های لوئیزینه کننده، آنالوگ های ترشح کننده هورمون، داروهای مدر تیازیدی - با مصرف همزمان داروها، اثر درمانی امپاگلیفلوزین ممکن است کاهش یابد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:

برای درمان دیابت ملیتوس نوع ۲:

بزرگسالان -

۱۰ میلی گرم یک بار در روز هنگام صحیح است. در صورت نیاز، مقدار مصرف ممکن است توسط پزشک تا ۲۵ میلی گرم یک بار در روز افزایش یابد.

کودکان - بی خطری و کارآیی این دارو در کودکان ثبت نشده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید. گاهی اوقات ممکن است پزشک مقدار مصرف دارو را در صورت نیاز تغییر دهد.

۲- این دارو را یک بار در روز در هنگام صحیح، همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمایید.

۳- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضد دیابت ممکن است توسط پزشک توصیه گردد. در چنین شرایطی افت قند خون می تواند حادث شود.

۴- در شرایط استرس مانند تب، ضربه (مانند تصادف با ماشین)، عفونت و یا جراحی، ممکن است مقدار مصرف دارو تغییر یابد.

۵- در هنگام مصرف این دارو، رژیم غذایی و تمرینات ورزشی توصیه شده توسط پزشک را رعایت نمایید.

۶- کنترل دیابت با انجام آزمایشات دوره ای منظم شامل تعیین میزان قند خون و هموگلوبین HbA1c توسط پزشک انجام می گیرد.

۷- در مورد نحوه پیشگیری، شناسایی و کنترل قند خون پایین (هیپوگلیسمی)، قند خون بالا (هیپرگلیسمی) و مشکلات مربوط به بیماری دیابت، با پزشک خود مشورت نمایید.

۸- در هنگام مصرف این دارو، ممکن است در ادرار قند مشاهده گردد.

۹- در مورد مصرف بیشتر مایعات با پزشک خود مشورت نمایید.

۱۰- جهت اثربخشی بیشتر و همچنین به خاطر سپردن مصرف روزانه، این دارو را هر روز در یک زمان مشخص میل نمایید.

۱۱- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عارض جانبی:

هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کتواسیدوز شامل تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، خستگی و اشکال در تنفس؛ قند خون پایین شامل سردرد، خواب آلودگی، ضعف، تحریک پذیری، گرسنگی، ضربان سریع قلب، اغتشاش شعور، لرز یا احساس عصبی بودن، گیجی و تعریق؛ عفونت های جدی دستگاه ادراری شامل احساس سوزش در هنگام دفع ادرار، تکرر ادرار، درد در بخش پایینی شکم (لگن)، ادرار خونی، تب، درد در ناحیه پشت، تهوع یا استفراغ؛ افزایش میزان کلسترول خون.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مرکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری کنید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۴۴۴۵ - ۱۵۶

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو:

دورنگار: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

۰۲۱ - ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری:

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:

تاریخ ویرایش: ۹۷/۰۲/۲۹

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

سبزدست

ناسیس