

ترکیبات، شکل دارویی و نحوه ارایه:

اکساتنت[®] ۶۰۰ به صورت قرص‌های خوراکی، کشیده، محدب، روکشدار و به رنگ سفید است. هر قرص حاوی ۶۰۰ میلی‌گرم لینزولید است که در جعبه‌های ۲۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

اکساتنت[®] ۶۰۰ به گروهی از داروها به نام آنتی‌بیوتیک‌ها وابسته است. آنتی‌بیوتیک‌ها داروهایی می‌باشند که جهت درمان عفونت‌های ایجاد شده توسط باکتری‌ها بکار می‌روند. این داروها باکتری‌ها را از بین برده و یا از رشد آنها جلوگیری می‌نمایند. اکساتنت[®] ۶۰۰ برای درمان سرماخوردگی‌ها، آنفلوآنزا یا سایر عفونت‌های ویروسی بکار نمی‌رود. این دارو برای درمان عفونت‌های خون، ریه‌ها و پوست بکار می‌رود. این دارو اساساً برای عفونت‌های جدی که سایر داروها موثر نمی‌باشند، بکار می‌رود و فقط با نسخه پزشک در دسترس می‌باشد.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به لینزولید و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- مصرف همزمان و یا در طی دو هفته اخیر از مصرف داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز A یا B (شامل فنلزین و ایزوکربوکسازید)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو طی دوران بارداری و در صورت نیاز قطعی به آن باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.
شیردهی - تاکنون مشخص نیست که این دارو در شیر انسان ترشح شود. به دلیل ترشح بسیاری از داروها در شیر، مصرف آن در زنان شیرده باید با احتیاط انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- بی‌خطری و کارآیی این دارو در نوزادان و کودکان تا سن ۱۱ سال برای پنومونی بیمارستانی، عفونت‌های سخت پوست و عفونت‌های ساختار پوست، پنومونی اکتسابی جامعه و عفونت‌های ناشی از انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به ونکومايسين و در کودکان ۵ الی ۱۷ سال برای درمان عفونت‌های ساده پوست و عفونت‌های ساختار پوست ثبت شده است. این دارو برای عفونت‌های سیستم عصبی مرکزی در کودکان توصیه نمی‌گردد.
- ۲- مطالعات انجام شده در افراد سالخورده، مشکلات یا عوارض جانبی متفاوت با افراد جوان‌تر را نشان نداده است که باعث محدودیت مصرف آن در افراد سالخورده گردد.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
اسهال - تشخیص اولیه نوع اسهال قبل از تجویز این دارو ضروری می‌باشد.
فشار خون کنترل نشده - این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون گردد، لذا مصرف آن در این بیماران توصیه نمی‌گردد.
سندرم کارسینوئید (سندرم تومور دستگاه گوارش) - مصرف این دارو توصیه نمی‌گردد، مگر آن که به لحاظ بالینی مورد نیاز باشد.
دپرسیون مغز استخوان - احتمال بروز کم خونی، لکوپنی، پان‌سیتوپنی و ترومبوسیتوپنی، بخصوص با مصرف بیشتر از دو هفته این دارو گزارش شده است. در صورت تشدید سرکوب مغز استخوان، قطع مصرف دارو باید انجام گیرد.
مشکلات هورمونی و متابولیکی - احتمال اسیدوز لاکتیک در این بیماران وجود دارد.
دیابت - این دارو ممکن است در بیماران دیابتی تحت درمان توأم با انسولین یا داروهای کاهنده قند خون، باعث کاهش قند خون علامتی گردد. تنظیم مقدار مصرف یا قطع مصرف آن ممکن است ضروری باشد.
تیروتوکسیکوز (افزایش فعالیت غده تیروئید)، فئوکروموسیتوما - احتمال افزایش فشار خون در این بیماران وجود دارد، لذا مصرف آن توصیه نمی‌گردد.
سابقه یا زمینه تشنج - احتمال بروز تشنج در این بیماران وجود دارد.

موارد احتیاط:

- ۱- در صورت عدم بهبودی علائم طی چند روز از مصرف دارو و یا بدتر شدن وضعیت، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۲- در صورت مشاهده علائمی مانند درد شکم، کاهش اشتها، اسهال، تنفس سریع یا کم عمق، احساس عمومی ناراحتی، درد یا انقباض عضله، تهوع، تنگی نفس، خواب آلودگی، خستگی یا ضعف غیرعادی و استفراغ، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. این علائم می‌تواند ناشی از یک بیماری جدی باشد.
- ۳- احتمال بروز نوروپاتی محیطی و بینایی در بیماران تحت درمان با این دارو بخصوص اگر درمان بیشتر از ۲۸ روز انجام گیرد، گزارش شده است.
- ۴- با مصرف این دارو اختلالات بینایی مانند تغییر در دقت بینایی، دید رنگ، تاری دید و نقص میدان دید گزارش شده است.
- ۵- این دارو ممکن است باعث کاهش موقت تعداد گلبول‌های سفید خون و افزایش احتمال ابتلاء به عفونت شود. این دارو همچنین ممکن است تعداد پلاکت‌ها را که برای ایجاد لخته خون مورد نیاز می‌باشند را کاهش دهد. در چنین شرایطی، بخصوص اگر شمارش گلبول‌های خون پایین باشد و به منظور کاهش احتمال بروز عفونت یا خونریزی، پزشک شما ممکن است موارد زیر را توصیه نماید:
 - از تماس با افراد مبتلا به عفونت پرهیز نمایید. در صورت احساس ابتلاء به عفونت، تب و یا لرز، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
 - در صورت مشاهده هرگونه خونریزی یا کبودی با پزشک تماس بگیرید.
 - از دست زدن به چشم‌ها و یا داخل بینی خودداری نمایید، مگر آن که از قبل دست‌های خود را شسته باشید.
 - در هنگام استفاده از وسایل تیزی مانند تیغ و ناخن‌گیر احتیاط نمایید تا منجر به خراش نگردد.
 - در صورت احتمال بروز کبودی و یا صدمات دیگر، از ورزش‌های تماسی خودداری نمایید.
- ۶- این دارو اگر با برخی غذاها و یا داروها مصرف شود، می‌تواند باعث افزایش فشار خون گردد. به منظور جلوگیری از بروز این عارضه، توصیه می‌گردد از مصرف فراوان غذاها یا نوشابه‌های حاوی مقادیر زیاد تیرامین (موجود در غذاهای مانده، تخمیر شده، ترشی و دودی) خودداری شود.

تداخل‌های دارویی:

- قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر طی ۲ هفته اخیر استفاده نموده‌اید، پزشک خود را مطلع سازید. این داروها نباید همزمان با اکسانت* ۶۰۰ مورد استفاده قرار گیرند.
- داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (مانند فنلزین، ایزوکربوکسازید، سلجیلین، مکلوماید) که جهت درمان افسردگی و یا بیماری پارکینسون مصرف می‌گردند.
 - همچنین در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر با پزشک خود مشورت نمایید. پزشک شما ممکن است داروی اکسانت* ۶۰۰ را تجویز نماید، اما وضعیت سلامت عمومی و فشار خون شما را قبل و طی درمان کنترل نماید. در برخی موارد، پزشک ممکن است داروی دیگر را برای درمان توصیه نماید.
 - داروهای سرماخوردگی یا آنفلوآنزای ضد احتقان شامل سودوافدرین یا فنیل پروپانول آمین.
 - برخی داروهایی که برای درمان آسم بکار می‌روند، مانند سالبوتامول، تربوتالین و فنوتروپ.
 - برخی داروهای ضد افسردگی مانند داروهای سه حلقه‌ای و یا داروهای مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین. این داروها شامل آمی‌تریپتیلین، کلومیپرامین، دکسپین، فلوکستین، فلووکسامین، ایمپرامین، پاروکستین و سرتالین می‌گردد.
 - داروهایی که برای درمان میگرن بکار می‌روند، مانند سوماتریپتان و زولمی‌تریپتان.
 - داروهایی که برای درمان واکنش‌های ناگهانی و شدید آلرژیک بکار می‌روند مانند آدرنالین (اپی‌نفرین).
 - داروهایی که فشار خون را افزایش می‌دهند مانند نورآدرنالین (نوراپی‌نفرین)، دوپامین و دوبوتامین.
 - داروهایی که برای درمان دردهای متوسط تا شدید بکار می‌روند، مانند پتیدین.
 - داروهایی که برای اختلالات اضطرابی بکار می‌روند، مانند بوسپیرون.
 - داروهایی که برای جلوگیری از لخته خون بکار می‌روند، مانند وارفارین.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف معمول این دارو، یک قرص ۶۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز به فواصل هر ۱۲ ساعت است. دوره درمان معمولاً بین ۱۰ تا ۱۴ روز است ولیکن می‌تواند تا ۲۸ روز ادامه یابد. بی‌خطری و کارایی این دارو برای درمان‌های طولانی‌تر از ۲۸ روز ثبت نشده است.
- در صورت دیالیز کلیه، مصرف این دارو باید پس از درمان دیالیز انجام گیرد.
- این دارو معمولاً برای درمان در کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال بکار نمی‌رود.
- در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:**
- ۱- قرص را به طور کامل همراه با مقداری آب بلع نمایید.
 - ۲- دارو را پس از انقضای مدت مصرف که بر روی قوطی و جعبه ذکر شده است، مصرف نکنید.
 - ۳- این دارو را برای دوره کامل درمان حتی در صورت احساس بهبودی مصرف نمایید. همچنین مصرف دارو باید مطابق با یک برنامه معین انجام گیرد.
 - ۴- در حین مصرف این دارو، به منظور پایش تعداد گلبول‌های خون، انجام آزمایشات خون در فواصل منظم ضروری است.
 - ۵- در صورت مصرف دارو به مدت بیشتر از ۲۸ روز، پایش بینایی ضروری است.
 - ۶- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
- بیشتر شایع - اسهال.**
- کمتر شایع یا نادر -** انقباضات یا درد شدید شکم یا معده؛ مدفوع قیر مانند؛ وجود خون در ادرار یا مدفوع؛ لرز؛ سرفه؛ اسهال (شدید و آبکی که ممکن است خون آلود نیز باشد)؛ ترشحات و خارش واژن؛ تب؛ سردرد؛ خشونت صدا؛ درد ناحیه تحتانی پشت یا پهلو؛ ادرار کردن دردناک یا با اشکال؛ نقاط ریز سوزنی قرمز رنگ بر روی پوست؛ تنگی نفس؛ زخم یا لکه‌های سفید در دهان، زبان یا گلو؛ خونریزی یا کبودی غیرعادی؛ خستگی یا ضعف غیرعادی.
- برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل تهوع؛ طعم بد دهان؛ تغییر در حس چشایی؛ تغییر در رنگ زبان؛ گیجی؛ از دست دادن طعم و مزه و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.
- توجه -** در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را تا زمان مصرف درون ظرف اصلی خود نگهداری نمایید.
- بعد از هر بار مصرف، درپوش ظرف را محکم ببندید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱
دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹
ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com
پست الکترونیک: info@abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۹۷/۰۲/۱۷

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

