

زیپمیت® به صورت قرص‌های خوارکی، روکشدار، کشیده، محدب، خطدار و به رنگ صورتی (زیپمیت® ۵۰/۵۰۰) و یا قرمز (زیپمیت® ۱۰۰/۱۰۰۰) است. هر قرص حاوی ۵۰ میلی‌گرم سیتاگلیپتین (به صورت فسفات) و ۵۰۰ میلی‌گرم متفورمین هیدروکلراید (زیپمیت® ۵۰/۵۰۰) و یا ۵۰ میلی‌گرم سیتاگلیپتین (به صورت فسفات) و ۱۰۰۰ میلی‌گرم متفورمین هیدروکلراید (زیپمیت® ۱۰۰/۱۰۰۰) است و در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

۰- سابقه واکنش حساسیتی شدید به زیپمیت® یا سیتاگلیپتین مانند آنافیلاکسی یا آنژیوادم

۰- سابقه واکنش حساسیتی به متفورمین هیدروکلراید

۰- دیابت نوع یک

۰- اسیدوز متابولیک حاد یا مزمن شامل کتواسیدوز دیابتی همراه با و یا بدون اغماء و افزایش کتون‌ها در خون یا ادرار

۰- بیماری شدید و اختلال عملکرد کلیه که ممکن است ناشی از شرایطی چون کولaps قلیع عروقی (شوك)، انفارکتوس حاد میوکارد و یا سپتی سمی باشد

۰- بیماری شدید، حاد یا مزمن کبد

۰- در بیماران تحت بررسی‌های رادیولوژی با تزریق عضلانی مواد کنتراست یددار

۰- سوختگی‌های شدید ۰- از دست دادن شدید آب بدن

۰- ضربات شدید

۰- در شرایطی که کاهش میزان اکسیژن خون وجود دارد ۰- در بیماران با سن بالاتر از ۸۰ سال

صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و بخوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در دوران بارداری در صورت نیاز قطعی به آن، تحت نظر پزشک معالج مجاز می‌باشد.

شیردهی - در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد. لذا مصرف آن طی این دوران باید با احتیاط انجام گیرد.

هشدارها:

۱- بی‌خطری و کارآیی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.

۲- به دلیل احتمال کاهش عملکرد کلیه در افراد سالخورده، قبل از شروع مصرف این دارو و سپس به صورت دوره‌ای، عملکرد کلیوی در این افراد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در کارآیی و ایمنی دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

۰- اختلال عملکرد کلیه - مصرف این دارو در بیماران مبتلا به اختلال متوسط یا شدید عملکرد کلیه توصیه نمی‌گردد.

۰- اختلال خودکار کبد - مصرف دارو در این بیماران معمولاً توصیه نمی‌گردد.

موارد احتیاط :

۱- همیشه کارت شناسایی خود که نشان دهنده ابتلای شما به بیماری دیابت است را به همراه داشته باشید.

۲- برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید. رژیم غذایی صحیح، تمرینات ورزشی منظم و آزمایش مرتب قند خون در اثربخشی این دارو دارای نقش موثری می‌باشد.

۳- مقدار قند خون را مطابق با دستور پزشک کنترل نمایید. در صورت افزایش یا کاهش مقدار قند خون در هنگام مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت نمایید.

۴- مقدار مصرف دارو را بدون دستور پزشک افزایش ندهید.

۵- کنترل میزان قند خون در شرایط استرس مانند تب، عفونت، جراحت یا جراحی ممکن است دشوارتر باشد. در چنین شرایطی با پزشک خود مشورت نموده، بدون تجویز وی از تغییر مقدار مصرف دارو خودداری کنید.

۶- در هنگام مصرف این دارو، آزمایشات مربوط به قند خون ناشتا، هموگلوبین A1C و عملکرد کلیوی را انجام دهید. این آزمایشات به منظور پایش بیماری و یا کنترل عوارض جانبی صورت می‌گیرد. از این رو در فواصل منظم به پزشک مراجعه نمایید.

۷- متفورمین موجود در این دارو می‌تواند باعث یک عارضه نادر اما بسیار جدی بنام اسیدوز لاکتیک (تشکیل اسید لاکتیک در خون) گردد که حتی می‌تواند منجر به مرگ شود. اسیدوز لاکتیک یک مورد فوریت دار پزشکی است که باید در بیمارستان درمان گردد. در صورت مشاهده عوارض زیر که به علت اسیدوز لاکتیک رخ می‌دهد، مصرف دارو را قطع نموده و بلافصله با پزشک خود تماس بگیرید:

- احساس ضعف و خستگی مفرط - درد عضلانی غیر معمول

- مشکلات معدی یا روده همراه با تهوع و استفراغ و یا اسهال

- احساس سرما بخصوص در بازو و ساق - احساس گیجی یا منگی

- ضربان کند یا غیرعادی قلب

احتمال ابتلاء به اسیدوز لاکتیک تحت شرایط زیر افزایش می‌باید:

- بیماری‌های کلیه - بیماری‌های کبد

- نارسایی احتمانی قلب که به درمان دارویی نیاز دارد - مصرف مقادیر زیادی از مایعات بدن

- دهیدراته شدن (از دست دادن مقادیر زیادی از مایعات بدن) که ناشی از تب، استفراغ یا اسهال است. دهیدراسیون همچنین می‌تواند به علت تعریق زیاد حین فعالیت و تمرینات بدنی و عدم مصرف مقادیر کافی مایعات ایجاد شود.

- عکس برداری با اشعه ایکس با یا بدون مواد حاجب

- عمل جراحی - حمله قلبی، عفونت شدید یا حمله

- در افراد سالخورده بالاتر از ۸۰ سال که عملکرد کلیوی آنها بررسی نشده است.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

توبیرامات، وزنیساماید و استازولامید - مصرف تؤام این داروها با زیپمیت® ممکن است باعث اسیدوز متابولیک گردد. لذا رعایت احتیاط ضروری است.

دیگوکسین – در مصرف هم زمان، مقدار دیگوکسین در خون به میزان جزئی افزایش می‌یابد. بیماران تحت درمان با دیگوکسین باید به دقت مورد پایش قرار گیرند. تنظیم مقدار مصرف دیگوکسین یا زیپمت^۸ توصیه نمی‌گردد.

نیبدپین – مصرف تأم داروها باعث افزایش مقدار متغورمین در خون و افزایش دفع ادراری آن می‌گردد. بنظر می‌رسد نیبدپین میزان جذب متغورمین را افزایش می‌دهد.

سایمیدین و سایر داروهای کاتیوئنی (مانند آمیلوراید، دیگوکسین، مرفین، پروکاتین آمید، کینیدین، کینین، رانیتیدین، تربامترن، تربامترن، تربامترن، تربامترن، وانکومایسین) – در مصرف تأم این داروها با زیپمت^۹ تنظیم مقدار مصرف و پایش دقیق بیمار توصیه می‌گردد.

داروهای افزایش دهنده قند خون مانند تیازیدها، سایر داروها، کورتیکوستروئیدها، داروهای تیروئید، استروژن‌ها، داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی، فنی‌توئین، نیکوتینیک اسید، داروهای سمپاتومیمتیک، داروهای بلوكه کننده کاتال کلسیم و ایزوپنیازید – در مصرف تأم این داروها با زیپمت^{۱۰}، کنترل دقیق میزان قند خون بیمار ضروری است.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پرشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

بزرگسالان –

برای درمان دیابت ملیتوس نوع ۲ :

بیماران تحت درمان قبلی با متغورمین:

حداکثر مقدار مصرف – سیتاگلیپتین ۱۰۰ میلی‌گرم / متغورمین ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز است.

مقدار مصرف در شروع –

سیتاگلیپتین ۵۰ میلی‌گرم دو بار در روز همراه با مقدار مصرف قبلی متغورمین است. برای بیمارانی که در حال مصرف ۸۵۰ میلی‌گرم متغورمین دو بار در روز می‌باشند، مقدار مصرف پیشنهادی

در شروع، سیتاگلیپتین ۵۰ میلی‌گرم / متغورمین ۱۰۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز است.

در بیمارانی که کنترل قند خون آنها به درستی صورت نگرفته است و به منظور کاهش تحريكات گوارشی، تنظیم مقدار مصرف باید بتدریج انجام گیرد.

بیماران بدون درمان قبلی با متغورمین:

حداکثر مقدار مصرف – سیتاگلیپتین ۱۰۰ میلی‌گرم / متغورمین ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز است.

مقدار مصرف در شروع –

سیتاگلیپتین ۵۰ میلی‌گرم / متغورمین ۵۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز است.

در بیمارانی که کنترل قند خون آنها به درستی صورت نگرفته است و به منظور کاهش تحريكات گوارشی، تنظیم مقدار مصرف باید بتدریج انجام گیرد.

کودکان – بی خطری و کارآبی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نگردیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید. از مصرف مقادیر بیشتر و یا کمتر و یا به مدت طولانی‌تر از دستور پزشک خودداری نمایید. گاهی اوقات ممکن است پزشک مقدار

صرف دارو را جهت دستیابی به نتایج مطلوب تغییر دهد.

۲- به منظور کاهش احتمال تحريكات معده، این دارو را همراه با غذا میل نمایید.

۳- قند خون خود را به صورت دوره‌ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

۴- از مصرف دارو تحت شرایط زیر خودداری نموده، با پزشک خود تماس بگیرید:

دیده‌داری‌یون یا از دست دادن حجم زیادی از مایعات بدن

۵- عکس برداری با اشعه ایکس یا بدون مواد حاجب

۶- در شرایط استرس مانند تب، ضربه، تصادف، عفونت و یا جراحی، مقدار مصرف دارو ممکن است تغییر یابد.

۷- در مورد نحوه پیشگیری، شناسایی و کنترل قند خون پایین (هیپوگلیسمی)، قند خون بالا (هیپوگلیسمی) و مشکلات ناشی از بیماری دیابت با پزشک خود مشورت نمایید.

۸- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض شایع زیر سریعاً با

پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

آبریزش بینی و گلو درد؛ عفونت دستگاه تنفسی فوقانی؛ اسهال؛ تهوع و استفراغ؛ سوء هضم، ناراحتی و گاز معده؛ ضعف و سردرد.

عوارض جانبی ناشی از مصرف سیتاگلیپتین یکی از مواد دستکشی دهنده این دارو شامل واکنش‌های آلرژیک (مانند تورم صورت، لبه، زبان و گلو، اشکال در تنفس یا بلع، بشورات جلدی و کهیر)

می‌گردد.

توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی مانند قند خون پایین و اسیدوز لاتکیک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری :

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان قرار دهد.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبدالله
تأسیس ۱۳۲۵

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵ - ۱۵۶

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷

تلفن شکایات: ۰۲۹ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS) :

ایمیل جهت ارتباط مشتری:

پست الکترونیک:

سایت اینترنتی:

