

زیپتین® به صورت قرص های خوراکی، گرد، روکشدار و به رنگ صورتی (۲۵ میلی گرم)، کرم (۵۰ میلی گرم) و یا قهوه ای روشن (۱۰۰ میلی گرم) است. هر قرص به ترتیب حاوی ۲۵، ۵۰ و یا ۱۰۰ میلی گرم سیتاگلیپتین (به صورت فسفات) است و در جعبه های ۳۰ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می شود.

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماریهای دیگر
- ۵- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- سابقه واکنش حساسیتی شدید به سیتاگلیپتین مانند آنافیلاکسی آنژیوادم
- ۲- دیابت نوع یک
- ۳- کتواسیدوز دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار)

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و بخوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو در دوران بارداری تحت نظر پزشک معالج مجاز می باشد.
شیردهی - در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. لذا مصرف آن طی این دوران باید با احتیاط انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- بی خطری و کارایی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.
- ۲- هیچ گونه اختلاف معنی دار به لحاظ بی خطری و کارایی این دارو در افراد سالخورده با سن ۶۵ سال به بالا در مقایسه با افراد جوان تر، مشاهده نشده است. به دلیل احتمال کاهش عملکرد کلیه در افراد سالخورده، قبل از شروع مصرف این دارو و سپس به صورت دوره ای، عملکرد کلیوی در این افراد باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
- ۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
اختلال عملکرد کلیه - در بیماران مبتلا به اختلال متوسط یا شدید عملکرد کلیه و در بیماران تحت همودیالیز یا دیالیز صفاقی، تنظیم مقدار مصرف دارو توصیه می گردد.
- اختلال عملکرد کبد -** در بیماران مبتلا به اختلال متوسط عملکرد کبد، مقدار دارو در خون کمی افزایش می یابد. در چنین شرایطی تنظیم مقدار مصرف دارو ضروری نمی باشد.
- سابقه پانکراتیت (التهاب پانکراس) -** مصرف دارو در این بیماران باید با احتیاط و پایش دقیق انجام گیرد.

موارد احتیاط:

- ۱- همیشه کارت شناسایی خود که نشان دهنده ابتلای شما به بیماری دیابت است را به همراه داشته باشید.
- ۲- برنامه رژیم غذایی و تمرینات ورزشی تجویز شده توسط پزشک را رعایت کنید. رژیم غذایی صحیح، تمرینات ورزشی منظم و آزمایش مرتب قند خون در اثربخشی این دارو دارای نقش موثری می باشد.
- ۳- مقدار قند خون را مطابق با دستور پزشک کنترل نمایید. در صورت افزایش یا کاهش مقدار قند خون در هنگام مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۴- مقدار مصرف دارو را بدون دستور پزشک افزایش ندهید.
- ۵- کنترل میزان قند خون در شرایط استرس مانند تب، عفونت، جراحی یا جراحی ممکن است دشوارتر باشد. در چنین شرایطی با پزشک خود مشورت نموده، بدون تجویز وی از تغییر مقدار مصرف دارو خودداری کنید.
- ۶- قبل از انجام هرگونه مراقبت های پزشکی یا دندانپزشکی، فوریت های پزشکی و یا جراحی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۷- این دارو معمولاً باعث قند خون پایین نمی شود، ولی اگر همزمان با سایر داروهای پایین آورنده قند خون مانند انسولین و سولفونیل اوره ها مصرف گردد، ممکن است باعث افت قند خون شود. علائم کمی قند خون، اضطراب، تعریق، ضعف، گیجی، خواب آلودگی، سنکوپ، ضربان تند قلب، تغییرات بینایی، سردرد، لرزش و گرسنگی را شامل می گردد. مصرف برخی قندهای سریع الاثر مانند قرص یا ژل گلوکز برای درمان افت قند خون مفید است. در صورت عدم دسترسی به این مواد، خوردن یا

آشامیدن منابع سریع قند مانند حبه قند، عسل، آب نبات، آب پرتقال یا سودای غیر رژیمی کمک می نماید. به منظور جلوگیری از آفت قند خون، وعده های غذایی را در زمان های مشخص طی روز مصرف نموده و هیچ یک از وعده های غذایی را از دست ندهید.

۸- در هنگام مصرف این دارو، آزمایشات مربوط به قند خون ناشتا، هموگلوبین A_{1c} و عملکرد کلیوی را انجام دهید. این آزمایشات به منظور پایش بیماری و یا کنترل عوارض جانبی صورت می گیرد. از این رو در فواصل منظم به پزشک مراجعه نمایید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نماید، پزشک خود را مطلع سازید:

دیگوکسین - در مصرف همزمان، مقدار دیگوکسین در خون به میزان جزئی افزایش می یابد. بیماران تحت درمان با دیگوکسین باید به دقت مورد پایش قرار گیرند. تنظیم مقدار مصرف دیگوکسین یا سیتاگلیپتین توصیه نمی گردد.

داروهای سولفونیل اوره - در مصرف همزمان سیتاگلیپتین با یک داروی سولفونیل اوره، جهت کاهش خطر هیپوگلیسمی (قند خون پایین) ممکن است مقدار کمتری از داروی سولفونیل اوره مورد نیاز باشد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

برای درمان دیابت ملیتوس نوع ۲:

بزرگسالان - ۱۰۰ میلی گرم یک بار در روز است. این دارو ممکن است به تنهایی یا همراه با متفورمین مصرف شود.

کودکان - بی خطری و کارایی این دارو در کودکان ثبت نگردیده است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید. از مصرف مقادیر بیشتر و یا کمتر و یا به مدت طولانی تر از دستور پزشک خودداری نمایید. گاهی اوقات ممکن است پزشک مقدار مصرف دارو را جهت دستیابی به نتایج مطلوب تغییر دهد.

۲- این دارو را می توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود. از دستورات پزشک خود پیروی نمایید.

۳- از خورد کردن، جویدن و یا شکستن قرص خودداری کنید. آن را به طور کامل بلع نمایید.

۴- قند خون خود را به صورت دوره ای کنترل نموده و به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.

۵- در صورت ابتلا به بیماری کلیه، ممکن است مقادیر کمتر دارو توسط پزشک تجویز گردد.

۶- در شرایط استرس مانند تب، ضربه، تصادف، عفونت و یا جراحی، ممکن است مقدار مصرف دارو تغییر یابد.

۷- مصرف این دارو بخشی از یک برنامه کامل درمان است که شامل رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، کنترل وزن و احتمالاً مصرف سایر داروها می گردد.

۸- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نکرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

کهیر؛ اشکال در تنفس؛ ورم صورت، لبها، زبان و یا گلو؛ پانکراتیت (التهاب پانکراس که با درد شدید در بخش فوقانی معده یا پشت، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و ضربان سریع قلب همراه است)؛ کاهش حجم ادرار؛ افزایش وزن؛ واکنش شدید پوستی.

سایر عوارض جانبی کمتر شایع عبارتند از: آبریزش بینی، گلو درد؛ سردرد؛ درد ناحیه پشت؛ درد مفصل یا عضله؛ تهوع؛ درد معده؛ اسهال و یبوست.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی مانند قند خون پایین، ضعف بسیار زیاد، تاری دید، تعریق، اشکال در تکلم، لرزش، درد معده، اغتشاش شعور و حملات تشنجی، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری

(جاده مخصوص کرج، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵

دورنگار: ۴۴۵۰۴۷۸۷

تلفن شکایات: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

۳۰۰۰۴۹۲۹

شماره ارسال پیام کوتاه (SMS):

PMQC@abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری:

info@abidipharma.com

پست الکترونیک:

www.abidipharma.com

سایت اینترنتی:

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۷/۲۸

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۲۵

