Brilavus® 90

بریلاووس® ۹۰

Ticagrelor

تیکاگرلور

بریلاووس® ۹۰ به صورت قرص‌های خوراکی، روکشدار، گرد، محدب و به رنگ زرد می‌باشد. هر قرص حاوی ۹۰ میلی‌گرم تیکاگرلور است و در جعبه‌های ۵۶ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

بریلاووس® ۹۰ بـرای کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، انفارکتوس میـوکارد و سکتـه مغزی در بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونر یا سابقه انفارکتوس میوکارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هـرگـونـه حسـاسیـت ۲- بارداری یا شیردهی ۳- استفاده از سایر داروها ۴- ابتـلا بـه بیماری‌های دیگـر

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت (شامل آنافیلاکسی، آنژیوادم) به تیکاگرلور یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- خونریزی پاتولوژیک فعال مانند زخم معده یا خونریزی داخل جمجمه

۳- سابقه خونریزی داخل جمجمه

۴- نارسایی شدید کبدی

۵- مصرف همزمان با داروهای کتوکونازول، کلاریترومایسین، نفازودون، ریتوناویر و آتازاناویر

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری ـ مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک معالج و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی ـ در مورد ترشح این دارو در شیر مادر اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد. به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزاد شیرخوار، باید در مورد قطع مصرف دارو یا ادامه درمان، توسط پزشک تصمیم‌گیری شود.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

۲- مصرف این دارو در افراد سالخورده به لحاظ ایمنی و اثربخشی، متفاوت با سایر گروه‌های سنی نمی‌باشد.

۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

خونریزی ـ مصرف این دارو در بیماران با خونریزی پاتولوژیک فعال شامل سابقه خونریزی داخل جمجمه ممنوع است. همچنین در بیماران با اختلالات پلاکتی، اختلالات خونریزی و یا افزایش ریسک خونریزی، باید با احتیاط مصرف شود.

جراحی فوریت‌دار بای‌پس عروق قلب ـ از مصرف دارو در این شرایط خودداری شود. در صورت امکان، ۵ روز قبل از هرگونه جراحی، مصرف دارو باید قطع گردد (به جز بیمارانی که با استنت قلبی بوده و دوره درمان ضد پلاکتی دوگانه آنها کامل نشده باشد). در برخی شرایط خاص بیماری و به منظور تسریع در مصرف مجدد دارو، با پزشک متخصص قلب و عروق مشورت شود. در صورت نیاز به جراحی فوریت‌دار بای‌پس عروق قلب، قطع مصرف دارو حداقل ۲۴ ساعت قبل از جراحی توصیه می‌شود.

تنگی نفس، آسم، اختلال انسداد ریوی مزمن، سایر بیماری‌های تنفسی ـ معمولاً تنگی نفس اغلب خفیف تا متوسط و گذرا در بیماران مصرف‌کننده این دارو مشاهده می‌شود. در بیماران با تنگی نفس جدید، طولانی‌مدت یا وخیم و به منظور رد بیماری زمینه‌ای، ارزیابی باید انجام گیرد. در تنگی نفس وابسته به این دارو، درمان خاص یا قطع مصرف دارو نیاز نیست. اگرچه، مصرف دارو در بیمارانی که قادر به تحمل آن نمی‌باشند، باید قطع گردد.

اسید اوریک بالا یا آرتریت نقرسی ـ مصرف این دارو در بیماران با سابقه اسید اوریک بالا یا آرتریت نقرسی، باید با احتیاط انجام گیرد. این دارو ممکن است سبب افزایش اسید اوریک خون شود.

بیماری‌های قلبی عروقی ـ مصرف این دارو در بیماران با ریسک بالای برادی‌کاردی و یا مصرف سایر داروهای القاکننده برادی‌کاردی باید با احتیاط صورت گیرد.

اختلال عملکرد کلیوی ـ مصرف دارو در این بیماران باید با احتیاط صورت گیرد. پایش عملکرد کلیوی به علت احتمال افزایش مقدارکراتینین طی درمان توصیه می‌شود.

اختلال عملکرد کبدی ـ مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی ممنوع است.

۴- پایش بیمار ـ در طی درمان، پایش دوره‌ای علایم خونریزی، هموگلوبین و هماتوکریت، آزمایش عملکرد پلاکتی، عملکرد کلیوی، تعیین مقدار اسید اوریک در بیماران نقرسی یا با ریسک افزایش اسید اوریک خون و نشانه‌های تنگی نفس باید انجام شود.

موارد احتیاط:

۱- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان)، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید. قطع مصرف دارو ممکن است به مدت ۵ روز قبل از عمل جراحی ضروری باشد.

۲- این دارو ممکن است به راحتی باعث خونریزی شود که می‌تواند شدید یا تهدید کننده زندگی باشد. لذا از انجام فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به خونریزی و یا جراحت شوند، خودداری نمایید.

۳- در صورت خونریزی بدون توقف، با پزشک یا مراکز فوریت‌دار پزشکی تماس بگیرید. خونریزی ممکن است داخل بدن مانند معده یا روده باشد. در صورت مشاهده مدفوع سیاه‌رنگ یا خونی، ادرار قرمز یا صورتی، سرفه همراه با خون یا استفراغ مواد مشابه با دانه‌های قهوه، سریعاً با پزشک تماس بگیرید.

۴- این دارو معمولاً به هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلات مشکلی ایجاد نمی‌کند. در صورت احساس گیجی و اختلال سطح هوشیاری، در هنگام رانندگی و کار با ماشین آلات احتیاط نمایید.

۵- از قطع مصرف ناگهانی این دارو حتی با وجود علایم خونریزی، قبل از مشورت با پزشک خودداری نمایید. قطع مصرف ناگهانی این دارو ممکن است ریسک حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش دهد.

تداخل‌های دارویی:

در صورتی که اخیراً از داروهای دیگر استفاده نموده و یا در حال مصرف آن می‌باشید، بخصوص موارد زیر را با پزشک خود مشورت نمایید:

- ریفامپیسین، مصـرف بیـش از ۴۰ میلی‌گرم در روز سیمواستاتین یا لوواستاتین، فنی‌توئین، کاربامازپین و فنـوباربیتال، دیگوکسیـن، سیکلوسپورین، کینیدین و دیلتیـازم، بتابلوکرهـا و وراپامیل، مرفیـن و سایر داروهـای اپیوئیـدی، آپیکسابـان، ریواروکسابـان، آریپیپـرازول، آسپیـرین، بـوسنتان، کانابیس، کارودیـلول، دابـرافنیـب، داساتینیب، دفـرازیـروکس، ایـریتومومب، ایـروتینیب، سیلتوکسیمب، تتراهیدروکانابینول، توسیلیزومب
- مصرف همزمان داروهای زیر ممکن است ریسک خونریزی را افزایش دهد:
  - داروهای ضد انعقاد خوراکی شامل وارفارین
  - داروهـای ضـد التـهاب غیـر استروئیدی که معمـولاً بـه عنوان ضد درد مصرف می‌شوند (مانند ایبوپروفن و ناپروکسن)
  - داروهـای مهـارکننده انتخـابی بـاز جذب سـروتونیـن که بـه عنـوان ضد افسـردگی مصرف می‌شوند (مانند پاروکستین، سرترالین و سیتالوپرام)
  - سایر داروها مانند کلاریترومایسین،کتوکونازول، نفازودون، ریتوناویر و آتازاناویر، سیزاپراید، آلکالوئیدهای ارگوت
- داروهای فیبرینولیتیک (مانند استرپتوکیناز یا آلتپلاز)

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

این دارو را همیشه مطابق دستور پزشک مصرف نمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان ـ

دوز شروع، دو قرص به طور همزمان (۱۸۰ میلی‌گرم) است. این دوز معمولاً در بیمارستان تجویز می‌گردد.

پس از دوز شروع، دوز معمول که ۱۲ ساعت پس از دوز شروع است، یک قرص دو بار در روز به مدت ۱۲ ماه است، مگر آن که پزشک دستور دیگری داده باشد.

پزشک ممکن است همراه با این دارو، اسید استیل سالیسیلیک (آسپیرین) را نیز تجویز نماید. دوز معمولی این دارو ۷۵ تا ۱۵۰ میلی‌گرم در روز است که توسط پزشک تعیین می‌گردد.

جایگزین نمودن بریلاووس®۹۰ به جای کلوپیدوگرل ـ دوز شروع یا نگهدارنده بریلاووس®۹۰ ممکن است ۲۴ ساعت پس از آخرین دوز کلوپیدوگرل، به صورت یک قرص دو بار در روز تجویز گردد.

در بیمارانی که در فاز حاد سندرم کرونر حاد بوده و بخصوص به کلوپیدوگرل پاسخگو نمی‌باشند، دوز شروع بریلاووس®۹۰ ممکن است ۱۸۰ میلی‌گرم و دوز نگهدارنده آن ۹۰ میلی‌گرم دو بار در روز تجویز گردد، بدون آن که مصرف قبلی کلوپیدوگرل در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی، مصرف سایر داروهای ضد پلاکت (مانند مهارکننده‌های گلیکوپروتئین IIb/IIIa) نیز مورد توجه قرار گیرد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- دارو را در یک زمان مشخص طی روز مصرف نمایید (یک قرص صبح و یک قرص عصر).

۲- این دارو را می‌توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.

۳- در صورت اشکال در بلع قرص، می‌توان آن را خرد کرده و همراه با آب به صورت زیر مصرف نمایید:

قرص را کاملاً پودر نموده، آن را به نصف لیوان آب اضافه کرده، بهم زده و فوراً میل نمایید. به منظور اطمینان از دریافت کامل دارو، لیوان خالی را با نصف حجم آب شستشو داده و میل نمایید.

تجویز این دارو در بیمارستان، ممکن است به صورت مخلوط با مقداری آب و از طریق گاواژ صورت گیرد.

۴- آب گریپ‌فروت ممکن است اثر ضد پلاکتی این دارو را افزایش دهد.

۵- از قطع مصرف ناگهانی این دارو بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید. این دارو را بر اساس یک برنامه مشخص و مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید. قطع مصرف ناگهانی ممکن است شانس ابتلا به یک حمله قلبی دیگر، سکته مغزی یا مرگ مرتبط با قلب یا عروق خونی را افزایش دهد.

۶- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید. دوز بعدی را بر اساس برنامه عادی خود مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر، سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

• شایع‌ترین عارضه جانبی بریلاووس®۹۰، خونریزی است که ممکن است در هر بخشی از بدن صورت گیرد. برخی خونریزی‌های شایع شامل کبودی و خونریزی از بینی است. خونریزی شدید غیرشایع بوده و می‌تواند تهدیدکننده زندگی باشد.

• خونریزی در مغز یا داخل جمجمه غیرشایع بوده و می‌تواند سبب علایم سکته مغزی شامل موارد زیر شود:

- بی‌حسی یا ضعف ناگهانی بازو، ساق پا یا صورت، بخصوص اگر فقط در یک طرف بدن باشد
- اختلال سطح هوشیاری به طور ناگهانی، اشکال در تکلم و شناختن دیگران
- اشکال ناگهانی در راه رفتن یا از دست دادن تعادل یا توازن
- احساس ناگهانی گیجی یا سردرد شدید ناگهانی با علت ناشناخته

• علایم خونریزی شامل موارد زیر می‌گردد:

- خونریزی شدید یا غیرقابل کنترل
- خونریزی غیرمنتظره یا خونریزی طولانی‌مدت، ادرار صورتی، قرمز یا قهوه‌ای
- استفراغ خون یا مواد مشابه با "دانه‌های قهوه"
- مدفوع قرمز یا سیاه‌رنگ (شبیه قیر)
- سرفه یا استفراغ لخته خون

• سنکوپ

- از دست دادن موقت هوشیاری ناشی از افت ناگهانی جریان خون به مغز (شایع)

• علایم یک مشکل لخته خون به نام پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک:

- تب و نقاط ارغوانی (به نام پورپورا) بر روی پوست یا در دهان، همراه با یا بدون زردی پوست یا چشم‌ها (یرقان)، خستگی یا اختلال سطح هوشیاری شدید

• احساس تنگی نفس (بسیار شایع) ـ این علامت می‌تواند ناشی از بیماری قلبی یا علت دیگر و یا عارضه جانبی این دارو باشد. تنگی نفس ناشی از این دارو، معمولاً خفیف بوده و به صورت نیاز ناگهانی و غیرقابل وصف به هوا در هنگام استراحت بروز می‌نماید و ممکن است طی چند هفته اول درمان تظاهر نموده و در بسیاری از افراد ناپدید شود. در صورت بدتر شدن احساس تنگی نفس یا تداوم آن، با پزشک خود مشورت نمایید.

• عوارض بسیار شایع: افزایش مقدار اسید اوریک در خون، خونریزی ناشی از اختلالا

• عوارض شایع: کبودی، سردرد، احساس گیجی یا منگی یا تاری دید (علایم کاهش فشار خون)، اسهال یا سوء هاضمه، احساس ناخوشی (تهوع)، یبوست، بثورات جلدی، خارش، درد شدید یا ورم مفاصل (علایم نقرس)، خونریزی از بینی، خونریزی غیر عادی پس از جراحی، بریدگی و زخم‌ها، خونریزی از زخم معده، خونریزی لثه‌ها

• عوارض غیرشایع: واکنش آلرژیک (بثورات جلدی، خارش یا ورم صورت، لب‌ها و زبان)، اختلال سطح هوشیاری، مشکلات بینایی ناشی از خونریزی در چشم، خونریزی بیشتر و یا به دفعات در قاعدگی، خونریزی در مفاصل و عضلات که سبب تورم دردناک می‌شود، خونریزی در گوش، خونریزی داخلی که ممکن است سبب گیجی یا منگی شود.

توجه ـ در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از رطوبت نگهداری کنید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶- ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ تدوین : ۹۹/۰۳/۲۴

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۲۵

210mm×150 mm