

Corizan[®]

Vitamin C

Acetaminophen/Ascorbic Acid/Caffeine/Chlorpheniramine Maleate

کوریزان[®]

ویتامین سی

استامینوفن / اسید آسکوربیک / کافئین / کلرفنیرامین مالئات

کوریزان[®] ویتامین سی به صورت کیسول‌های سخت ژلاتینی خوراکی به رنگ زرد (سبز و سفید بدن) می‌باشد. هر کیسول حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم استامینوفن، ۱۵۰ میلی‌گرم اسید آسکوربیک، ۲۵ میلی‌گرم کافئین و ۲/۵ میلی‌گرم کلرفنیرامین مالئات است و در جعبه ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

این دارو در موارد زیر بکار می‌رود:

- سندرم خفیف تا متوسط درد (شامل سردرد، گلودرد، دردهای عصبی)
- تب همراه با آنفلوآنزا و سایر بیماری‌های عفونی - التهابی دستگاه تنفسی فوقانی

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- ابتلاء به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- سابقه حساسیت به استامینوفن، اسید آسکوربیک، کافئین، کلرفنیرامین مالئات و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- بیماری حاد کلیوی - نارسایی عملکرد کبدی - اختلالات ریتم قلب، نارسایی قلبی، انسداد سینوسی دهلیزی، انسداد دهلیزی بطنی - فشار خون بالا
- هیپر بیلی روبینمی - اترواسکلروز - اعتیاد به الکل - کودکان کمتر از ۱۲ سال - بارداری - شیردهی - نوزادان تازه متولد شده یا نارس
- آب سیاه چشم با زاویه باریک - بزرگ شدن علامتی پروستات - انسداد گردن مثانه - درمان علائم دستگاه تنفسی تحتانی شامل آسم و حملات آسمی
- مصرف همزمان با سایر داروهای حاوی استامینوفن

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

شیردهی - این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. مصرف آن در دوران شیردهی ممنوع است.

هشدارها:

- ۱- مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال ممنوع است.
- ۲- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند. اغتشاش شعور، اشکال در دفع ادرار یا ادرار کردن دردناک، گیجی، خواب آلودگی، احساس ستکوپ، خشکی دهان، بیینی و گلو، کابوس‌های شبانه یا هیجان غیرعادی، عصبانیت، بیقراری یا تحریک‌پذیری ممکن است بیشتر در افراد مسن بروز نماید.
- ۳- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
 - سنگ ساز بودن کلیه - اسید آسکوربیک با اسیدی کردن ادرار، ممکن است باعث رسوب سنگ‌هایی از جنس سیستین، اورات و اگزالات گردد.
 - اختلال عملکرد کبد/کلیه - مصرف دارو باید با احتیاط انجام گیرد.
 - سندرم ژلبرت (بالا بودن مادرزادی بیلی روبین خون) - این دارو ممکن است باعث وخامت بیماری گردد.
 - تالاسمی، هموکروماتوز، کم خونی سیدروپلاستیک - این دارو ممکن است باعث وخامت این بیماری‌ها گردد.
 - اعتیاد به الکل - استامینوفن احتمال آسیب کبدی را افزایش می‌دهد.
 - انسداد معده‌ای روده‌ای، زخم‌های دوازدهه، کولون تحریک‌پذیر - این دارو ممکن است باعث تشدید این بیماری‌ها گردد.
 - بزرگ شدن پروستات، انسداد دستگاه ادراری یا اشکال در دفع ادرار - کلرفنیرامین مالئات ممکن است باعث وخامت مشکلات ادراری گردد.
 - گلوکوم - کلرفنیرامین مالئات ممکن است با افزایش مختصر در فشار داخلی چشم باعث تشدید این بیماری گردد.
 - آسم، آلرژی‌ها، پولیپ‌های بینی یا سابقه آن و حملات آسمی - اگر چه مصرف کلرفنیرامین مالئات باعث باز شدن مجاری نایزهای می‌گردد، اما به دلیل سایر اثرات ممکن است باعث غلیظ شدن ترشحات شود به طوری که در هنگام یک حمله آسمی، خروج آنها با سرفه مشکل می‌گردد.
 - بیماری‌های قلبی عروقی - کافئین اگر به مقدار زیاد مصرف شود، ممکن است باعث افزایش تعداد ضربان قلب، بازدهی بطن چپ و استروک گردد.
 - اختلالات تشنجی - کافئین یک محرک سیستم عصبی مرکزی است و با مصرف مقادیر زیاد آن مواردی از تشنج گزارش شده است.
 - اختلالات عملکرد تیروئید - مصرف این دارو در بیماران مبتلا به اختلالات عملکرد تیروئید باید با احتیاط صورت گیرد.
 - کمبود آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز - مصرف این دارو در بیماران مبتلا به کمبود آنزیم گلوکز ۶ - فسفات دهیدروژناز باید با احتیاط صورت گیرد (به دلیل حضور استامینوفن).

موارد احتیاط:

- ۱- در صورت عدم بهبود علائم، وخیم شدن آن، بروز علائم جدید و تب بالا، پزشک خود را مطلع نمایید.
- ۲- با مصرف مقادیر زیاد و یا طولانی مدت این دارو ممکن است سردرد بروز نماید که برای درمان آن نباید از مقادیر بالای داروهای مسکن استفاده نمود.
- ۳- قبل از انجام هرگونه آزمون پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می‌گیرد، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید، زیرا که نتایج آزمون تحت تاثیر مصرف این دارو قرار می‌گیرد.
- ۴- کلرفنیرامین مالئات به اثرات الکل و سایر تضعیف کننده‌های سیستم عصبی مرکزی می‌افزاید. برخی از این داروها شامل مسکن‌ها، آرام بخش‌ها یا داروهای خواب آور؛ داروهای ضد درد با نسخه یا مخدرها؛ باریتورات‌ها؛ داروهای ضد تشنج؛ شل‌کننده‌های عضلانی؛ داروهای بیپوشی شامل بی‌حس‌کننده‌های دندان می‌گردند. قبل از مصرف هر یک از این داروها با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۵- این دارو ممکن است در برخی افراد باعث خواب‌آلودگی، گیجی و کم شدن هوشیاری شود، لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

- ۶- اثرات ناشی از مصرف مقادیر بسیار زیاد آسپیرین مانند وزوز گوش، ممکن است در مصرف همزمان با کرفنیرامین مائلتات مخفی گردد.
- ۷- این دارو ممکن است باعث خشکی دهان، بینی و گلو گردد. برای تسکین موقت خشکی دهان می‌توان از آب نبات یا آدامس بدون قند، ذوب تکه‌های یخ در دهان و یا جانشین‌های بزاق استفاده نمود. در صورت تداوم خشکی دهان به مدت بیشتر از ۲ هفته، پزشک یا دندانپزشک خود را مطلع نماید. تداوم خشکی دهان ممکن است منجر به افزایش خطر بیماری‌های دندان و لته و عفونت‌های قارچی گردد.
- ۸- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک خود را مطلع سازید.

باربیتوراتها (مانند فنوباریتال)، هیدانتوتینها (مانند فنی‌توتین) - مصرف توأم مقادیر زیاد و یا طولانی مدت باربیتوراتها و یا هیدانتوتینها با استامینوفن، ممکن است احتمال سمیت کبدی ناشی از استامینوفن را افزایش دهد. اثرات درمانی استامینوفن در مصرف توأم با باربیتوراتها و یا هیدانتوتینها ممکن است کاهش یابد. علاوه بر این، فنی‌توتین نیمه عمر کافئین را کاهش داده و دفع آن از بدن را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان داروها منجر به کاهش غلظت سرمی کافئین می‌گردد.

زغال فعال شده - زغال فعال شده اگر بلافاصله پس از مصرف مقادیر بسیار زیاد استامینوفن استفاده شود، می‌تواند جذب گوارشی آن را کاهش دهد.

الکل - مصرف طولانی مدت الکل ممکن است خطر آسیب کبدی ناشی از استامینوفن را افزایش دهد. علاوه بر این اثرات تضعیف سیستم عصبی مرکزی کرفنیرامین مائلتات ممکن است افزایش یابد.

ایزوتیرازید - با مصرف همزمان داروها، خطر سمیت کبدی ممکن است افزایش یابد. مصرف استامینوفن در بیماران تحت درمان با ایزوتیرازید باید با احتیاط انجام گیرد.

سولفین پیرازون - با مصرف توأم سولفین پیرازون و استامینوفن، احتمال سمیت کبدی ناشی از استامینوفن ممکن است افزایش یابد. اثرات درمانی استامینوفن در مصرف توأم با سولفین پیرازون ممکن است کاهش یابد.

لاموتریزین - غلظت‌های سرمی لاموتریزین ممکن است کاهش یابد که منجر به کاهش اثرات درمانی آن می‌گردد.

سایمتیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، دی‌سولفیرام، فلوروکینولون‌ها - این داروها ممکن است باعث اختلال در متابولیسم کبدی، کاهش دفع و افزایش نیمه عمر کافئین در بدن گردند. در صورت بروز عوارض شدید سیستم عصبی مرکزی یا قلبی عروقی، از مصرف کافئین خودداری نمایید.

مگزلیتین - با مصرف توأم داروها، دفع کافئین به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

سیگار کشیدن - سیگار کشیدن متابولیسم کبدی و دفع کافئین را افزایش می‌دهد.

آمفتامین‌ها - اثر تسکینی کرفنیرامین مائلتات ممکن است کاهش یابد. پیش درمان ضروری است.

داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز (MAO) مانند ایزوکربوکسازید، فنلزین، پروکاربازین، سلجیلین و ترانیل سیهپرومین - داروهای مهار کننده منوآمین اکسیداز ممکن است اثرات آنتی‌کولینرژیک و تسکین دهنده کرفنیرامین مائلتات را طولانی و تشدید نمایند.

هیپالورونیداز - کرفنیرامین مائلتات ممکن است اثر درمانی هیپالورونیداز را کاهش دهد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

بزرگسالان و افراد بالاتر از ۱۲ سال:

دو کپسول سه بار در روز مصرف شود.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور پزشک یا راهنمای دارو خودداری نمایید.
- ۲- این دارو را می‌توان با معده خالی یا همراه با غذا میل نمود. در صورت بروز تحریکات گوارشی، آن را همراه با غذا مصرف نمایید.
- ۳- این دارو را همراه با یک لیوان پر از آب مصرف نمایید.
- ۴- کپسول را به طور کامل بلعیده، از جویدن و باز کردن پوکه کپسول خودداری نمایید.
- ۵- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، دوز فراموش شده را دیگر مصرف ننموده و سپس برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو بندرت عوارض جانبی جدی بروز می‌نماید. احتمال بروز عوارض جانبی در شرایطی است که دارو در مقادیر بسیار زیاد و به مدت طولانی مصرف شود.

در صورت بروز عوارض زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

اسهال، افزایش تعریق، بی‌اشتهایی، تهوع یا استفراغ، انقباضات یا درد معده، ورم یا حساسیت بخش فوقانی شکم یا ناحیه معده، بی‌ثورات جلدی، کهیر و یا خارش، بی‌ثباتی یا عدم مهارت در انجام کارها، حملات تشنجی، خواب‌آلودگی شدید، خشکی شدید دهان، بینی یا گلو، برافروختگی یا قرمزی صورت، توهمات، بیقراری شدید، تنگی نفس یا اشکال در تنفس، ضریان سریع، نامنظم یا کند قلب، گلودرد و تب غیرعادی، گیجی، سردرد، خستگی یا ضعف غیرعادی، زردی چشم‌ها یا پوست، کاهش تعداد پلاکت‌ها و گلبول‌های سفید خون (ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، آگرانولوسیتوز) یا کمبود همه سلول‌های خون (پان‌سیتوپنی)، واکنش‌های حساسیتی پوست، اشکال در دفع ادرار، آب سیاه چشم با زاویه بسته و افت شدید فشار خون.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
سایت اینترنتی:
www.abidpharma.com
VOCC@abidpharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری:

تاریخ تدوین: ۹۹۱۰/۱/۳۶

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

تاسیس ۱۳۳۵