



سوسپانسیون کوریزان® کودکان درد و تب به صورت سوسپانسیون قرمز رنگ، با طعم و بوی میوه، در بطری‌های ۱۲۰ میلی‌لیتری که هر ۵ میلی‌لیتر آن حاوی ۱۲۰ میلی‌گرم استامینوفن است، توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود

موارد مصرف:

- تب ناشی از واکسیناسیون
- دردهای ناشی از دندان درآوردن کودکان
- گوش درد
- سردرد

سماخوردگی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پردازش یا داروساز برسانید:

- ۱- وجود هرگونه حساسیت
- ۲- بارداری یا شیردهی
- ۳- استفاده از سایر داروها
- ۴- اختلال حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

موارد منع مصرف:

- ۱- حساسیت به استامینوفن و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- مصرف هم‌مان با سایر داروهای حاوی استامینوفن

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پردازش مخصوص و با احتیاط انجام گیرد.
شیردهی - این دارو در مقادیر کم در شیر مادر ترشح می‌شود. تاکنون عوارض ناخواسته در نوزادان شیرخوار گزارش نشده است. بنابراین مصرف آن طی دوران شیردهی تحت نظر پردازش معالج مجاز است.

هشدارها:

۱- مصرف این دارو در کودکان عوارض جانبی متفاوت را با گروه سنی بزرگسالان نشان نداده است.
۲- بر اساس مطالعات انجام شده، معرف این دارو در افراد سالخورده مشکلات واپسنه به سن که مفید بودن آن را محدود نماید، نشان نداده است.
۳- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پردازش خود را مطلع نمایید:
سوء مصرف الكل، بیماری شدید کلیه، هپاتیت یا سایر بیماریهای کبدی - احتمال بروز عوارض ناخواسته ممکن است افزایش یابد.

موارد احتیاط:

- ۱- موارد زیر را با پردازش کنند که در میان بگذرد:
 - ۱ در صورت مصرف این دارو برای تسکین درد شامل درد آرتیتی، درد به مدت بیشتر از ۱۰ روز در کودکان ادامه یافته و با آن که شدت باید، عالیم جدید ایجاد شود یا ناحیه دردناک قرمز یا متورم گردد.
 - ۲ در صورت مصرف این دارو برای کاهش تب، تب به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد یا بازگشت نماید، شدت یافته، عالیم جدید ایجاد شود و قرمزی یا ورم نمایان گردد.
 - ۳ در صورت مصرف این دارو برای گلودرد، گلودرد سیار دردناک است و به مدت بیشتر از ۲ روز ادامه یابد، یا با تب، سردرد، بتورات جلدی، تهوع و استفراغ همراه گردد.
 - ۴- مصرف هم‌مان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن، ممکن است منجر به سممومیت گردد.
 - ۵- مصرف هم‌مان برخی داروهای این دارو با استامینوفن ممکن است احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد. میزان خطر به مقدار مصرف روزانه هر یک از داروها و مدت زمان دنبال نمایید.
 - ۶- استامینوفن ممکن است با نتایج برخی آزمون‌های پردازشی تداخل نماید، بنابراین لازم است قبل از انجام هر گونه آزمون، پردازش را از مصرف استامینوفن در طی ۳ یا ۴ روز گذشته مطلع نمایید.
 - ۷- استامینوفن ممکن است باعث نتایج کاذب در برخی آزمون‌های قند خون گردد. در صورت مشاهده هر گونه تغییر در نتایج آزمون بخصوص در صورت عدم کنترل مناسب بیماری قند خود، با پردازش مشورت نمایید.
 - ۸- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، بیمار باید سریعاً به پردازش یا مراکز درمانی منتقل شود، حتی اگر علایمی از سممومیت مشاهده نگردد. عالیم سممومیت شدید ممکن است تا چند روز پس از مصرف بیش از حد دارو ظاهر نگردد، اگرچه درمان به منظور جلوگیری از آسیب کبدی یا مرگ باید هر چه سریع تر شروع شود. شروع درمان ۲۴ ساعت پس از مصرف بیش از حد دارو ممکن است مؤثر نباشد.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، جتنیجه از داروهای زیر استفاده نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
صرف طولانی مدت الکل، داروهای القاء کننده آنزیم کبدی و سایر داروها با سمیت کبدی - خطر سمیت کبدی با مصرف مقادیر سمی و یا طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفن ممکن است در افراد الکلی و یا بیمارانی که از سایر داروها با سمیت کبدی استفاده نمایند، افزایش یابد.

صرف طولانی مدت باریستورات‌ها (بجز یوتالبیتال) یا بریمیدون باعث کاهش اثرات درمانی استامینوفن می‌گردد.
داروهای ضد التهاب کومارینی یا مشتقات اینداناپون - مصرف همزمان و طولانی مدت مقادیر بالای استامینوفن ممکن است اثر ضد انعقادی را افزایش دهد.

داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، آسپیرین و سایر سالیسیلات‌ها - مصرف همزمان و طولانی مدت استامینوفن با یک سالیسیلات و سایر داروهای ضد التهاب

غیراستروئیدی دیگر ممکن است احتمال اثرات ناخواسته کلیوی را افزایش دهد.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو در هر نوبت مصرف به فواصل ۴ تا ۶ ساعت به طور کلی به صورت زیر است:

وزن	وزن	سن
۵-۷/۵ میلی لیتر	۸-۱۲ کیلوگرم	۱-۲ سال
۷/۵-۱۰ میلی لیتر	۱۲-۱۶ کیلوگرم	۲-۴ سال
۱۰-۱۲/۵ میلی لیتر	۱۶-۲۰ کیلوگرم	۴-۶ سال
۱۲/۵-۱۵ میلی لیتر	۲۰-۲۵ کیلوگرم	۶-۸ سال

درخصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را فقط بر اساس دستور مصرف نمایید، مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو ممکن است باعث آسیب کبد و کلیه شود.

۲- مصرف دارو در کودکان تا سن ۱۲ سال، نباید بیشتر از ۵ بار در روز انجام گیرد.

۳- قبل از هر بار مصرف، بطیری را خوب تکان دهید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود. در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نادر - زرد شدن چشم‌ها یا پوس؛ مدفع خونی یا سیاهرنگ، قیر مانند؛ ادرار خونی یا کدر؛ بُب، همراه یا بدون لرز (قبل از درمان وجود ندارد)؛ درد شدید و یا سخت در پخش تحتانی پشت و یا پهلو؛ نقاط قرمز سوزنی روی پوست؛ بثورات جلدی، کهیب، یا خارش؛ زخم، یا نقاط سفید رنگ روی لبها یا در دهان؛ گلو درد (قبل از درمان وجود ندارد)؛ کاهش ناگهانی در مقدار ادرار؛ خونریزی یا کبوتری غیر عادی و خستگی یا ضعف غیر عادی.

توجه - در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علایمی نظیر اسهال؛ افزایش تعریق؛ کاهش اشتتها؛ تهوع یا استفراغ؛ انقباضات یا درد معده؛ ورم، درد یا حساسی شدن ناحیه بالای شکم یا معده، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مرکز درمانی منتقل گردد.


شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.

- دارو از بچ زدگی محافظت گردد.



آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کلیومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲ داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۶۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹

دورنگار: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۷۸۷ شماره ارسال پیام کوتاه (SMS): ۳۰۰۰۴۹۲۹

ایمیل جهت ارتباط مشتری: PMQC@abidipharma.com

پست الکترونیک: info@abidipharma.com

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

تاریخ ویرایش: ۹۷/۰۲/۱۰

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عَبِيدِي

۱۳۷۵