

ادوالژین®

ER 600

Ibuprofen Extended-Release

ای آر ۶۰۰

ایبوپرون پیوسته رهش

ادوالژین® ای آر ۶۰۰ به صورت قرص‌های پیوسته رهش دو لایه، روکشدار، کشیده، محب و به رنگ سفید می‌باشد. هر قرص حاوی ۶۰۰ میلی‌گرم ایبوپرون است که ۲۰۰ میلی‌گرم آن به صورت سریع بازسونده و ۴۰۰ میلی‌گرم آن به صورت پیوسته رهش است و در جعبه‌های ۲۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

- ادوالژین® ای آر ۶۰۰ چهت تسکین موقت دردهای زیر که بیشتر از ۶ ساعت ادامه یابند، مورد استفاده قرار می‌گیرد:
 - بدن درد
 - درد پشت
 - درد گردن و شانه
 - درد عضلات
 - پیچ خودگی‌ها و کنش عضله
 - استتوارتریت
 - آرتربیت، بیماری‌های مفاصل و روماتیسمی
 - درد قاعده‌گی
 - دندان درد
 - درد سینوس
 - سرماخوردگی و آنفلوانزا

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری‌های فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز بررسی‌نید:

- ۱- استفاده از سایر داروها
- ۲- وجود هرگونه حساسیت
- ۳- بارداری یا شیردهی

موارد منع مصرف:

- ۱- ساقه حساسیت به ایبوپرون یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
- ۲- مصرف هم‌زمان با آسپرین و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- ۳- درمان درد پیش از جراحی یا پس عرق قلب
- ۴- در بیماری‌ای که آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی باعث بروز علایم آسم، آبریزش بینی، کهیز، پولیپ‌های بینی، آنتیوادم، انقباض برونشی‌ها و سایر علایم آرژیک یا واکنش‌های آنافیلاتیک می‌گردد
- ۵- بارداری بخصوص ماهه آخر آن
- ۶- خونریزی و زخم معده فعال یا ساقه آن
- ۷- دیگرسیون شدید ناشی از استفراغ، اسهال و با عدم مصرف کافی مایعات
- ۸- خونریزی فعال عروق مغزی
- ۹- نارسایی شدید قلبی، کبدی و کلیوی
- ۱۰- مصرف در کودکان کمتر از ۱۲ سال

صرف در بارداری و شیردهی:

بارداری- این‌تی مصرف این دارو در دوران بارداری بیت نشده است و مصرف آن توصیه نمی‌گردد.

شیردهی- این دارو در شیر مادر ترشح می‌گردد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با نظر پزشک انجام گیرد.

هشدارها:

- ۱- افاده مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشد. برخی عوارض جانی دارو شامل اغتشاش شعره، ورم صورت، یا ساق‌ها و کاهش تاگهایی مقدار ادرار ممکن است در افاده ساخنگرد بیشتر بروز نماید.
- ۲- حضور بیماری‌های دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلاء به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
 - مشکلات خونریزی، کولیت، بیمسایری کرون، دورنیکوتیکوت، زخم معده با سایر بیماری‌های معده و روده، دیابت ملتویون، هموفوئید، هیاتیت با سایر بیماری‌های کبد، بیماری کلیه یا ساقه آن، سوزش یا خونریزی اخیر مقدار، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، استعمال دخانیات- اختلال بروز عوارض جانی ممکن است افزایش یابد.
 - کم خونی، آسم، صرع، اختیاب ماعت، بیماری قلب، فشار خون بالا- سنگ‌های کلیه یا ساقه آن، احتمال بروز عوارض جانی ممکن است افزایش یابد.
 - درد روماتیسمی یا میالزی، پورتیفری، آرتربیت تهوارل- صرف ایبوپرون ممکن است باعث و خاتمه این بیماری‌ها گردد.
 - زخم‌ها با نقاط سفید رنگ در دهان- وجود این علایم ممکن است نشانه‌ای از عوارض جانی جدی ناشی از مصرف ایبوپرون باشد.

موارد احتیاط:

- ۱- اگر این دارو را به مدت طولانی مصرف می‌نمایید، به منظور برسی اثری‌خواسته درمان، در فواصل معین به پزشک مراجعت کنید. پزشک ممکن است انجام برخی آزمایشات را چیز ناشناسی مصرف می‌نماید. این آزمایشات بسیار مهم است، زیرا که عوارض جانی جدی شامل رژم‌ها، خونریزی یا بیماری‌های خونی می‌تواند بدون هیچ‌گونه هشدار رخ دهد.
- ۲- مصرف هم‌زمان این دارو با نوشاهای حاوی الکل ممکن است باعث مشکلات معدده‌ای شود.
- ۳- مصرف هم‌زمان این دارو با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ممکن است احتمال بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. همچنین مصرف هم‌زمان استامینوئن، آسپرین یا سایر ساسیپیات‌ها و کتونولاک با این دارو، ممکن است شناسی بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. این ریسک به مقدار مصرف روزانه‌های این دارو و مدت مصرف هم‌زمان داروها مستگی دارد.
- ۴- درمان با این دارو می‌تواند باعث بروز عوارض جانی جدی شود. گاهی اوقات این عوارض می‌تواند بدون هرگونه علامتی باشد. اگر چه اغلب، علایم هشدار دهنده‌ای مانند ورم صورت، اگکشن، یا ساق‌ها، درد شدید معده، مذکوع سیاه-رنگ و قیزی شکل، استفراغ خون یا مواد مشابه یا دانه‌های قیمه، افزایش غیرعادی وزن، بشورات چلیدی، درد قفسه سینه، احساس فشار در قفسه سینه، ضربان سریع یا نامنظم قلب، گرگفتگی غیرعادی یا گرمای بروز نماید. در چنین مواردی، سریعاً مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس نگیرید.
- ۵- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.
- ۶- این دارو ممکن است باعث اغتشاش شعره، خواب‌الوگی، گیجی، منگی، کاهش هوشیاری، تاری دید یا سایر مشکلات بینایی در برخی افراد شود. لذا توصیه می‌گردد افراد ممکن است باعث حساسیت به نور خورشید است. تماش با نور خورشید حتی کوتاه مدت آن، ممکن است باعث بروز افتاب سوختگی شود؛ تاول پوسیت، بشورات پوسی، قرمزی، خارش سا نغیر رنگ پوسی و سا تغییرات بینایی گردد. در صورت مشاهده واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشور نمایید.
- ۷- مصرف این دارو در برخی افراد ممکن است باعث حساسیت بیشتر به نور خورشید شود. تماش با نور خورشید حتی کوتاه مدت آن، ممکن است باعث بروز افتاب سوختگی شود؛ تاول پوسیت، بشورات پوسی، قرمزی، خارش سا نغیر رنگ پوسی و سا تغییرات بینایی گردد. در صورت مشاهده واکنش شدید به نور خورشید، با پزشک خود مشور نمایید.
- ۸- در صورت مشاهده لرز، تب، درد یا کوفتگی عضلات و سایر علایم مشابه آنفلوانزا بخصوص اگر با بشورات پوسی همراه گردد، سریعاً با پزشک خود مشور نمایید. در موارد نادر، این اثرات ممکن است اولین علایم یک واکنش جدی به دارو باشد.

۹- مصرف این دارو ممکن است باعث یک واکنش آرژیک جدی به نام آنافلکاسی گردد. اگرچه این واکنش نادر است، اما ممکن است در بیمارانی بروز نماید که به آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند. آنفلکاسی به درمان های فوریت دار پر شکی نیاز دارد. از بیشترین علایم جدی این واکنش می توان تنفس سریع یا نامنظم؛ خس کردن؛ سنکوب؛ تغییر رنگ پوست صورت؛ ضربان قلب یا نبض سیار سریع و نامنظم؛ ورم کهیر مانند پوست و ورم پلکها را نام برد.

۱۰- در صورت عدم بهبودی عالیم یا بدتر شدن آنها، مشاهده تپ بالا یا تبی که به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و قرمزی یا ورم ناحیه دردناک، با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل های دارویی: قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

الکل، کوتارکوستروندهای خوارک، کوتارکوتروین، مکمل های حاوی یاتاسم-احتمال بروز مشکلات جدی مانند خشم و خونریزی معده ممکن است افزایش یابد.

داروهای ضد انعقاد، هاربین، آسید والبروفین- شناس خونریزی ممکن است افزایش یابد.

آسپرین- در صورت مصرف هفتمان و طولانی مدت آسپرین و ابیپروفن، شناس بروز عوارض جانبی جدی افزایش می یابد.

سیکلکسوسورین، تاکرولیموس، گلیکوزیدهای بیوتاتالیس، لیتین، منتور کسات، فنی توئین- مقدار این داروها در خون و همچنین احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

پروپنیسید- مقدار ابیپروفن در خون و شناس بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

تریامن- احتمال بروز مشکلات تلیوی ممکن است افزایش یابد.

زیدووودین- احتمال بروز عوارض جانبی جدی افزایش می یابد.

انالاپریل، کاپتوپریل، ازو زتان، بتالیوک(هایاند بروپرتوالو) - مصرف توان این داروها با ابیپروفن، ممکن است باعث کاهش اثرات کاهنده فشار خون آنها گردد.

مهارکننده های انتخابی باز جذب (مانند سروتونین، ولفارکستین، ونلافاکسین)- مصرف توان این داروها ممکن است باعث افزایش اثر ضد پلاکت ابیپروفن و افزایش رسک خونریزی گوارشی گردد، ضمن آن که اثر درمانی مهارکننده های انتخابی باز جذب سروتونین نیز ممکن است کاهش یابد.

مدرها (مانند زایدیده مدرهای نگهدارنده بتاپاتن، بروز ابیپروفن، ممکن است باعث کاهش اثرات مدری و افزایش احتمال بروز نارسایی حاد کلیوی گردد).

آنتی بیوتیک های کینولوکن (مانند سیپروفلوکسازین)- رسک تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی ناشی از مصرف آنتی بیوتیک های کینولوکن ممکن است افزایش یابد.

علاوه بر این، غلظت های پالسماجی این آنتی بیوتیک های نیز افزایش می یابد. مصرف توان این داروها باید با اختیاط انجام گیرد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را بزشک تعیین می کنند، ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به قرار زیر است:

بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال و بالاتر- یک قرص هر ۱۲ ساعت یک بار در صورت نیاز است. از مصرف بیش از یک قرص در هر نوبت خودداری شود. حداکثر مقدار مصرف دارو، ۲ قرص در طی ۲۴ ساعت است.

کودکان کمتر از ۱۲ سال- مصرف و مقدار آن باید توسط پزشک تعیین گردد.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- از مصرف مقادیر با دفعات بیشتر از دسترس پزشک یا همانی دارو خودداری نمایید، مگر آن که پزشک تجویز نموده باشد.

۲- قرص را به طور کامل بلعیده از خود کردن، جویندن، نصف با حل کردن آن خودداری نمایید.

۳- دارو را همراه با یک لیوان پر از میل نمایید. جهت جلوگیری از تحریکات منجر به اشکال در بین، به مدت حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پس از مصرف دارو، در حالت خوابیده قرار نگیرید.

۴- به منظور کاهش تحریکات معدن، این دارو را می توان همراه با غذا و یا داروی ضد اسید مصرف نمود.

۵- اگر مصرف این دارو مطابق یک برنامه شخصی است و مصرف یک نوبت آن فراموش شود، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عارض جانی:

هر دارو به مواد اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

در صورت بروز عوارض زیر سرعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

عارض نادر- سنکوب: تنفس سریع یا نامنظم؛ نیض با ضربان قلب سریع و نامنظم؛ ورم کهیر مانند صورت، پلکها، دهان، لبها یا زبان؛ بف یا ورم پلکها یا اطراف چشمها؛ تنگی نفس؛ خس کردن یا احساس فشار در قفسه سینه.

برخی عوارض جانی به مرور زمان و تقطیق زدن با اتفاقات دیگر ممکن است مثل اتفاقات دیگر با ناراحتی خفیف تا متوسط شکم با معده؛ اسهال؛ گیجی؛ خواب آلودگی؛ منگی؛ مردود خدیف تا متسط؛ سوزن معده؛ سو، هاضمه، تهوع و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.

توجه- در صورت مصرف اتفاقاً بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علامی نظر نهود؛ درد ای اکست؛ اسیال؛ حرکت سریع غیر ارادی چشم؛ تاری دید؛ وزوز گوش؛ سرد؛ خونریزی گوارشی؛ سر گیجه؛ گیجی؛ خواب آلودگی؛ هیجان و عدم جهت پایی؛ کاهش هوشیاری یا کاما تشنج؛ اسیدور متابولیک؛ هیپوترمی (کاهش دمای بدن)؛ هیبریکالی (افزایش پاتاسمیم خون)؛ افزایش زمان پرتوژنومی با INR؛ نارسایی کلیوی شدید؛ آسیب کبدی؛ کاهش فشار خون؛ دپرسیون تنفسی و سیانوز؛ بیمار باشد سریعاً به پزشک یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

- دارو را در میای کمتر از ۲۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

- دارو را از طریق فاضلاب مایزلهای خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معده کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۳۴۴۵-۱۵۶-۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو:

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

VOC@abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری:

تاریخ تدوین: ۹۸/۱۲/۱۰

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی

سازنده

