

محتویات:

آهن (به صورت لیپوزومال) ... ۱۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر

مورد مصرف:

کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و جلوگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن

مقدار و نحوه مصرف:

- روزانه ۱ میلی‌لیتر یا با تجویز پزشک
- قطره آهن می‌تواند به طور مستقیم در دهان چکانده و یا در نصف لیوان آب حل شده و مصرف شود.
- برای اطمینان از برداشتن مقدار دقیق و صحیح فرآورده، از قطره چکان مدرج داخل جعبه استفاده نمایید.
- بعد از هر بار مصرف، قطره چکان را با آب بشویید.
- قبل از مصرف، فرآورده را به خوبی تکان دهید تا محتویات یکنواخت شود.
- این فرآورده صرفاً یک مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی‌باشد.

سایر ترکیبات:

سدیم متو پازیک فسفات، پلی سوربات ۸۰، ویتامین C، سوکرالوز، سدیم متابی سولفیت، عصاره رزماری، زانتان گام، طعم دهنده، آب

عوارض جانبی:

از عوارض عمده آهن می‌توان به عوارض گوارشی اشاره کرد که شامل: حالت تهوع، استفراغ، نفخ و سایر ناراحتی‌های گوارشی از قبیل سیاهی مدفوع، اسهال، بیوسته وی اشتها بی است.

• در صورت بروز عوارض، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

هشدارها:

- این فرآورده جایگزین رژیم غذایی اصلی نمی‌باشد.
- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- در صورت مصرف مکمل یا داروی دیگر برای کودک، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید.
- در صورت بروز عوارض جانبی با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت ابتلای کودک به بیماری زمینهای، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک مشورت نمایید. این بیماری‌ها شامل: هموکروماتوزیس، هموسیدروزیس، آمی همولیتیک و ... می‌باشد.
- در صورت حساسیت کودک، از مصرف این فرآورده پرهیز نمایید.

شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- قبل از باز نمودن درب فرآورده برای اولین بار آن را به صورت ایستاده، در بسته‌بندی اصلی (بطری و جعبه مقوایی)، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.
- پس از باز نمودن درب فرآورده برای اولین بار، آن را به صورت ایستاده، در بسته‌بندی اصلی (بطری و جعبه مقوایی)، و در یخچال نگهداری نمایید.
- از مصرف فرآورده‌ای که بیش از یک ماه از باز شدن درب‌اش گذشته است، خودداری نمایید.
- فرآورده را از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارنده پروانه ساخت: داروسازی عبیدی (تهران - ایران)
ساخت ایران



تاسیس ۱۳۲۵

Indication:

- Helps to supply required Iron and prevent Iron deficiency anemia.

Dosage and Administration:

- 1 ml daily or according to the physician's advice.
- It can be either administered directly or as dissolved in water, any time of the day.
- In order to ensure precise dosing, use the dropper inside the box.
- Rinse the dropper after each use.

Shake well to get a homogeneous mixture, before each use.

This product is a supplement and not intended to prevent, diagnose or treat any disease.

Supplement Facts	
Serving Size: 1 ml	
Amount per ml	% Daily Value
Iron (as Liposomal) 15 mg	6-12 months: 130%
	Above 1 year: 200%

Adverse effects:

- Iron can cause gastrointestinal side effects such as: nausea, vomiting, blotting, melena, diarrhea, constipation and loss of appetite.

Warnings:

- This product is not a substitute for the main diet.
- Please do not take more than recommended dose.
- In case the child takes other medicines or supplements, consult a doctor before administering this product.
- In case of side effects, consult your pharmacist or physician.
- In case of underlying diseases such as Hemochromatosis, Hemosiderosis, Hemolytic anemia and etc. consult a doctor before administering this product.
- In case of allergy to any of the ingredients of this product, Avoid using it.

Storage:

- Keep out of reach and sight of children.
- Prior to opening for the first time, keep in the upright position, in the original package, below 25°C and away from light.
- After opening for the first time, keep in the upright position, in the original package, in the refrigerator.
- Avoid use further than 1 month after opening the product for the first time.
- Do not freeze

License Holder: Abidi Pharmaceutical Co. (Tehran- Iran)