


| | | |
|--|---|--|
| ویرایش: ۰۰ کد مستند: ID-SC-0451/BR | عنوان مستند: مشخصات بروشور قرص روفولیک رگولار [فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) ۴۰۰ میکروگرم / ویتامین ب ۱۲ (۵۰ میکروگرم)] (۳ بلیستر ۱۰ عددی) (محل ساخت: شرکت داروسازی امین) Title: Revofolic Regular [Folate (as Calcium-L-methylfolate) 400 mcg/ Vitamin B12 (50 mcg)] Tablet Leaflet Specification(3 Blisters of 10s) (Manufacturing Site:Amin Pharmaceutical Company) |  تاسیس ۱۳۲۵ داروسازی دکتر عبیدی |
| محل مهر معتبر (VALID): | تاریخ بررسی مجدد: ۰۵/۰۴ | تاریخ اجرا: ۰۲/۰۴/۲۵ |
| شماره صفحه: ۱ از ۱ | | شماره صفحه: ۱ از ۱ |

| | |
|----------|---|
| ابعاد | 170mm x 150mm |
| جنس کاغذ | 60g/m ² ± 10 Paper |
| رنگ طرح | رنگ ۲ Pantone 300 U |
| سایه کد | محل استقرار ۲ عدد، سمت چپ بالای بروشور در فاصله ۳ و ۵ mm در اندازه 1x6mm با رنگ Pantone 650 U |
| نوعت | مکان: Myriad Pro |
| کد بارکد | محل استقرار بارکد: سمت راست مطابق با عدد 1/2212006 |
| بارکد | محل استقرار سمت چپ، در فاصله ۷۰ میلی متر از پایین مطابق با عدد 2212006 |

بروشور (Leaflet)



رُفولیک

رگولار

فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) ۴۰۰ میکروگرم
 ویتامین ب ۱۲ ۵۰ میکروگرم

ماده موثره: فولات (به صورت کلسیم-ال-متیل فولات) و ویتامین ب ۱۲. هر قرص حاوی ۴۰۰ میکروگرم ماده موثره فولات به صورت کلسیم-ال-متیل فولات و ۵۰ میکروگرم ویتامین ب ۱۲ است.

مورد مصرف: کمک به تامین فولات و ویتامین ب ۱۲

سایر ترکیبات: میکروکریستالین سلولوز، لاکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف: ۱ تا ۲ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبی: به طور معمول فولات به خوبی تحمل می‌گردد. موارد نادری از عوارض گوارشی و واکنش حساسیتی گزارش شده است ولی تجویز دوز بالای مشتقات فولات می‌تواند منجر به کرامپ شکمی، اسهال، راش، بدخوابی، سرگیجه، حالت تهوع، عوارض معده و سایر عوارض گردد.

تداخلات دارویی: داروهای ضد صرع، ضد بارداری خوراکی، ضد سل، فرآورده های حاوی الکل مانند متیل الکل، گلوکوپیداز و آنتاگونیست های فولیک اسید مثل متوتروکسات، پیریمتامین، تریامترن، تریمپیرامین و سولفونامیدها می‌تواند منجر به کمبود


فولات گردد. در موقعیت هایی از قبیل درمان با متوتروکسات و داروهای ضد صرع جهت جلوگیری از پیشرفت آنمی مگالوبلاستیک درمان با فولات و فولینیک اسید لازم است. کاهش غلظت سرمی فینتوئین طی مصرف مکمل فولات در مواردی گزارش شده است و احتمالاً چنین اثری در مصرف همزمان با باربیتورات ها نیز مشاهده می‌گردد.

منع مصرف: در صورت حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده مصرف روفولیک رگولار توصیه نمی‌گردد.


احتیاط: مصرف فولات می‌تواند موجب پوشاندن علائم آنمی پرنسیوز گردد. در موارد نادر و دوزهای بالا، فولات می‌تواند موجب ایجاد حمله های تشنجی در افراد مبتلا به صرع گردد.

شرایط نگهداری: این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. این فرآورده را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

دارنده پروانه ساخت: داروسازی دکتر عبیدی - تهران - ایران
 ساخت ایران




تاسیس ۱۳۲۵



170mm x 150mm 000000002

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| ریس چاپ و تامین اقلام بسته بندی: | مدیر تولید: | مدیر فنی و مهندسی: | مدیر محصول: | مسئول فنی: |
| تاریخ و امضا: | تاریخ و امضا: | تاریخ و امضا: | تاریخ و امضا: | تاریخ و امضا: |