



هر کپسول از این فرآورده حاوی ۶۰۰ میلی گرم ترکیب هگزوز فعال شده از عصاره قارچ شیتاکه (استاندارد شده بر اساس ۲۰٪ آلفا - گلوکان) می باشد که در جعبه های ۳۰ عددی به همراه برگه راهنما توسط شرکت داروسازی دکتر عبیدی تولید و به بازار عرضه می گردد.

#### راهنمایی های عمومی:

- قبل از مصرف این فرآورده برگه راهنما را به دقت مطالعه نمائید زیرا حاوی اطلاعات مهمی در خصوص این محصول می باشد.  
- در صورت داشتن سوالات بیشتر با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمائید.

#### مکانیسم اثر:

هگزوز فعال شده یک ماده خوراکی است که از میسلیم قارچ شیتاکه به دست می آید.  
این ماده شامل پلی ساکاریدها، آمینو اسیدها و مواد معدنی است. ۷۵٪ هگزوز فعال شده شامل اولیگوساکارید و ۲۰٪ آن حاوی آلفا - ۱ و ۴ گلوکان است که این مواد مسئول عملکرد زیستی قارچ شیتاکه می باشند.  
هگزوز فعال شده باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی می شود. این ترکیب از طریق افزایش عملکرد انواع لنفوسیت ها از جمله سلول های T کمکی ( $T_H$ ), سلول های کشنده طبیعی (Natural Killer Cells)، ماکروفاژها و نیز تعدیل سطوح سیتوکین ها و عوامل ضد التهابی در بدن نقش خود را ایفا و موجب تنظیم و تعدیل پاسخ ایمنی می شود.  
سویه های قارچ شیتاکه بکار رفته در این محصول توسط روش و متد ویژه ای کشت و رشد یافته و عاری از هرگونه آلودگی میکروبی و دارای خلوص و کیفیت بالایی می باشد.

#### موارد مصرف:

- تقویت و تعدیل سیستم ایمنی
- محافظت در برابر عفونت های ویروسی و قارچی
- کمک به بهبود بیماری هایی چون تبخال، زگیل تناسلی، سرماخوردگی و آنفلوآنزا
- کمک به کاهش عوارض داروهای شیمی درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران
- افزایش قوای جسمانی

#### مقدار مصرف:

- بزرگسالان: روزانه ۱ الی ۳ عدد کپسول در دوزهای منقسم و طبق دستور پزشک مصرف شود.
- این فرآورده بهتر است با معده خالی نیم ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا مصرف گردد.

#### منع مصرف:

- در صورت وجود حساسیت به هر یک از ترکیبات بکار رفته در این محصول
- آنژیونفیلیا (افزایش تعداد آنژیونفیل در خون)

#### هشدارها و احتیاطات مصرف:

- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
- کپسول ها را به طور کامل بلعیده و از جویدن و یا خرد کردن آن خودداری نمائید.
- در صورت ابتلا به بیماری های خودایمنی مانند MS، لوپوس اریتماتوس سیستمیک، آرتریت روماتوئید و... قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمائید.
- در صورت ابتلا به ترومبوسیتوپنی (کاهش تعداد پلاکت خون) به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت نمائید.

#### بارداری و شیردهی:

به دلیل نبود اطلاعات کافی از مصرف این فرآورده در بارداری و شیردهی خودداری نمائید.

#### تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف داروهای زیر با پزشک خود مشورت کنید:
- داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند دوکسوروبیسین، سینتارابین، متوترکسات، مراکپتوپورین، سیس پلاتین و دکزامتازون.
- همچنین این ترکیب می تواند با اثر بر روی مسیرهای متابولیک سیتوکروم P450 2D6 با داروهای ذیل تداخل ایجاد نماید:
- داروهای چون فلوکستین، سرتالین، پاروکستین
- داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین
- داروهای آنتی آریتمی چون کینیدین
- تاموکسیفن و لتروزول
- داروهای بتا بلاکر
- داروهای ضد قارچ

#### عوارض جانبی:

در دوزهای معمول، عارضه جانبی خاصی همراه با این فرآورده گزارش نشده است. در برخی افراد عوارض خفیف گوارشی مانند اسهال، استفراغ، سوء هاضمه، تهوع و سوزش سر دل، نفخ، درد شکمی، سردرد، ضعف و خستگی مشاهده شده است. بروز درماتیت و حساسیت به نور در برخی بیماران گزارش شده است.

#### سایر ترکیبات:

مالتودکسترین، سیلیکون دی اکساید، منیزیم استنارات

#### شرایط نگهداری:

- فرآورده را در محیط خشک و خنک و به دور از نور نگهداری نمائید.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نماید.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری  
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی  
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵  
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹  
www.abidipharma.com  
سایت اینترنتی:  
VOc@abidipharma.com  
ایمیل جهت ارتباط مشتری:  
تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۰۳/۲۶

فرآورده داروسازی دکتر عبیدی  
تهران - ایران

عبیدی  
تاسیس ۱۳۷۵

