

Children
Advalgin®

Ibuprofen



ادوالژین®
کودکان

ایبوپروفن

سوسپانسیون ادوالژین® کودکان به صورت سوسپانسیون نارنجی رنگ، با طعم و بوی میوه، در بطری‌های ۱۲۰ میلی‌لیتری که هر ۵ میلی‌لیتر آن حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم ایبوپروفن است، توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌شود.

موارد مصرف:

این دارو جهت تسکین درد ناشی از دندان‌درد آوردن و دندان‌درد، گوش‌درد، دردهای خفیف عضلانی و بیخ‌خوردگی، گلودرد و علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا، سردردها و همچنین کاهش تب بالا از جمله تب ناشی از واکسیناسیون بکار برده می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری‌های قلبی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

۱- وجود هرگونه حساسیت

۲- رعایت هرگونه رژیم غذایی خاص شامل رژیم کم سدیم یا کم قند

۳- بارداری یا شیردهی

۴- استفاده از سایر داروها

۵- ابتلا به بیماریهای دیگر

موارد منع مصرف:

۱- سابقه حساسیت به ایبوپروفن یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو

۲- سابقه واکنش آلرژیک شدید مانند آسم، کهیر، ابریزش بینی، آنفیلاکسی یا آنژیوادم ناشی از مصرف آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

۳- پولیپ‌های بینی همراه با انقباض برونش‌ها ناشی از مصرف آسپیرین

۴- مصرف همزمان با آسپیرین یا دوز روزانه بیشتر از ۷۵ میلی‌گرم و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

۵- سابقه زخم، سوراخ شدن یا خونریزی معده

۶- نارسایی شدید کلیه، کبد و قلب

۷- کودکان با وزن کمتر از ۵ کیلوگرم یا سن کمتر از ۳ ماه

۸- سه ماهه آخر بارداری

۹- تسکین درد طی عمل بای‌پس عروق قلب

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو طی دوران بارداری باید تحت نظر پزشک متخصص و با احتیاط انجام گیرد.

شیردهی - این دارو به میزان جزئی در شیر مادر ترشح می‌گردد. بنابراین مصرف آن در دوران شیردهی باید با نظر پزشک انجام گیرد.

هشدارها:

۱- افراد مسن معمولاً به عوارض این دارو بیشتر حساس می‌باشند.

۲- حضور بیماریهای دیگر ممکن است در مصرف این دارو تأثیر بگذارد. در صورت ابتلا به بیماریهای دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

مشکلات خونریزی، کولیت، بیماری گرون، دیورتیکولیت، زخم معده یا سایر بیماریهای معده و روده، دیابت ملیتوس، هموروئید، هپاتیت یا سایر بیماریهای کبد، بیماری کلیه، سوزش یا خونریزی اخیر معده، لوپوس اریتماتوز سیستمیک، استعمال دخانیات - احتمال بروز عوارض جانبی ممکن است افزایش یابد.

کم خونی، آسم، صرع، احتیاس مایعات، بیماری قلب، فشار خون بالا، سابقه سنگ‌های کلیه، شمارش پایین پلاکت‌ها، شمارش پایین گلبول‌های سفید خون، بیماری ذهنی، پارکینسون، پلی‌میالژی روماتیسمی، پورفیری، آرتریت تمپورال - مصرف ایبوپروفن ممکن است باعث وخامت این بیماریها گردد.

زخم‌ها یا نقاط سفید رنگ در دهان - این علائم می‌تواند اثر ناخواسته جدی ناشی از مصرف ایبوپروفن باشد.

موارد احتیاط:

۱- اگر این دارو را به مدت طولانی مصرف می‌نمایید، به منظور کنترل پیشرفت درمان در فواصل معین به پزشک مراجعه کنید. پزشک ممکن است انجام برخی آزمایشات را جهت بررسی بروز برخی عوارض ناخواسته تجویز نماید. این آزمایشات بسیار مهم است، زیرا که عوارض جانبی جدی شامل زخم، خونریزی یا بیماری خونی می‌تواند بدون هیچ گونه هشدار رخ دهد.

۲- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه‌های حاوی الکل ممکن است باعث مشکلات معده‌ای شود.

۳- مصرف همزمان و مداوم این دارو با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ممکن است احتمال بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. همچنین مصرف همزمان استامینوفن، آسپیرین یا سایر سالیسیلاتها یا کتورولاک با این دارو ممکن است خطر بروز اثرات ناخواسته را افزایش دهد. میزان خطر به مقدار مصرف روزانه هر دارو و مدت مصرف همزمان داروها بستگی دارد.

۴- درمان با این دارو می‌تواند باعث بروز عوارض جانبی جدی شود. گاهی اوقات این عوارض می‌تواند بدون علائم باشد. اگرچه علائم هشدار دهنده مانند ورم صورت، انگشتان، پاها و پایین ساق‌ها، درد شدید معده، مدفوع سیاه‌رنگ و قیری شکل، استفراغ خون یا مواد مشابه با دانه‌های قهوه، افزایش غیرعادی وزن و بهورات جلدی اغلب بروز می‌نمایند. همچنین ممکن است علائم جدی بیماریهای قلبی مانند درد قفسه سینه، احساس تنگی در قفسه سینه، ضربان سریع یا نامنظم قلب، گرگرفتگی غیرعادی یا گرمای پوست بروز نماید. در چنین مواردی سریعاً مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.

۵- قبل از انجام هرگونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) و یا سایر درمان‌های فوریت‌دار پزشکی، پزشک یا دندانپزشک خود را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.

۶- این دارو ممکن است باعث افتشاش شعور، خواب‌آلودگی، گیجی، منگی و کم شدن هوشیاری در برخی افراد گردد. همچنین ممکن است باعث تاری دید یا سایر مشکلات بینایی در برخی افراد شود. لذا توصیه می‌گردد قبل از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، احتیاط نمایید.

۷- برخی افراد در هنگام مصرف این دارو ممکن است نسبت به نور خورشید بیشتر حساس باشند. تماس با نور خورشید حتی اگر به مدت کوتاه باشد ممکن است باعث بروز آفتاب سوختگی شدید، ایجاد تاول بر روی پوست؛ بهورات جلدی، قرمزی، خارش یا تغییر رنگ پوست و تغییرات بینایی گردد.

۸- در صورت مشاهده لرز، تب، درد یا کوفتگی عضلات و سایر علائم مشابه با آنفلوآنزا بخصوص اگر با بهورات جلدی همراه گردد، سریعاً با پزشک خود مشورت نمایید. این اثرات ممکن است به‌ندرت اولین علائم ناشی از عوارض جانبی جدی دارو باشد.

۹- مصرف این دارو ممکن است باعث یک واکنش آلرژیک جدی به نام آنفیلاکسی گردد. این واکنش اغلب در بیمارانی بروز می‌نماید که به آسپیرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی حساسیت دارند. در آنفیلاکسی به درمان‌های فوریت‌دار پزشکی نیاز است. از بیشترین علائم این واکنش می‌توان به تنفس سریع یا نامنظم؛ خس‌خس کردن و سنکوپ اشاره نمود. از سایر علائم می‌توان تغییر رنگ پوست صورت؛ ضربان قلب یا نبض سریع یا نامنظم؛ ورم کهیر مانند پوست و ورم پلک‌ها را نام برد. در چنین شرایطی، بلافاصله درمان‌های فوریت‌دار پزشکی مورد نیاز است.

۱۰- در صورت عدم بهبود علائم و یا بدتر شدن آنها، مشاهده تب بالا یا تنگی که به مدت بیشتر از ۳ روز ادامه یابد و قرمزی یا تورم ناحیه درد، با پزشک خود مشورت نمایید.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
الکل، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین – احتمال بروز مشکلات جدی معده مانند زخم و خونریزی ممکن است افزایش یابد.
داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین و هپارین) – خطر خونریزی ممکن است افزایش یابد.
آسپیرین – در صورت مصرف همزمان و مداوم آسپیرین و ایبوپروفن، احتمال بروز عوارض جانبی جدی افزایش می‌یابد.
سیکلوکسیپورین، تاکرولیموس، گلیکوزیدهای دی‌دی‌انسی، لیتیم، متوترکسات، فنی‌توئین – مقدار این داروها در خون و همچنین احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.
انالاپریل، کانوپریل، لوزارتان، بتابلوکرها (مانند آتنولول، پروپرانولول) – مصرف توأم این داروها با ایبوپروفن، ممکن است باعث کاهش اثرات کاهنده فشار خون آنها گردد.
پروبنسید – مقدار ایبوپروفن در خون و احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می‌یابد.
مدرها (مانند تیازیدها، مدرهای نگهدارنده پتاسیم و مدرهای لوپ) – مصرف توأم این داروها با ایبوپروفن، ممکن است باعث کاهش اثرات مدری و افزایش خطر نارسایی حاد کلیوی گردد.
تریامترو – احتمال بروز مشکلات کلیوی ممکن است افزایش یابد.
آنتی بیوتیک‌های کینولونی (مانند سیپروفلوکساسین) – خطر تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی ناشی از مصرف این آنتی بیوتیک‌ها ممکن است افزایش یابد.
ضمناً غلظت‌های پلاسمایی این آنتی بیوتیک‌ها نیز افزایش می‌یابد. رعایت احتیاط ضروری است.
مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین (مانند فلوکستین، ونلافاکسین) – مصرف توأم داروها ممکن است باعث افزایش اثر ضد پلاکت ایبوپروفن و افزایش خطر خونریزی گوارشی گردد، ضمن آن که اثر درمانی مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین نیز ممکن است کاهش یابد.
مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما میزان مصرف این دارو به طور کلی به صورت زیر است:

تب و درد ناشی از سرماخوردگی و آنفلوآنزا و تب ناشی از واکسیناسیون	
۱۲ - ۶ ماه	۲/۵ میلی‌لیتر ۲ یا ۴ بار در طی ۲۴ ساعت
۳ - ۱ سال	۵ میلی‌لیتر ۳ بار در طی ۲۴ ساعت
۶ - ۴ سال	۷/۵ میلی‌لیتر ۳ بار در طی ۲۴ ساعت
۹ - ۷ سال	۱۰ میلی‌لیتر ۳ بار در طی ۲۴ ساعت
• فواصل بین دوزهای مصرفی باید بین ۶ تا ۸ ساعت باشد. بین دوزها باید حداقل ۴ ساعت فاصله باشد. از مصرف بیشتر از دوزهای پیشنهادی در طی ۲۴ ساعت خودداری شود. • این دارو فقط برای مصرف کوتاه مدت است. از مصرف دارو در کودکان با سن ۶ ماه یا بالاتر به مدت بیشتر از ۳ روز خودداری شود. در صورت تداوم علائم پس از ۳ روز و یا بدتر شدن آن با پزشک خود مشورت نمایید.	

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک یا راهنمای دارو مصرف نمایید. از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور پزشک یا راهنمای دارو خودداری نمایید، مگر آن که پزشک تجویز نموده باشد.
- ۲- به منظور کاهش تحریکات گوارشی، دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف نمایید.
- ۳- قبل از هر بار مصرف، بطری را خوب تکان دهید.
- ۴- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
در صورت بروز عوارض زیر سریعاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
عوارض نادر – سنگوب؛ تنفس سریع و نامنظم؛ ضربان سریع و نامنظم قلب یا نبض؛ ورم کبهر مانند صورت، پلک‌ها، دهان، لبها یا زبان؛ پف یا ورم پلک‌ها یا اطراف چشم‌ها؛ تنگی نفس، تنفس مشکل؛ خس‌خس کردن یا احساس تنگی در قفسه سینه
برخی عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مثل انقباضات، درد یا ناراحتی خفیف تا متوسط شکم یا معده؛ اسهال؛ گیجی؛ خواب‌آلودگی؛ منگی؛ سردرد خفیف تا متوسط؛ سوزش معده؛ سوء هاضمه، تهوع و استفراغ با پزشک خود مشورت نمایید.
توجه – در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائمی نظیر تغییر رنگ پوست یا لبها به آبی؛ اشکال در به خواب رفتن؛ عدم جهت یابی؛ گیجی، سنگوب یا منگی در هنگام بلند شدن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته؛ خواب‌آلودگی تا کومای عمیق؛ توهیم؛ تغییرات رفتاری یا ذهنی؛ لرزش عضلات؛ عدم اشتها؛ تنفس سریع و عمیق؛ بیقراری؛ ضربان کند یا نامنظم قلب؛ انقباضات معده؛ سنگوب ناگهانی و تعریق، بیمار باید سریعاً به پزشک و یا مراکز درمانی منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری نمایید.
- دارو از یخ زدگی محافظت گردد.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری
(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶-۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۲۱
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com
تاریخ ویرایش: ۹۹/۰۷/۱۵

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

تهران - ایران

عبیدی
تاسیس ۱۳۷۵

