



ریپوا® ۷۵ به صورت قرص های خوراکی بازشونده در دهان است و هر قرص حاوی ۷۵ میلی گرم ریمجنت (به صورت سولفات) می باشد. این دارو در جعبه های ۲ عددی و ۸ عددی قرص توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می گردد.

موارد مصرف:

ریپوا® ۷۵، یک آنتاگونیست گیرنده پتیدی مرتبط با ژن کلسیتونین است که در موارد زیر بکار می رود:
- درمان حملات میگرن همراه با و یا بدون اورا در افراد بزرگسال
- درمان پیشگیریانه میگرن در افراد بزرگسال

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها و یا ابتلا به بیماری های دیگر

موارد منع مصرف:

حساسیت به ریمجنت یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - اطلاعات محدودی در خصوص مصرف این دارو در خانم های باردار وجود دارد، ترجیحاً از مصرف این دارو در دوران بارداری خودداری شود.
شیردهی - مقادیر بسیار جزئی از این دارو در شیر مادر ترشح می شود. در خصوص اثرات ریمجنت بر روی نوزاد شیرخوار و یا تولید شیر اطلاعاتی وجود ندارد. تجویز این دارو در شیردهی بنا به صلاحدید پزشک معالج و با در نظر گرفتن سود و زیان احتمالی برای مادر و نوزاد انجام خواهد شد.

هشدارها/موارد احتیاط:

- ۱- ایمنی و اثر بخشی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال ثبت نشده است.
- ۲- واکنش های حساسیتی شدید شامل تنگی نفس و به ثورات جلدی می تواند چند روز پس از مصرف دارو ایجاد شود. در صورت بروز واکنش حساسیتی، مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک تماس گرفته شود.
- ۳- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی و کلیوی (کلیرانس کراتینین کمتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه) توصیه نمی شود.
- ۴- مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش فشار خون شود یا فشار خون بالا را تشدید نماید. در صورت مشاهده علائم فشار خون بالا، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۵- مصرف این دارو ممکن است باعث بروز پدیده رینود شود یا علائم آن را تشدید نماید. در صورت بروز علائم یا نشانه های پدیده رینود، مصرف دارو را قطع نموده و با پزشک خود تماس بگیرید.

تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، پزشک یا داروساز را از سایر داروهای مصرفی خود مطلع نمایید.
- در هنگام مصرف ریمجنت از مصرف داروهای زیر خودداری نمایید: کلاریترومایسین، ایتراکونازول، ریتوناویر، فنوباریتال، ریگامیسین، St. John's wort، بوستان، ونتوکلکس، افوایرنز و مداخلینیل
- در صورت مصرف داروهای زیر، ریمجنت را برای درمان حملات میگرن بیشتر از یک بار طی ۴۸ ساعت مصرف نکنید:
دیلتازم، اریترومایسین، فلوکونازول، سیکلوسپورین، وراپامیل و کینیدین

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف پیشنهادی این دارو به شرح زیر است:
درمان حملات میگرن:
بزرگسالان - ۷۵ میلی گرم در صورت نیاز است.
حداکثر مقدار مصرف در یک دوره ۲۴ ساعت، ۷۵ میلی گرم است. مصرف بیشتر از ۱۸ دوز در یک دوره ۳۰ روزه، توصیه نمی شود.
درمان پیشگیریانه میگرن:
بزرگسالان - ۷۵ میلی گرم به صورت یک روز در میان است.
در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
۱- این دارو را مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
۲- دارو را می توان با یا بدون غذا مصرف نمود.
۳- به محض باز شدن بلیستر، قرص را خارج نموده، آن را رو یا زیر زبان قرار دهید تا در بزاق دهان باز شود.
۴- قرص را بلافاصله پس از باز شدن از بلیستر مصرف نمایید و برای مصرف بعدی،

آن را خارج از بلیستر نگهداری نکنید.

۵- در صورت مصرف مقادیر بیشتر دارو، سریعاً با پزشک خود یا داروساز تماس بگیرید و یا به بیمارستان مراجعه نمایید.

۶- در صورتی که این دارو را برای پیشگیری از میگرن مصرف نموده و یک دوز را فراموش کردید، دوز فراموش شده را مصرف ننموده و برنامه عادی خود را در روز بعد از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

واکنش های آلرژیک شامل مشکلات تنفسی و به ثورات جلدی، ممکن است بلافاصله و یا چند روز پس از مصرف دارو دهد. در صورت بروز هر یک از علائم زیر که ممکن است بخشی از یک واکنش آلرژیک باشد، سریعاً با پزشک خود تماس گرفته و یا به مرکز فوریت پزشکی مراجعه نمایید:

ورم صورت، دهان، زبان یا گلو؛ تنگی تنفس
در صورت بروز فشار خون بالا یا بدتر شدن آن و یا همچنین پدیده رینود که با بی حسی، سردی یا دردناک شدن انگشتان دست یا پا و یا تغییر رنگ از رنگ پریدگی به ابی یا قرمز همراه است، با پزشک خود تماس بگیرید.

شایع ترین عارضه جانبی ریمجنت در درمان حاد حملات میگرنی همراه با و یا بدون اورا، تهوع است.

شایع ترین عوارض جانبی ریمجنت در درمان پیشگیریانه میگرن، تهوع، درد شکم و سوء هاضمه است.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۱۲۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۴۴۵۰۰۲۲۹ - ۰۲۱

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۰۴/۱۰/۰۶

ساخت داروسازی دکتر عبیدی

abidi
SINCE 1946

تهران - ایران



Repiva® 75 is an orally disintegrating tablet. Each tablet contains 75 mg of rimegepant. It is provided by Dr. Abidi Pharmaceuticals in boxes of 2s and 8s.

Indications:

Repiva® 75 is a calcitonin gene-related peptide receptor antagonist indicated for the:

- Treatment of migraine attacks with or without aura in adults
- Preventive treatment of migraine in adults

General Advice:

This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

Tell your doctor or pharmacist in case of:

History of allergic reaction, pregnancy or breast-feeding, taking any other medicines, having any other medical problems

Contraindications:

Hypersensitivity to rimegepant or any component of this medicine

Use in Pregnancy and Breast-feeding:

Pregnancy - There are limited data from the use of this medicine in pregnant women. As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of this medicine during pregnancy.

Breast-feeding - Very small amounts of this medicine pass into the human milk. There are no data on the effects of rimegepant on a breastfed infant or on milk production. The developmental and health benefits of breast-feeding should be considered by the doctor along with the mother's clinical need for this medicine and any potential adverse reactions on the breastfed infant from this medicine or from the underlying maternal condition.

Warnings / Precautions:

- 1- The safety and efficacy of this medicine in pediatric patients younger than 18 years of age have not been established.
- 2- Hypersensitivity reactions, including dyspnea and rash, can occur days after administration. If a hypersensitivity reaction occurs, stop taking this medicine and call the doctor.
- 3- Using this medicine is not recommended in patients with severe hepatic impairment and in patients with end-stage renal disease (CLcr < 15 ml/min).
- 4- Hypertension can develop or pre-existing hypertension can worsen with this medicine. Contact your doctor if you experience elevation in your blood pressure.
- 5- Raynaud's phenomenon can develop or worsen with this medicine. Discontinue this medicine and contact your doctor if you experience signs or symptoms of Raynaud's phenomenon.

Drug Interactions:

Tell your doctor if you take any of the following medicines:

- The following medicines should be avoided when taking rimegepant: Clarithromycin, itraconazole, ritonavir, phenobarbital, rifampicin, St. John's wort, bosentan, venetolax, efavirenz, modafinil

- Do not take rimegepant more than once every 48 hours with: Diltiazem, erythromycin, fluconazole, cyclosporin, verapamil, quinidine

Administration and Dosage:

The recommended dose of this medicine is as follows:

Treatment of migraine attacks:

Adults - 75 mg taken orally, as needed.

The maximum dose in a 24-hour period is 75 mg. The safety of using more than 18 doses in a 30-day period has not been established.

Preventive treatment of migraine:

Adults - 75 mg taken orally every other day.

Proper use of this medicine:

- 1- Take this medicine exactly as your doctor has told you.
- 2- The medicine can be taken with or without food.
- 3- As soon as the blister is opened, remove the tablet and place it on or under the tongue, where it will disintegrate in the saliva.
- 4- Take the tablet immediately after opening the blister pack. Do not store it outside the blister pack for future use.
- 5- If you take more of this medicine than you should, talk to your

doctor or pharmacist or go to a hospital straight away.

6- If you take this medicine for the prevention of migraine and you miss a dose, just take the next dose at the usual time. Do not take a double dose.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Allergic reactions, including trouble breathing and rash, can happen immediately or days after taking this medicine. Call your doctor or get emergency help right away if you have any of the following symptoms, which may be part of an allergic reaction:

Swelling of the face, mouth, tongue, or throat; trouble breathing

Contact your doctor if you have an increase in blood pressure or experience Raynaud's phenomenon which can lead to your fingers or toes feeling numb, cool, or painful, or changing color from pale, to blue, to red.

The most common side effect of rimegepant in acute treatment of migraine attacks with or without aura is nausea.

The most common side effects of rimegepant in preventive treatment of migraine are nausea, stomach pain and indigestion.

Storage:

- Keep out of reach and sight of children.
- Do not use the medicines after the expiry date.
- Store in the original container.
- Store below 30° C. Protect from moisture.
- Do not throw away any medicine via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

Dr. Abidi Pharmaceuticals, No. 72, Abidi Blvd.
8th Km of Shahid Lashgari Exp. (Karaj Makhsoos Rd.)
Tehran, Iran, P.O.Box: 13445 - 156
Phone: (+9821) 44500229
Website: www.abidipharma.com
Customer service: VOC@abidipharma.com

Dr. Abidi Pharmaceuticals
Tehran - Iran

abidi
SINCE 1946

Revision date: December 2025

