

زیوریا® ۲۰ به صورت قرص‌های خط‌دار خوراکی و هر قرص حاوی ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین است. این دارو در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

زیوریا® حاوی ماده موثره بیلاستین است که یک آنتی‌هیستامین می‌باشد. این دارو برای تسکین علائم تب پوچنه (عطسه)، خارش، ابریزش و گرفتگی بینی و قرمزی چشم و اشک ریزش و سایر اشکال رینیت آلرژیک مصرف می‌شود. همچنین ممکن است برای کپهر (بثورات جلدی) مزمن خود به خودی مورد استفاده قرار گیرد.

راهنمای‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید: وجود هرگونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- حساسیت بیش از حد به بیلاستین یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- سابقه عارضه قلبی طولانی شده QT و یا بیماری تورسداد د پوینت شامل سندرم‌های مادرزادی QT طولانی

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در زنان باردار مورد مطالعه قرار نگرفته است، لذا مصرف آن طی دوران بارداری توصیه نمی‌شود.
شیردهی - در خصوص ترشح این دارو در شیر انسان مطالعه‌ای صورت نگرفته است. مطالعات در حیوانات، ترشح بیلاستین در شیر را نشان داده است. در مورد ادامه مصرف این دارو یا قطع شیردهی طی دوران شیردهی، با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها/موارد احتیاط:

۱- کارآیی و ایمنی بیلاستین در کودکان کمتر از ۲ سال اثبات نشده است، ضمن آن که اطلاعات بالینی محدودی از مصرف آن در کودکان ۲ تا ۴ سال وجود دارد. بنابراین مصرف این دارو نباید در این گروه‌های سنی انجام شود.
از مصرف قرص زیوریا® ۲۰ در کودکان کمتر از ۱۲ سال خودداری نمایید.
۲- در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
نارسایی متوسط یا شدید کلیوی و کبدی
افزایش فاصله QT - مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش فاصله QT شود. در بیماران دارای سابقه اریتمی قلبی، برادی کاردی قابل توجه، سابقه مرگ ناگهانی یا ایست قلبی در خانواده و اختلالات الکترولیت (مانند هیپوکالمی، هیپومگنیزمی) با احتیاط مصرف شود.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
کنوکونازول (داروی ضد قارچ)، اریترومايسين (آنتی‌بیوتیک)، دیلتیازم (برای درمان آنژین صدری)، سیکلوسپورین (کاهش دهنده فعالیت سیستم ایمنی بدن)، ریتوناویر (برای درمان ایدز) و ریفامپيسين (آنتی‌بیوتیک)، بتاهستین، دیورتیک‌های لوپ شامل فوروزماید، برخی داروهای الکافندنه قوی آئزیم CYP3A4
از مصرف همزمان داروهای زیر با بیلاستین خودداری نمایید:
لاسمیدیتان، اسپارستتان، تائوروسودوئل، پیتولیسانت

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف پیشنهادی این دارو به شرح زیر است:
بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از ۱۲ سال - یک قرص زیوریا® ۲۰ یک بار در روز است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
- ۲- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید. در صورت تداوم علائم، با پزشک خود مشورت نمایید.
- ۳- قرص را همراه با یک لیوان آب میل نمایید. در صورت اشکال در بلع کامل قرص، آن را نصف نمایید.
- ۴- دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا یا آب میوه مصرف نمایید.

- ۵- از مصرف آب گریپ‌فروت همراه با این دارو خودداری نمایید.
- ۶- دوره درمان بر اساس نوع بیماری، توسط پزشک تعیین می‌گردد.
- ۷- در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به‌محض به یاد آوردن، آن را میل نمایید. سپس برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.
- ۸- در صورت مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو، سریعاً به پزشک اطلاع دهید و یا به مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به‌موالات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
شایع: ممکن است تا ۱ نفر در هر ۱۰ نفر را تحت تأثیر قرار دهد
سردرد، خواب‌آلودگی، گیجی، درد در ناحیه فوقانی شکم

غیرشایع: ممکن است تا ۱ نفر در هر ۱۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار دهد
نوار قلب غیرطبیعی، تغییر در آزمایشات خونی عملکرد کبدی، گیجی، درد معده، خستگی، افزایش اشتها، ضریب نامنظم قلب، افزایش وزن، تهوع، اضطراب، خشکی یا ناراحتی بینی، درد شکم، اسهال، گاستریت (ورم دیواره معده)، سرگیجه، احساس ضعف، تشنگی، تنگی نفس (اشکال در تنفس)، خشکی دهان، سوء هاضمه، خارش، تیخال دهانی، تب، وزوز گوش، اشکال در خوابیدن، تغییر در آزمایشات خونی عملکرد کلیوی، افزایش چربی خون

فراوانی ناشناخته: از داده‌های موجود قابل تخمین نیست
تپش قلب، تآکی کاردی (ضریان سریع قلب)، استفراغ

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق قاضاب یا زاله‌های خانگی دور نریزد. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، پلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی

صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

سایت اینترنتی: www.abidipharma.com

ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

تاریخ تدوین: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران - ایران
عبیدی
تاسیس ۱۳۷۵



2210000