

زیوریا® کودکان به صورت محلول خوراکی و هر میلی‌لیتر آن حاوی ۲/۵ میلی‌گرم بیلاستین است. این دارو در بطری‌های ۱۲۰ میلی‌لیتری توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:

زیوریا® حاوی ماده مؤثره بیلاستین است که یک آنتی‌هیستامین می‌باشد. این دارو برای تسکین علائم تب یونجه (علسبه)، خارش، آبریزش و گرفتگی بینی و قرمزی چشم و اشک ریزش) و سایر اشکال رینیت آلرژیک مصرف می‌شود. همچنین ممکن است برای درمان کپهر (بثورات جلدی) مزمن خود به خودی مورد استفاده قرار گیرد.

راهنمایی‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید: وجود هرگونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

- حساسیت بیش از حد به بیلاستین یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- سابقه عارضه قلبی طولانی شده QT و یا بیماری تورسداد د پوینت شامل سندرم‌های مادرزادی QT طولانی

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - مصرف این دارو در زنان باردار مورد مطالعه قرار نگرفته است، لذا مصرف آن طی دوران بارداری توصیه نمی‌شود.
شیردهی - در صورت ترشح این دارو در شیر انسان مطالعه‌ای صورت نگرفته است. مطالعات در حیوانات، ترشح بیلاستین در شیر را نشان داده است. در مورد ادامه مصرف این دارو یا قطع شیردهی طی دوران شیردهی، با پزشک خود مشورت نمایید.

هشدارها/موارد احتیاط:

۱- کارایی و ایمنی بیلاستین در کودکان کمتر از ۲ سال اثبات نشده است، ضمن آن که اطلاعات بالینی محدودی از مصرف آن در کودکان ۲ تا ۴ سال وجود دارد. بنابراین مصرف این دارو نباید در این گروه‌های سنی انجام شود.
از مصرف محلول خوراکی زیوریا® کودکان در کودکان کمتر از ۴ سال و با وزن کمتر از ۱۶ کیلوگرم خودداری نمایید.
۲- در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

نارسایی متوسط یا شدید کلیوی و کبدی
افزایش فاصله QT - مصرف این دارو ممکن است باعث افزایش فاصله QT شود. در بیماران دارای سابقه آریتمی قلبی، برادی کاردی قابل توجه، سابقه مرگ ناگهانی یا ایست قلبی در خانواده و اختلالات الکترولیت (مانند هیپوکالمی، هیپومگنیزیمی) با احتیاط مصرف شود.

تداخل‌های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

کتوکونازول (داروی ضد قارچ)، اریترومایسین (آنتی‌بیوتیک)، دلیتامازم (برای درمان آرتین صدری)، سیکلوسپورین (کاهش دهنده فعالیت سیستم ایمنی بدن)، ریتوناویر (برای درمان ایدز) و ریفامپیسین (آنتی‌بیوتیک)، بتاهستین، دیپوتیک‌های لوپ شامل فورزماید، برخی داروهای القاکننده قوی آنزیم CYP3A4 از مصرف همزمان داروهای زیر با بیلاستین خودداری نمایید:
لاسمیدیتان، اسپاسنتان، تائوروسودیول، پیتولیسانت

مقدار و نحوه مصرف مصرف دارو:

مقدار مصرف پیشنهادی این دارو به شرح زیر است:
کودکان ۴ تا ۱۱ سال و با وزن حداقل ۱۶ کیلوگرم - ۱۰ میلی‌گرم بیلاستین (۴ میلی‌لیتر محلول خوراکی زیوریا® کودکان) یک‌بار در روز است.
کودکان بالاتر از ۱۲ سال و نوجوانان - ۲۰ میلی‌گرم بیلاستین (۸ میلی‌لیتر محلول خوراکی زیوریا® کودکان) یک‌بار در روز است.

در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:

۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
۲- از مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک خودداری کنید. در صورت تداوم علائم، با پزشک خود مشورت نمایید.

۳- دارو را یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا یا آب میوه مصرف نمایید.
۴- از مصرف آب گرم‌فروت همراه با این دارو خودداری نمایید.

۵- دوره درمان بر اساس نوع بیماری، توسط پزشک تعیین می‌گردد.
۶- این دارو حاوی متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن است. ایمنی پروپیل‌پارابن در کودکان زیر ۲ سال اثبات نشده است.

۷- این دارو حاوی ۸۰ میلی‌گرم پروپیل‌گلیکول در ۴ میلی‌لیتر است. اگر کودک شما کمتر از ۵ سال سن دارد، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید، سپس برنامه عادی خود را در کارهای دیگری حاوی پروپیل‌گلیکول یا الکل داده شود.

۸- مصرف این دارو باید از طریق پیمانه انجام شود.
۹- پس از هر بار مصرف، پیمانه را بشویید.

۱۰- در صورتی که یک‌نوبت از مصرف دارو فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آن را میل نمایید. سپس برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

۱۱- در صورت مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو، سریعاً به پزشک اطلاع دهید و یا به مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به‌موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

شایع: ممکن است تا ۱۰ نفر در هر ۱۰ نفر را تحت تاثیر قرار دهد
سردرد، خواب‌آلودگی، گیجی، درد در ناحیه فوقانی شکم

غیرشایع: ممکن است تا ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار دهد
نوار قلب غیر طبیعی، تغییر در آزمایشات خونی عملکرد کبدی، گیجی، درد معده، خستگی، افزایش اشتها، ضریان نامنظم قلب، افزایش وزن، تهوع، اضطراب، خشکی یا ناراحتی بینی، درد شکم، اسهال، گاستریت (روم دیواره معده)، سرگیجه، احساس ضعف، تشنگی، تنگی نفس (اشکال در تنفس)، خشکی دهان، سوء هاضمه، خارش، تخیال‌دهانی، تب، ووز گوش، اشکال در خوابیدن، تغییر در آزمایشات خونی عملکرد کلیوی، افزایش چربی خون

فراوانی ناشناخته: از داده‌های موجود قابل تخمین نیست
تهش قلب، تکی کاردی (ضریان سریع قلب)، استفراغ

عوارض جانبی که ممکن است در کودکان مشاهده شود:
شایع: ممکن است تا ۱۰ نفر در هر ۱۰ نفر را تحت تاثیر قرار دهد

رینیت (تحریک بینی)، ورم ملتحمه آلرژیک (تحریک چشم)، سردرد، درد معده (درد شکم/ قسمت بالای شکم)

غیرشایع: ممکن است تا ۱۰ نفر در هر ۱۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار دهد
تحریک چشم، گیجی، از دست دادن هوشیاری، اسهال، تهوع، ورم لب، گزما، کپهر، خستگی

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- در صورت مشاهده ذرات در محلول خوراکی، از مصرف آن خودداری نمایید.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود.
- شش ماه بعد از باز کردن درپوش بطری برای اولین بار، باقی‌مانده دارو را دور بریزید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معدوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۷۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵

تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ - ۴۴۵۰۰۲۲۹

www.abidipharma.com

VOC@abidipharma.com

سایت اینترنتی:

ایمیل جهت ارتباط مشتری :

تاریخ تدوین: ۱۳۳۰/۰۴/۱۰

دارنده پروانه ساخت: داروسازی دکتر عبیدی
تهران، ایران

abidi
SINCE 1946

