



این دارو ممکن است باعث عوارض جانبی جدی زیر شود:
آسیب کبدی (هپاتوتوکسیسیته) - در صورت مشاهده هر یک از علائم خستگی، تب، درد یا حساسیت در قسمت بالای وسط یا راست معده (شکم)، تهوع، استفراغ، بنورات جلدی، زرد شدن پوست و چشمها (یرقان) مصرف دارو را متوقف کرده و سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
مشکلات کیسه صفرا - سنگ کیسه صفرا، التهاب کیسه صفرا یا التهاب لوزالمعده ناشی از سنگ کیسه صفرا ممکن است در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی دیده شود و احتمال بروز آن هنگام مصرف این دارو نیز وجود دارد. در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، تب یا درد شدید و مداوم در ناحیه معده (شکم) (که ممکن است به کمر انتشار یابد، یا با بدون استفراغ)، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
شایع ترین عوارض جانبی این دارو عبارتند از:
اسهال، خارش، استفراغ، بیوست، تهوع، درد معده (شکم)، گیجی

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
- دارو را در بسته بندی اصلی خود نگهداری نمایید.
- بعد از هر بار مصرف، در پوش بطری را محکم ببندید.
- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو را از طریق فاضلاب یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معیوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۲۲، داروسازی دکتر عبیدی
صندوق پستی: ۱۵۶ - ۱۳۴۴۵
تلفن شکایات و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱-۴۴۵۰۰۲۲۹
www.abidipharma.com
Sایت اینترنتی: VOC@abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: ۱۴۰۲۰۷۱۲
تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران - ایران
عبدی
تاسیس ۱۳۳۵

اکساری® در اشکال زیر توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد:
- اکساری® ۶۰: به صورت قرص‌های روکشدار خوراکی سفید رنگ، در جعبه‌های ۳۰ عددی است. هر قرص حاوی ۶۰ میلی‌گرم رزمیتروم است.
- اکساری® ۸۰: به صورت قرص‌های روکشدار خوراکی زرد رنگ، در جعبه‌های ۳۰ عددی است. هر قرص حاوی ۸۰ میلی‌گرم رزمیتروم است.
- اکساری® ۱۰۰: به صورت قرص‌های روکشدار خوراکی صورتی رنگ، در جعبه‌های ۳۰ عددی است. هر قرص حاوی ۱۰۰ میلی‌گرم رزمیتروم است.

موارد مصرف:

اکساری® همراه با رژیم غذایی و فعالیت بدنی برای درمان بزرگسالان مبتلا به استئاتوهایپرتی غیرالکلی غیرسیروتیک (NASH) با درج‌ات متوسط تا پیشرفته فیبروز کبدی تجویز می‌شود، اما برای بیماران مبتلا به سیروز کبدی مناسب نیست.

راهنامه‌های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:

موارد منع مصرف گزارش نشده است.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری - در حال حاضر هیچ داده‌ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری برای ارزیابی خطر بروز نقص‌های مادرزادی، سقط جنین یا سایر پیامدهای نامطلوب برای مادر و جنین در دسترس نیست. در صورت بارداری یا تصمیم به بارداری، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

شیردهی - هیچ اطلاعاتی در مورد وجود این دارو در شیر انسان یا حیوان، اثرات احتمالی آن بر نوزاد شیرخوار و یا تولید شیر در دسترس نیست. هنگام تصمیم‌گیری در مورد ادامه یا قطع شیردهی، باید مزایای شیردهی برای رشد و سلامت نوزاد، همراه با نیاز بالینی مادر به دارو و احتمال بروز عوارض جانبی دارو در نوزاد یا بیماری زمینه‌ای مادر، باید به‌دقت در نظر گرفته شود.

هشدارها/موارد احتیاط:

- ۱- بی‌خطری و اثربخشی این دارو در کودکان کمتر از ۱۸ سال اثبات نشده است.
- ۲- در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
سمیت کبدی - در صورت مشاهده هر گونه علائم آسیب شدید کبدی مانند خستگی، تهوع، استفراغ، درد یا حساسیت در قسمت بالای راست شکم، یرقان، تب و بنورات جلدی، فوراً با پزشک تماس بگیرید.
عوارض جانبی مرتبط با کیسه صفرا - مصرف این دارو می‌تواند خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا (کوله‌لیتیازیس)، التهاب کیسه صفرا (کوله‌سیتیت) و التهاب لوزالمعده (پانکراتیت) انسدادی ناشی از سنگ کیسه صفرا را افزایش دهد. در صورت بروز علائم یا نشانه‌های این شرایط، سریعاً با پزشک تماس بگیرید.

تداخل‌های دارویی:

اکساری® ممکن است با سایر داروها تداخل داشته و باعث افزایش عوارض جانبی شود. اگر داروهای مانند جم‌فیروزیل (برای کاهش تری‌گلیسیرید) یا سیکلوسپورین (برای سرکوب سیستم ایمنی) مصرف می‌کنید، حتماً پزشک خود را مطلع سازید، زیرا استفاده از اکساری® در این شرایط توصیه نمی‌شود.
در صورت مصرف داروهای مانند کلوپیدوگرل (رقیق‌کننده خون) یا استاتین‌ها (آترواستاتین، پراواستاتین، روزواستاتین و سیمواستاتین برای کاهش کلسترول)، به پزشک خود اطلاع دهید.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف اکساری® بر اساس وزن واقعی بدن تعیین می‌شود: برای بیماران با وزن: کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم، دوز توصیه شده ۸۰ میلی‌گرم خوراکی، یک‌بار در روز است. ۱۰۰- کیلوگرم یا بیشتر، دوز توصیه شده ۱۰۰ میلی‌گرم خوراکی، یک‌بار در روز است.
در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
۲- دارو را می‌توانید همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به‌موافقت اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

