

کیورکسیکا[®] ۱۸۰

بمپدوئیک اسید

Qrexica[®] 180

Bempedoic Acid

کیورکسیکا[®] ۱۸۰ به صورت قرص‌های خوراکی، روکشدار و به رنگ سفید است. هر قرص حاوی ۱۸۰ میلی‌گرم بمپدوئیک اسید است. این دارو در جعبه‌های ۳۰ عددی توسط داروسازی دکتر عبیدی عرضه می‌گردد.

موارد مصرف:
کیورکسیکا[®] ۱۸۰، یک مهارکننده آدنوزین تری‌فسفات – سیترات لیاز (ACL) است و در موارد زیر تجویز می‌شود:
– کاهش خطر بروز عوارض جانبی عمده قلبی عروقی شامل مرگ قلبی عروقی، انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی یا احیای خون رسانی عروق کرونر در افراد بزرگسالی که در معرض ریسک بالای این عوارض قرار دارند و قادر به دریافت درمان توصیه شده با استاتین نیستند (از جمله افرادی که استاتین مصرف نمی‌کنند).
– به عنوان مکمل رژیم غذایی و ورزش، به صورت ترکیبی با سایر درمان‌های کاهنده کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL-C)، یا به تنهایی، در مواردی که درمان همزمان کاهنده LDL-C برای کاهش LDL-C در بزرگسالان مبتلا به هیپرکلسترولمی، از جمله هیپرکلسترولمی فامیلی هتروزیگوت (HeFH)، امکان پذیر نباشد.

راهنمایی‌های عمومی:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:
وجود هر گونه حساسیت، بارداری یا شیردهی، استفاده از سایر داروها، ابتلا به بیماری‌های دیگر

موارد منع مصرف:
– حساسیت به بمپدوئیک اسید یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
– بارداری
– شیردهی
– مصرف همزمان این دارو با بیشتر از ۴۰ میلی‌گرم در روز سیموالتاتین

مصرف در بارداری و شیردهی:
بارداری – مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.
زنان در سنین باروری باید در طول دوره مصرف این دارو از روش‌های مؤثر پیشگیری از بارداری استفاده نمایند.
شیردهی – مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

هشدارها/موارد احتیاط:
۱- بی‌خطری و کارایی این دارو در کودکان زیر ۱۸ سال اثبات نشده است.
۲- در صورت ابتلا به بیماری‌های دیگر بخصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:
ریسک هیپروایسمی – در طی درمان با این دارو، خطر بروز هیپروایسمی شامل افزایش سطح اسید اوریک سرم و ابتلا به نفرس وجود دارد. سطح اسید اوریک سرم ممکن است در طول دوره درمان پایش شود. در صورت بروز علائم یا نشانه‌های افزایش اسید اوریک خون، لازم است به پزشک مراجعه نمایید.
ریسک پارگی تاندون – در طول مصرف این دارو، احتمال بروز التهاب یا پارگی تاندون وجود دارد. در صورت مشاهده اولین علائم، استراحت نموده و سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید.
لاکتوز – این دارو حاوی لاکتوز است. اگر به برخی قندها عدم تحمل دارید، پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

تداخل‌های دارویی:
قبل از مصرف این دارو، در صورتی که هر یک از داروهای زیر را مصرف می‌کنید، اخیراً مصرف کرده‌اید یا ممکن است در آینده مصرف کنید، پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید:
– آتورواستاتین، فلوواستاتین، بیناواستاتین، پروواستاتین، رزواستاتین، سیموالتاتین که برای کاهش کلسترول استفاده و به عنوان استاتین شناخته می‌شوند.
– مصرف همزمان این دارو با استاتین‌ها ممکن است خطر بروز مشکلات عضلانی را افزایش دهد. در صورت مشاهده هر گونه درد، حساسیت یا ضعف عضلانی بدون علت مشخص، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
– بوستانان که برای درمان بیماری فشار خون سرخرگی ریوی استفاده می‌شود.
– فیماساراتان که برای درمان فشار خون بالا و نارسایی قلبی استفاده می‌شود.
– آسوناپروپیر، گلکاپروپیر، گرازوپروپیر، وکسیلاپروپیر که برای درمان هیانتین C استفاده می‌شوند.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:
میزان مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، اما مقدار معمول مصرف این دارو به شرح زیر است: دوز توصیه شده کیورکسیکا[®] ۱۸۰ میلی‌گرم، یک قرص یک بار در روز است.
پس از شروع درمان، پزشک سطح چربی خون شما را طی ۸ تا ۱۲ هفته بررسی خواهد نمود.
در خصوص نحوه صحیح مصرف این دارو به نکات زیر توجه کنید:
۱- این دارو را دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف کنید.
۲- از قطع مصرف دارو بدون اطلاع پزشک خودداری کنید، زیرا ممکن است سطح کلسترول شما دوباره افزایش یابد.
۳- قرص را به طور کامل بلع نمایید.
۴- این دارو را می‌توانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.
۵- در صورتی که مصرف دارو را فراموش کرده‌اید:
– اگر همان روز متوجه شدید، دوز فراموش شده را مصرف کرده و دوز بعدی را روز بعد در زمان معمول خود مصرف کنید.
– اگر دوز روز قبل را فراموش کرده‌اید، داری خود را طبق برنامه عادی ادامه دهید و از دو برابر کردن دوز

خودداری کنید.
۶- در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده، فوراً با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
این دارو ممکن است باعث بروز عوارض جانبی جدی شود، از جمله:
افزایش سطح اسید اوریک خون (هیپروایسمی) – این عارضه ممکن است طی ۴ هفته پس از شروع مصرف دارو ظاهر شده و در طول درمان ادامه یابد. پزشک ممکن است سطح اسید اوریک خون شما را طی مصرف دارو پایش نماید. افزایش اسید اوریک خون می‌تواند منجر به نفرس باشد. در صورت مشاهده علائم زیر که ممکن است ناشی از هیپروایسمی و نفرس باشند، با پزشک خود تماس بگیرید:
درد شدید یا به خصوص در مفصل انگشت پا، مفاصل حساس یا گرم و تورم یا قرمزی مفاصل
پارگی یا آسیب تاندون – این دارو ممکن است باعث بروز مشکلات تاندون شود. تاندون‌ها رشته‌های سخت بافتی هستند که عضلات را به استخوان‌ها متصل می‌کنند. علائم مشکلات تاندون ممکن است شامل درد، تورم، التهاب یا پارگی تاندون‌ها باشد که معمولاً در شانه‌ها، تاندون عضله دوسر بازو و تاندون آشیل در پشت پاشنه پا دیده می‌شود، اما سایر تاندون‌ها نیز ممکن است درگیر شوند. پارگی تاندون می‌تواند ظرف چند هفته یا چند ماه پس از شروع مصرف دارو رخ دهد. خطر مشکلات تاندون در موارد زیر افزایش می‌یابد:
سن بالای ۶۰ سال، مصرف استروئیدها (کورتیکواستروئیدها)، مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها (فلوروکینولون‌ها)، ابتلا به نارسایی کلیوی، سابقه مشکلات تاندونی
در صورت مشاهده هر یک از علائم یا نشانه‌های پارگی تاندون زیر، فوراً مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید:
شنیدن یا احساس صدای تق‌تق یا ترکیدن در ناحیه تاندون، کبودی فوری پس از آسیب در ناحیه تاندون، ناتوانی در حرکت دادن ناحیه آسیب‌دیده یا قرار دادن وزن روی آن
تا هنگام دریافت کمک پزشکی، از ورزش و استفاده از ناحیه آسیب‌دیده خودداری کنید.
شایع‌ترین عوارض جانبی این دارو در افراد مبتلا به هیپرکلسترولمی اولیه شامل موارد زیر است:
علائم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا و علائم شبه آنفلوآنزا، برونشیت، اسهال‌های عضلانی، درد در شانه، پاها یا بازوها، درد پشت، کم‌خونی، درد معده، افزایش آنزیم‌های کبدی
شایع‌ترین عوارض جانبی این دارو در افراد مبتلا به مشکلات قلبی شامل موارد زیر است:
مشکلات کلیوی، اسهال‌های عضلانی، کم‌خونی، سنگ کلیه صفر، افزایش آنزیم‌های کبدی

شرایط نگهداری:
– دارو را دور از دسترس و دید کودکان نگهداری نمایید.
– از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.
– دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
– دارو را از طریق قیاضابل یا زباله‌های خانگی دور نریزید. از داروساز خود در مورد چگونگی معوم کردن داروهای مصرف نشده سوال نمایید. این اقدامات به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

آدرس داروسازی دکتر عبیدی: تهران، کیلومتر ۸ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک ۲۲، داروسازی دکتر عبیدی
سندوق پستی: ۱۵۶ – ۱۳۴۴۵
تلفن شکایت و گزارش عوارض جانبی دارو: ۰۲۱ – ۴۴۵۰۰۲۲۹
www.abidipharma.com
سایت اینترنتی: www.abidipharma.com
ایمیل جهت ارتباط مشتری: VOC@abidipharma.com

ساخت داروسازی دکتر عبیدی
تهران – ایران

abidi
SINCE 1946



تاریخ تدوین: ۱۴۰۴/۱/۱۷



210x150mm 700251722100830